

***Этиология неврозов.
Формы неврозов.***

*Дубовая В.Н
Группы Н-3*

Для невроза характерно:

- 1. Наличие психогенного этиологического фактора.
- 2. Разнообразие и динамичность клиники.
- 3. Обратимость симптоматики.
- 4. Отсутствие патологоанатомического (морфологического, органического) субстрата.

Этиология неврозов

- **Пренатальные факторы :**

- невротическое состояние матери, неблагоприятная обстановка в семье во время беременности;
- наличие диэнцефального синдрома у матери;
- перенесенная хроническая внутриутробная гипоксия;

- **Интранатальные факторы:**

- преждевременные или поздние роды;
- дискоординация родовой деятельности
- гипоксия, асфиксия плода в родах.

- **Конституционально-генетические факторы :**

Велика роль преморбидных особенностей личности: эмоциональная лабильность, возбудимость, уровень тревожности, мнительность, ригидность, а также тип темперамента.

- **Психосоматические факторы:**

- черепно-мозговые травмы; - перенесенные нейроинфекции; - длительные соматические заболевания.

Основными формами неврозов являются следующие:

- 1. Неврастения.
- 2. Истерия.
- 3. Двигательные неврозы (тики, заикание).
- 4. Невроз навязчивых состояний.
- 5. Энурез

Неврастения

- Это нервно-психическое расстройство, связанное с длительным эмоциональным перенапряжением.
- При неврастении отмечается сочетание раздражительности и возбудимости с повышенной утомляемостью и истощаемостью нервной системы.



Истерия

- Является второй по частоте формой невроза, чаще встречается в молодом возрасте и значительно чаще у женщин. Возможен истерический невроз, как реакция на «острую» ситуацию, и у человека без истерических черт характера. Больные истерическим неврозом отличаются повышенной чувствительностью и впечатлительностью, неустойчивостью настроения, склонны привлекать к себе внимание окружающих («жажда признания»).



Двигательные неврозы

- *Тик* – непроизвольные, быстрые сокращения одной мышцы или группы мышц, когда возникают насильственные движения тела, ног, частое мигание.
- *Заикание* – это проявление не органического поражения ЦНС, а психогенно обусловленное заболевание. Как все неврозы, оно имеет функциональную основу и появляется чаще у детей с неустойчивой психикой, когда нервная система дает «срывы» на травмирующие факторы .



Невроз навязчивых состояний

- Называют различные невротические состояния с навязчивыми мыслями, идеями, представлениями, действиями и страхами. Он встречается реже, чем неврастения и истерия, причем у мужчин и женщин – с одинаковой частотой.
- Невроз навязчивых состояний может возникнуть и у здоровых детей при переутомлении. Такие дети боятся выйти во двор, где их испугала собака, они боятся незнакомых людей, грозы и т.д.

Энурез

- *Энурез* – ночное недержание мочи. Это расстройство наблюдается в раннем дошкольном возрасте, реже – у школьников и подростков. Чаще ночное недержание мочи возникает у детей с невротическими явлениями, когда с большим трудом вырабатывается условный рефлекс, который является следствием длительного воспитания и лежит в основе произвольной регуляции акта мочеиспускания.

