

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ И ЗМЕЙ

*Работа студенток 1 курса 13 группы  
Института здоровья детей  
Беселии Сесиль Муртазовной  
Соповой Софьи Сергеевной*

# УКУСЫ ЗМЕЙ



В России встречается 14 видов ядовитых змей, наиболее часто человек страдает от укусов рептилий трех семейств:

- 1) семейство ужеподобных,
- 2) семейство гадюковых
- 3) семейство аспидовых.



# УКУС СТЕПНОЙ ГАДЮКИ



Обычно диагностика укуса змеи не составляет трудностей. Чаще всего укусы не ядовитых змей оставляют на теле только мелкие царапины. Укус же ядовитой змеи оставляет глубокие проколы от зубов, через которые впрыскивается яд.

# МЕСТНЫЕ СИМПТОМЫ УКУСА ГАДЮКИ

- 1 или 2 прокола от зубов змеи в виде маленьких точек
- Относительно слабая боль в месте укуса
- Жжение
- Покраснение
- Отек через 10-30 минут, иногда значительный
- Возможно наличие мелкоточечных кровоизлияний, кровянистых пузырей
- Возможны участки отмирания кожи
- Кожа становится багрово-синюшного цвета



# ОБЩИЕ СИМПТОМЫ

- Тошнота
- Сонливость
- Головокружение
- Сердцебиение
- Понижение температуры тела

*При тяжелой степени интоксикации:*

- Слабость
- Бледность кожных покровов
- Головокружение
- Тошнота
- Потливость
- Похолодание конечностей
- По мере нарастания симптомов появляется: жар, одышка, возможна потеря сознания, развитие почечной недостаточности.
- Нарушение сознания

# ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- Поскольку любые движения усиливают лимфо- и кровообращение, способствуя распространению яда из места укуса, пострадавшему необходимо обеспечить полный покой в горизонтальном положении.
- Если змея укусила через одежду, то её необходимо снять, чтобы обеспечить доступ к ране. Кроме того, на ней могут остаться следы яда.
- Обезболить
- Обработка раны и наложение стерильной повязки
- Обильное питьё или в\в инфузия поможет ускорить выведение из организма яда змеи и продуктов тканевого распада



<http://survival.com.ua>



- Во всех случаях отравления необходима госпитализация.



# УКУСЫ НАСЕКОМЫХ



# АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА УЖАЛЕНИЯ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫМИ НАСЕКОМЫМИ



- Наиболее часто аллергические реакции развиваются на укусы перепончатокрылыми насекомыми, такими как осы, пчелы, шершни, шмели.

# ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ РЕАКЦИЙ

- При ужалении пчелой – удалить пинцетом жало.
- Протереть место ужаления тампоном, смоченным перекисью водорода.
- Холод на место ужаления (задерживает всасывание яда за счет спазма поверхностных сосудов кожи) в виде примочек, пузыря со льдом.

## Лечение системных реакций

- Срочная госпитализация.
- Выше места ужаления накладывают венозный жгут, который следует ослаблять на 1-2 мин каждые 10 мин. При ужалении пчелой – удалить жало.




*В случае развития анафилактического шока – противошоковые мероприятия:*

- 1. Уложить больного на кушетку и опустить головной конец.*
- 2. Повернуть голову пациента набок*
- 3. Удалить протезы*
- 4. Фиксировать язык*

# УКУСЫ ЧЕРНОЙ ВДОВЫ

- Укус паука черной вдовы считается одним из самых опасных, порой смертельных, среди всех повреждений, которые может получить человек от членистоногих. Рана практически незаметна, чувствуется как легкий укол, симптомы появляются также не сразу – через пару часов.






# СИМПТОМЫ

1. Местная боль
2. Потливость
3. Эритема
4. Латродектизм
5. Боль в животе,  
как при  
аппендиците

Летальные исходы встречаются очень редко. Симптомы стихают в течение 1-3 сут, но остаточные судороги, парестезия, беспокойство и слабость могут сохраняться в течение нескольких недель и месяцев.

Медицинская помощь при укусе паука аналогична помощи при укусе змей. Самым эффективным способом, для того, чтобы нейтрализовать укус паука, считается специальная сыворотка, которая не всегда доступна, особенно в первые часы после атаки.



# ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

- <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/animal-bites>
- Первая медицинская помощь - Буянов В.М. - Учебник
- <https://www.52gkb.ru/press-tsentr/interesnyye-sluchai/67-ukusy-nasekomykh>