

ГОУ ВПО БГМУ
Кафедра хирургических болезней
Лекция на тему:


«Заболевания толстой и
прямой кишки»

Подготовили: проф. Р.А.
Нигматуллин, асс. И.Х.Ахметов

Неопухолевые заболевания прямой кишки, параректальной клетчатки и крестцово-копчиковой области

- Геморрой
- Анальная трещина
- Парaproктит
- Эпителиальный копчиковый ход
- Перианальные кандиломы
- Выпадение прямой кишки
- Анальная инконтиненция

Геморрой-патологические изменения кавернозных вен прямой кишки. Прямые артерио-венозные анастомозы кавернозных телец обуславливают артериальные кровотоки из геморроидальных узлов (на 3,7, 11 часах по циферблату в положении тела на спине)




Комбинированный геморрой



Комбинированный геморрой-хирургическое лечение (иссечение геморроидальных узлов – геморроидэктомия)




Комбинированный геморрой



Комбинированный геморрой



Комбинированный геморрой



Комбинированный геморрой (завершающий этап операции)



Острая и хроническая анальная трещина

Симптомы анальной трещины

(триада клинических проявлений анальной трещины)

1. Боль в заднем проходе во время дефекации и после неё / от нескольких минут до 10 – 12 часов /
2. Спазм сфинктера
3. Кровотечения из заднего прохода во время дефекации/ от нескольких капель до нескольких мл алой кровью/

Лечение анальной трещины



```
graph TD; A[Лечение анальной трещины] --> B[Консервативное]; A --> C[Хирургическое]; B --> D[Свечи<br/>мази, микро-<br/>клизмы]; C --> E[Иссечение трещины и<br/>дозированная сфинкте-<br/>ротомия];
```


Консервативное

Свечи
мази, микро-
клизмы

Хирургическое

Иссечение трещины и
дозированная сфинкте-
ротомия

Иссечение (передней) анальной трещины,
дозированная латеральная сфинктеротомия



Иссечение анальной трещины (завершающий этап)



Опухоли перианальной области (хирургическое лечение)



Иссечение перианальной опухоли




Иссечение перианальной опухоли



Иссечение перианальной опухоли (завершающий этап)




Доброкачественная фибролипома перианальной области




Колоректальный рак

(хирургическое лечение)




Колоректальный рак

(хирургическое лечение – мобилизация пораженной опухолью кишки)




Колоректальный рак

(хирургическое лечение – мобилизация пораженной опухолью кишки, кишка с опухолью удалена, формирование анастомоза)




Колоректальный рак

(хирургическое лечение – задняя губа анастомоза сформирована)



Колоректальный рак

(хирургическое лечение – передняя губа анастомоза сформирована)



Колоректальный рак

(хирургическое лечение – операция завершена, окончательный вид)

