**ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ
РЕВМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ**

**Зав.кафедрой факультетской
терапии ВолгГМУ**

**Доктор мед. наук профессор
А.Р.Бабаева**

Социально значимые ревматические заболевания

1. Воспалительные заболевания суставов и позвоночника:

- Ревматоидный артрит
- Анкилозирующий спондилит
- Псориатический артрит
- Другие спондилоартриты.

2. Системные заболевания соединительной ткани :

Системная красная волчанка (СКВ)

Системная склеродермия (ССЛ)

Полимиозит/дерматомиозит

Клинически значимые ревматические заболевания

3. Системные васкулиты:

3.1 Полиангиит с грануломатозом (Вегенера)

3.2 Микроскопический полиангиит

3.3 Синдром Чарджа-Стросса (Churg-Strauss)

3.4 Ревматическая
полимиалгия/Гигантоклеточный артериит

3.5 Неспецифический аортоартериит (болезнь
Такаясу)

3.6 Геморрагический васкулит (Шейнлейн-Геноха)

АНЦА
-
ассоц
ииро
ванн
ые
васку
литы

Социально и клинически значимые ревматические заболевания

- Остеоартроз
- Подагра, подагрический артрит
- Заболевания внесуставных мягких тканей (периартриты, тендиниты, теносиновиты, бурситы, лигаментиты)
- Миопатии
- Фибромиалгия

Центральное место в лабораторной диагностике ревматических заболеваний занимают серологические тесты для обнаружения циркулирующих аутоантител

- **Основными маркерами ревматических заболеваний являются антинуклеарные антитела (АНА), ревматоидные факторы (РФ), антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, антифосфолипидные антитела и антинейтрофильные цитоплазматические антитела .**
- Положительные результаты определения этих аутоантител входят в число диагностических критериев ряда системных ревматических заболеваний и могут использоваться при оценке активности и прогноза этих заболеваний. Кроме того, обнаружение аутоантител представляется важным для ранней диагностики и характеристики клинико-лабораторных субтипов ревматических заболеваний. По данным проспективных исследований, аутоантитела также могут служить предикторами развития аутоиммунных ревматических заболеваний.
- Особое внимание в последние годы уделяется изучению клинико-диагностического значения ревматоидного фактора и антител к цитруллинированным белкам/пептидам.
- Наряду с идентификацией аутоантител одним из ведущих аспектов диагностики ревматических заболеваний является исследование маркеров воспаления в крови (СОЭ, СРБ, цитокины, матриксные металлопротеазы, хемокины и т.д.)

Стандартные профили аутоантител для диагностики системных РЗ

СКВ: Антинуклеарный фактор (АНФ), анДНК, аSm, аRo/SS-A, аLa/SS-B, аРНП, антитела к кардиолипину – аКЛ, аС1q

РА: IgM/IgA РФ, антитела к цитруллинированным белкам – АЦЦП, АМЦВ, АКА, АПФ, антифилагриновые антитела, антитела к Ра 33, ВіР (Р-68)

Антифосфолипидный синдром: IgG/IgM аКЛ, IgG/IgM антитела к β_2 -гликопротеину I – а β_2 -ГП I, волчаночный антикоагулянт – ВА)

ССД: аScl-70, антицентромерные антитела (АЦА), антинуклеолярные антитела (аTh/То, аРНК-полимеразе III, аPM-Scl, аU1 РНП, антитела к фибриллагрину - аU3 РНП)

ПМ/ДМ: Антитела к аминоксил-синтетазам тРНК - Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, KS; антитела к SRP, Mi-2, PM-Scl, KJ)

Стандартные профили аутоантител для диагностики системных РЗ

Системные васкулиты: цАНЦА, пАНЦА, антитела к протеиназе 3 и миелопероксидазе

Аутоиммунные гепатиты: АНФ, антитела к гладкой мускулатуре (SMA), микросомам печени и почек I типа – LKM1, цитоплазматическому антигену печени LC-1, растворимому антигену печени/поджелудочной железы SLA/LP, митохондриям – AMA-M2

Воспалительные заболевания кишечника (Болезнь Крона, неспецифический язвенный колит): IgG/IgA антитела к *Saccharomyces Cerevisiae* – ASCA, пАНЦА, атипичные АНЦА

-

Ревматоидный артрит

Аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (синовитом), а в ряде случаев – с характерными внесуставными поражениями (В.А.Насонова).

- До 40% пациентов становятся нетрудоспособными в течение 5 лет с момента постановки диагноза²
- Около 30% больных становятся полностью нетрудоспособными в течение первых 10 лет РА

Основной диагноз РА (шифры МКБ10)

- Серопозитивный РА (M05.8)
- Серонегативный РА (M06.0)
- Особые клинические формы РА
 - Синдром Фелти (M05.0) – нейтропения, спленомегалия, гепатомегалия, системные проявления
 - Болезнь Стилла, развивающаяся у взрослых (M06.1) – гектическая лихорадка, макулопапулезная сыпь, лейкоцитоз, нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом, отрицательный РФ
- Вероятный РА

КЛИНИЧЕСКАЯ СТАДИЯ

- Очень ранняя стадия: длительность до 6 месяцев
- Ранняя стадия длительность 6-12 мес.
- Развернутая стадия: длительность более 1 года + типичные проявления РА
- Поздняя стадия: длительность более 2 лет + выраженная деструкция суставов (3-4 стадия), наличие осложнений РА.

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ (DAS 28)

- DAS 28 < 2,6 – ремиссия
- DAS 28 2,6-3,2 – низкая (степень 1)
- DAS 28 3,3-5,1 – умеренная (степень 2)
- DAS28 >5,1 – высокая (степень 3)

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

РФ, АЦЦП

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 1-4

ФК 1-4

ОСЛОЖНЕНИЯ

Ревматоидный артрит

Суставные проявления

- Воспаление синовиальной мембраны - синовит
- Накопление медиаторов воспаления и продуктов распада в капсуле
- Усиление боли, вовлечение нервных окончаний
- Разрушения хряща
- Сужение просвета сустава
- Начало разрушения кости
- Деформация и потеря подвижности в суставе

Внесуставные проявления

- Ревматоидные узелки
- СС: васкулиты
- Легочные: гранулема, плеврит
- Глазные: склерит, ирит
- Неврологические: компрессионная нейропатия
- Почечные/печеночные: нефрит

Характеристики РА: Воспаление и деструкция сустава

Ревматоидный артрит – ранняя диагностика

- **Иммунологические тесты:** ревматоидный фактор (РФ), исследование антицитрулиновых антител (АЦЦП)
- **Инструментальные методы:** рентгенография, магнито-резонансная терапия, ультразвуковое исследование суставов костей,
- **Иммуногенетические исследования:** типирование определенных человеческих лейкоцитарных антигенов – HLA
- **Артроскопия и биопсия синовиальной оболочки**

Ревматоидный артрит - диагностика

Критерии EULAR клинического подозрения на РА для врачей общей практики

- > 3 припухших сустава
- Вовлечение пястно- и плюснофаланговых суставов («+» симптомы «сжатия»)
- Утренняя скованность > 30 минут

Консультация ревматолога!

Диагностические критерии АСР (1987)

1. Утренняя скованность более 1 часа (>6 недель)
2. Припухлость не менее 3 суставов (>6 недель)
3. Артриты суставов кисти (>6 недель)
4. Симметричные артриты
5. Рентгенологические признаки
6. Подкожные узелки
7. Ревматоидный фактор

Диагностические критерии РА ACR / EULAR 2010

Поражение суставов	0-5 баллов
1 средний/крупный сустав	0
2-10 средних/крупных суставов	1
1-3 мелких сустава	2
4-10 мелких суставов	3
> 10 мелких суставов	5
Серология	0-3 балла
РФ (в клетки)– отр. АЦЦП АТ к цикл цитрулин пепт – отр.	0
1 Позитивный тест в низких титрах	2
Хотя бы 1 позитивный тест в высоких титрах	3
Длительность синовита	0-1 балл
< 6 недель	0
> 6 недель	1
Острофазовые показатели	0-1 балл
Нормальные и СОЭ, и СРБ	0
Повышение или СОЭ, или СРБ	1

**Счет ≥ 6 баллов
указывает на
определенный РА**

Внесуставные проявления РА

18

Ревматоидный артрит

ФАКТОРЫ РИСКА (при оценке профиля пациента)

- Генетические факторы (семейный анамнез, другие аутоиммунные заболевания, HLA DR4, различные эпитопы HLA DRB1)
- Женский пол
- Курение
- Избыточная масса тела
- Инфекции (вирус ЭБ)

Неблагоприятные прогностические факторы при РА

Рекомендации JCR 2014 ¹	Рекомендации EULAR 2013 ²
Наличие АЦП/РФ (высокий титр)	Наличие аутоантител (АЦП/РФ)
Повреждение суставов в начале болезни	Эрозия костной ткани в ранней фазе
Очень высокая активность болезни	Высокая активность болезни

Факторы неблагоприятного прогноза РА

- Высокая активность РА
- Эрозивный артрит (прогрессирующее течение заболевания – **обнаружение новых эрозий!**)
- Серопозитивность по РФ
- Серопозитивность по АЦЦП
- Системные проявления
- Резистентность к терапии

(учитывать при оценке профиля пациента!)

Выявление больных активным прогрессирующим РА

Клинические признаки	РГ- и лабораторные признаки
<ul style="list-style-type: none">• Сохранение утренней скованности > 15 мин.• ≥ 3 припухших суставов• ≥ 4 болезненных суставов• Повышение показателя DAS (≥ 3.2)	<ul style="list-style-type: none">• Новые эрозии при рентгенографии или магнитно-резонансной томографии (МРТ)• Повышенный уровень СРБ (≥ 0.6 mg/dL)• Повышение СОЭ (> 28 мм/ч по Westergren)• Высокий уровень РФ• Высокий уровень АЦЦП

Назначение ГИБП

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РА

Иммунологические маркеры : антитела к иммуноглобулину G – РФ разных изотипов (IgM,IgA,IgG), к модифицированным белкам (цитрулинированному пепетиду), к тканевым и клеточным антигенам (PNA), антитела к коллагену 2 типа

Маркеры воспаления : СРБ, провоспалительные цитокины (ИФ, ФНО-а, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-17 и т.д) хемокины (CXCL10, CXCL13, фракталкин), матриксные металло-протеазы

Изменение субпопуляций, функционального состояния иммунокомпетентных клеток (Т-лимфоциты, макрофаги), их рецепторного аппарата

Специфические белки, обнаруживаемые в плазме:
цитруллинированные пептиды, белок 14-3-3-η –новый маркер РА,
гликопротеин семафорин4А - ко-стимулятор Т-лимфоцитов

Иммунологические маркеры - антитела

- **Иммунологические маркеры :**
- антитела к иммуноглобулину G – РФ разных изотипов (IgM, IgA, IgG),
- к модифицированным белкам (цитрулинированному пептиду),
- к тканевым и клеточным антигенам (рибонуклеопротеидам - РНА), антитела к коллагену 2 типа

Маркеры воспаления

- СРБ
- провоспалительные цитокины (ИФ, ФНО-а, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-17 и т.д)
- хемокины (CXCL10, CXCL13, фракталкин),
- матриксные металлопротеазы (ММР)

Состояние иммуно- компетентных клеток

- **Изменение количества лимфоцитов**
- **субпопуляций лимфоцитов**
- **функционального состояния иммуно-компетентных клеток (Т-лимфоциты, макрофаги)**
- **рецепторного аппарата ИКК**

Специфические белки, обнаруживаемые в плазме:

- цитруллинированные пептиды
- белок 14-3-3-η –новый маркер РА
- гликопротеин семафорин 4А - ко-стимулятор Т-лимфоцитов

Иммунологические маркеры

Циркулирующие антитела в диагностике РА

**РФ – антитела к Fc-фрагменту
IgG**

**Антитела к RA33 направлены против
гетерогенного ядерного
рибонуклеопротеина (hnRNP)**

**АЦЦП – антитела к циклическому
цитруллинированному пептиду**

**АЦМВ - антитела к
цитруллинированному
модифицированному виментину**

Иммунологические маркеры ревматоидного артрита

Аутоантитело	Автор, год описания	Частота при раннем РА	Специфичность
Ревматоидный фактор	<i>Waalder, 1940</i>	15-30%	70%
Антинуклеарные антитела	<i>Beck, 1964</i>	30%	50%
Антитела к RA-33	<i>Hassfeld et al. 1989</i>	25%	90%
Антиперинуклеарный фактор	<i>Nienhuis et al. 1964</i>	50%	90%
Антикератиновые антитела	<i>Young et al. 1979</i>	40%	95%
Антитела к виментину (Sa)	<i>Despres N et al 1994</i>	30%	95%
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду	<i>Schellekens GA et al. 1998, van Venrooij et al. 2000</i>	75%	95-98%
Антитела к модифицированному цитруллиновому виментину	<i>Bang et al. 2006</i>	80-85%	85%
Другие антицитруллиновые антитела (цитруллинированные филаггрин, цитруллинированный		50-80%	Нд

Антитела к модифицированным белкам: открыты более 50 лет назад как антиперинуклеарный фактор

Антиперинуклеарный фактор

Staining of granules adjacent to the nucleus in human buccal mucosa epithelium¹

Окраска гранул, прилежащих к ядру, в эпителиальных клетках слизистой щеки

Waler–Rose and Latex-fixation tests in 74 APF (+) patients²

Diagnosis		Waler–Rose & Latex test		Waler–Rose test		APF (+)
		(+)	(-)	(+)	(-)	
RA	Definite	48	9	4	4	65
	Probable & possible	6	2	–	–	8
Systemic LE		1	–	–	–	1

APF, anti-perinuclear factor; LE, lupus erythematosus.

Антикератиновые антитела = антитела к филлагрину

- Positive staining of the *Stratum corneum* of rat esophageal epithelium by serum from patients with RA¹
- Anti-keratin antibodies was a misnomer as the antibodies were not directed against keratin but filaggrin¹
- The antigen was identified as filaggrin²

Filaggrin⁴

Filaggrin Ab staining of human vulva/anal skin shows strong cytoplasmic positivity in superficial layer of squamous epithelium³

Ab, antibody; RA, rheumatoid arthritis.

Антитела к цитруллинированным белкам (АСРА) реагируют с разными эпитопами

Filaggrin 48–65

Fibrinogen B 246–267

Fibrinogen

Fibrinogen A 211–230

Fibrinogen A 582–599

Fibrinogen A 556–575

Fibrinogen A 616–635

Vimentin

H2B/a 62–81

H2A/a 1–20

Histones 2A

Histones 2B

Clusterin 221–240

Clusterin 231–250

Biglycan 247–266

Enolase 1A 5–21

Vimentin 58–77

Apolipoprotein E

Apolipoprotein E 277–296

**АЦЦП- скрининговый
тест, выявляющий
антитела к различным
цитруллинированным
белкам**

ACPA, anti-citrullinated protein antibody.

Прогностическая ценность АЦП (АСРА) в дебюте РА

- Значительный прогресс в области стандартов диагностических исследований
- АЦП обнаруживаются примерно у 70% пациентов с РА на ранних стадиях заболевания
- У АЦП (+) пациентов отмечаются гораздо более тяжелые структурные повреждения, чем у АЦП (-)

АЦП — антитела к цитруллинированному пептиду; РА — ревматоидный артрит.

***Прогностическая значимость
иммунологических маркеров в
развитии эрозий при раннем РА***

Цитруллинирование – это процесс модификации белка под действием фермента пептидил-аргинин-деаминазы (PAD)

PAD - peptidyl arginine deiminase.

Цитруллинирование гистона H3 способствует деконденсации хроматина

Condensed chromatin

Decondensed chromatin

PAD, peptidyl arginine deiminase.

NETosis depends on citrullination and PAD enzymes :
**Клеточная смерть зависит от процесса
цитруллинирования и активности PAD - энзима**

NETosis is the release of NETs during a form of pathogen-induced cell death.
NET, neutrophil extracellular trap. (внеклеточные «ловушки» нейтрофилов)

Цитруллинирование белков при эпителиальном раке (рак кожи, молочной железы)

In breast cancer cells reduction of PAD4 expression dissociates tumor cell interactions

ACPA, anti-citrullinated protein antibody; IF PAD, peptidyl arginine deiminase.

Путь от цитруллинирования к образованию АСРА (АЦЦП)

ACPA, anti-citrullinated protein antibody; CCP, cyclic citrullinated peptide; PAD, peptidyl arginine deiminase; RA, rheumatoid arthritis; TNF, tissue necrosis factor.

АЦЦП образуют иммунные комплексы, активирующие макрофаги

Self-antigen
(citrullinated protein)

Immune complexes
bind to Fc receptor

Macrophage activation
and cytokine secretion

ACPA, anti-citrullinated protein antibody.

Цитруллирование улучшает связывание белков с некоторыми аллелями HLA класса II и приводит к активации Т-клеток

Сравнительная аффинность Vim 65–77 и Vim R70Cit к молекулам очищенного МНС класса II

Анализ Т-клеточного иммунного ответа

АЦЦП: уровни аутоантител до развития РА

- АСРА и РФ у пациентов появляются за много лет до развития РА¹
- IgA РФ также появляется у пациентов за годы до развития клинических СИМПТОМОВ²

АСРА, антитело к цитрулинированному протеину; Ig, иммуноглобулин; РА, ревматоидный артрит; РФ, ревматоидный фактор.

Модель развития эрозии кости при артрите

Доклиническая фаза

АСРА, антитело к цитруллинированному протеину.

Клиническое развитие

Развившееся заболевание

АЦЦП и дифференцировка остеокластов

АСРА 0 нг/мл

АСРА 1 нг/мл

АЦЦП 10 нг/мл

АЦЦП 100 нг/мл

Osteoclastogenesis

Bone Resorption

Локальные эрозии костной ткани у АЦЦП+ и АЦЦП- пациентов с РА

Изменения костной структуры

Изменение костной структуры у АЦП (+) пациентов без артрита по сравнению с контрольными АЦП (-)

Стрелками указаны участки истончения и фенестрации коркового слоя, а также небольшие эрозии костной ткани
АЦП — антитела к цитруллинированному пептиду.

Взаимосвязь между АЦП, РФ и связанной с РА потерей костной ткани

АЦП — антитела к цитруллинированному пептиду; РА — ревматоидный артрит; РФ — ревматоидный фактор.

Клиническое значение АЦЦП

-
- АЦЦП- высоко-специфичный маркер РА (88-96%)¹
 - АЦЦП позитивность и вызванная АЦЦП потеря костной ткани возникают **до клинического развития РА**
 - АЦЦП, особенно в высоких титрах, ассоциируются с прогрессированием заболевания и **развитием эрозий в суставах.**
 - РФ ассоциируется с более агрессивным течением заболевания и **системными проявлениями**
 - АЦЦП и РФ высоко ассоциируются друг с другом, особенно на ранней стадии РА и стимулируют эрозивный процесс в суставах

Терапия ГИБП рекомендована пациентам при наличии факторов неблагоприятного прогноза:

АЦЦП+, РФ+, высокая активность РА, ранние эрозии в суставах. (EULAR-рекомендации 2013)

INVESTIGATIONS

- Autoantibodies are thought to be the major tools of investigating Rheumatological disorders. Beside auto-antibodies ,Medical artoscopy and Musculo-skeletal ultrasound (MSK uSS) in the hands of Rheumatologist are newer developments in the diagnostic techniques.

INVESTIGATIONS

- Medical arthroscopy and MSK ultrasound both have been proved to be important diagnostic tools in the hands of Rheumatologist
- Arthroscopy is an accurate, reliable method for examining the interior structure of joints while there are very few Rheumatologists who are using the technique. The decision to learn arthroscopy is thus individual based..

Synovium is the primary site of inflammation in RA

- It has become clear in recent past that the synovium is the primary site of inflammation & a major effector organ in a variety of joint diseases including Rheumatoid Arthritis (RA) as a result there had been increased interest in studies of pathological changes of the synovium.

ARTHROSCOPY

- ***Indications***

- 1. when a thorough history, physical examination & suitable non invasive & radiographic studies have failed to establish a diagnosis.
- When treatment of a specific problem has failed and there is need for additional information that other studies cannot provide.
- When specific additional diagnostic information can be obtained in a less traumatic way (biopsy).

- ***Contraindications***

- A minimally deranged patient that will respond to the usual method of treatment.
- Local skin infections.

Partial or complete ankylosis – difficult maneuverability of

- instruments.

Pathologic Findings in Arthritis

Rheumatoid synovial villi are larger than normal, club shaped, pale, edematous, and numerous;

in the knee they proliferate in the suprapatellar roof, along the edges of the femoral condyles, beneath the menisci, and in the intercondylar notch.

Early, the creeping pannus can be pulled from articular edges with a probe, demonstrating the erosion of underlying hyaline cartilage.

Later stages may show extensive fibrillation, ulcers, or craters, often in an irregular, pattern over the femoral condyles and patellofemoral groove.

The joint often contains thick, yellowish synovial fluid with numerous, small, opaque white fragments, so-called rice bodies.

ULTRASOUND IN RHEUMATOLOGY PRACTICE

- conventional Radiography has long been the mainstay of the radiological assessment of joint disorders. however, early periarticular soft tissue abnormalities and synovitis are also not very well seen by X-rays. Although the gold standard for the assessment of soft tissue abnormalities is MRI, in the last few years, musculoskeletal uSG has made its niche as an important radiological investigation in the initial assessment of rheumatoid disease and during follow-up. This has been possible due to the availability of better uSG equipment, higher frequency transducers and state-of-the-art software.

ULTRASOUND IN RHEUMATOLOGY PRACTICE

- **INDICATIONS**

- Early detection of erosive disease
- Assessment of synovial tissue
- Assessment of effusions
- Detection of enthesitis in seronegative spondyloarthritis
- Assessment of treatment response
- Assessment of crystal arthropathy
-