

Заболелвания, передающиеся половым путем (ЗППП), которые также называют инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).

Презентация Носковой Лейлы
Класс 11Б

• Бактериальные ЗППП включают в себя:

1. Сифилис;

2. Гонорею;

3. Мягкий шанкр;

4. Венерическую лимфогранулёму;

5. Венерическую гранулему;

6. Хламидийную, микоплазменную и уреаплазменную инфекции.



Сифилис- хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями.



Гонорея - инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком, передаваемое половым путём и характеризующееся поражением слизистых оболочек половых органов и органов мочеиспускания.

и др...


· Вирусные ЗППП включают в себя:

1. Генитальные и аноректальные бородавки;

2. Генитальный герпес;

3. Контагиозный моллюск;

4. ВИЧ-инфекцию.



Кондиломы – это выросты или бородавки на коже и слизистых оболочках аногенитальной области, которые в равной степени поражают и мужчин, и женщин.




Генитальный герпес - это ЗППП, вызываемое двумя типами вирусов. Вирусы называются: «вирус простого герпеса, тип 1» (HSV-1) и «вирус простого герпеса, тип 2» (HSV-2).

и др...

· Паразитарные инфекции, которые могут передаваться половым путем, включают:

1. Трихомониаз (вызванный простейшими);
2. Чесотку (вызванную клещами);
3. Лобковый педикулёз (вызванный вшами).



Трихомониаз (вызванный простейшими) - одно из типичных заболеваний из рубрики протозойных паразитарных болезней. Такие паразитозы вызываются простейшими, т.е. представителями подцарства одноклеточных микроорганизмов (по сути, одноклеточных животных), некоторые из которых в отношении человека являются агрессивными патогенами.



Чесотку (вызванную клещами) - акариаз человека, вызванный чесоточными клещами, паразитирующими на животных. Характеризуется зудом и образованием на коже папуло-везикулярной сыпи и волдырей.

и др...

• Факторы, препятствующие контролю ЗППП, включают:

- Незащищенную половую связь с большим числом партнеров;
- Трудность обсуждения проблем половой жизни и для врачей, и для пациентов;
- Недостаточное финансирование для реализации существующих диагностических тестов и методов лечения, а также для разработки новых способов диагностики и лечения;
- Восприимчивость к повторной инфекции, если оба партнера не лечатся одновременно;
- Незавершенное лечение, которое может приводить к развитию устойчивых к препарату организмов;
- Путешествия по разным странам, что облегчает быстрое глобальное распространение ЗППП.

• Симптомы ЗППП.

Обычно у женщин ЗППП проявляются симптомами инфицирования мочевыделительной системы:

+Вагинальными выделениями и выделениями из уретры, которые могут быть обильными, густыми, гнойными, серого, желтого или зеленоватого цветов, могут сопровождаться неприятным запахом и болевыми ощущениями;

+Болями в нижней части живота;
дискомфортом и неприятными ощущениями при мочеиспускании.

+Распространенные признаки инфицирования мочеполовой системы у мужчин:

+Болезненное мочеиспускание;

+Выделение густой, белой, желтой или зеленоватой жидкости, имеющей нейтральный или неприятный запах, также выделения сопровождаются зудом и болью;

+Боли в мошонке.

Небольшая памятка:

- +На вирусы и болезни нужно проверяться каждый год , тогда возможность прожить дольше и быстрее начать лечение выше;
- +Не стесняться и попросить справку по венерическим болезням у партнёра;
- +Соблюдать гигиену , иметь личные вещи первой необходимости;
- +При половом акте всегда использовать презерватив, а так же не заниматься половым актом с малознакомым человеком;
- +Если один из партнёров заболел, то проверяться и лечиться должны оба человека;
- +Лечиться только после осмотра врача , самим лечение не назначать.
При первых же признаках идти в больницу и сообщить

и т.д...