

# Отравление барбитуратами

Орлов М.М.

Случайный или преднамеренный прием внутрь барбитала, фенобарбитала, этаминала Na и др. Передозировка тиопентала Na при внутривенном наркозе.

Барбитураты легко всасываются из ЖКТ.

Тяжелое отравление возникает при приеме дозы в 10 раз превышающей терапевтическую,

смертельное отравление – при приеме 20 – кратной терапевтической дозы.

# Легкое отравление

- ✓ Поверхностный наркоз с сохраненным спонтанным дыханием и защитными рефлексами
- ✓ Больные даже без интенсивной терапии просыпаются через 15 – 36 часов



# Отравление средней тяжести

- ✓ Сознание спутано или отсутствует
- ✓ Видимой гипоксии нет
- ✓ Тахикардия
- ✓ АД – на обычном для данного пациента уровне.



# Тяжелое отравление

- ✓ Торможение дыхания и кровообращения с исходом в смешанную гипоксию
- ✓ Поражение почек, печени
- ✓ Нарушение КЩР
- ✓ Без лечения – смерть в течение нескольких часов



**Смертельная доза  
барбитуратов – 0.1 г/кг,  
они очень медленно  
выводятся из организма  
(до 9 дней)**

# Диагностика

- ✓ Анамнез
- ✓ Клиника
- ✓ Обнаружение препарата в крови

# Интенсивная терапия

- ✓ Промывание желудка
- ✓ Восстановление проходимости ВДП, при необходимости ИВЛ
- ✓ ФД
- ✓ Коррекция ВЭБ и КЩР ( витамины, электролиты, сода )
- ✓ Мочегонные препараты (лазикс – 1мг/кг)
- ✓ При тяжелых отравлениях – гемосорбция, плазмаферез, гемодиализ
- ✓ Общетерапевтический уход
- ✓ Антидот – анексат, усиливает и ускоряет

# MARIJUANA

У НАС НЕТ  
ВТОРОГО ШАНСА НА  
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ...

