


СХЕМА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ



ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ

1


**УБЕДИТЬСЯ
В ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА
НА СОННОЙ АРТЕРИИ**



**НЕЛЬЗЯ!
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ**

2

**ОСВОБОДИТЬ
ГРУДНУЮ КЛЕТКУ
ОТ ОДЕЖДЫ И
РАССТЕГНУТЬ
РЕМЕНЬ**




**НЕЛЬЗЯ!
НАНОСИТЬ УДАР ПО ГРУДИНЕ И
ПРОВОДИТЬ НЕПРЯМОЙ
МАССАЖ СЕРДЦА, НЕ ОСВОБОДИВ
ГРУДНУЮ КЛЕТКУ И НЕ РАССТЕГНУВ
ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ**

ВНЕЗАПГННАЯ СМЕРТЬ

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ


3

**ПРИКРЫТЬ
ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ
МЕЧЕВИДНЫЙ
ОТРОСТОК**



4

**НАНЕСТИ
УДАР КУЛАКОМ ПО
ГРУДИНЕ**



Проверить пульс. Если пульса нет—

Перейти к следующей позиции 5.

**НЕЛЬЗЯ!
НАНОСИТЬ УДАР ПРИ НАЛИЧИИ
ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ**


**НЕЛЬЗЯ!
НАНОСИТЬ УДАР
ПО МЕЧЕВИДНОМУ
ОТРОСТКУ
ИЛИ В ОБЛАСТЬ КЛЮЧИЦ**

ВНЕЗАПГННАЯ СМЕРТЬ

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ

5

**НАЧАТЬ
НЕПРЯМОЙ
МАССАЖ СЕРДЦА**



Частота нажатия 50-80 раз в минуту.
Глубина продавливания грудной клетки
должна быть не менее 3-4 см.

6

**СДЕЛАТЬ
«ВДОХ»
ИСКУССТВЕННОГО
ДЫХАНИЯ**



ЗАЖАТЬ НОС, ЗАХВАТИТЬ ПОДБОРОДОК,
ЗАПРОКИНУТЬ
ГОЛОВУ ПОСТРАДАВШЕГО И СДЕЛАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫДОХ ЕМУ В РОТ (ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ МАРЛЮ,
САЛФЕТКУ ИЛИ МАСКУ «РОТ В РОТ»).

НЕЛЬЗЯ!

**РАСПОЛАГАТЬ ЛАДОНЬ НА ГРУДИ
ТАК, ЧТОБЫ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
БЫЛ НАПРАВЛЕН НА СПАСАТЕЛЯ**

НЕЛЬЗЯ!


**СДЕЛАТЬ «ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО
ДЫХАНИЯ, НЕ ЗАЖАВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НОС ПОСТРАДАВШЕГО**

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ

7

ВЫПОЛНЯТЬ КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИИ



**ПРИ СУЖЕНИИ ЗРАЧКОВ,
НО ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ
РЕАНИМАЦИЮ НУЖНО
ПРОВОДИТЬ
ДО ПРИБЫТИЯ МЕДПЕРСОНАЛА**

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ

- Если оказывает помощь один спасатель, то **2** «вдоха» искусственного дыхания делают после **15** надавливаний на грудину
- Если оказывает помощь **группа спасателей**, то **2** «вдоха» искусственного дыхания делают после **5** надавливаний на грудину.
- Для быстрого возврата крови к сердцу — приподнять ноги пострадавшего.
- Для сохранения жизни головного мозга — приложить холод к голове.
- Для удаления воздуха из желудка — повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка.

ВНЕЗАПГННАЯ СМЕРТЬ

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ

8

ОРГАНИЗОВАТЬ действия партнеров



**НЕЛЬЗЯ!
РАСПОЛАГАТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ
ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА**

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ

проводит непрямой массаж сердца, отдает команду «Вдох!» и контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ

проводит искусственное дыхание, контролирует реакцию зрачков, пульс на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии пострадавшего:
**«Есть реакция зрачков!
Нет пульса!
Есть пульс!»** и т.п.

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ


приподнимает ноги пострадавшего для лучшего притока крови к сердцу и готовится к смене партнера, выполняющего непрямой массаж сердца.

ВНЕЗАПТНАЯ СМЕРТЬ

ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

1

**НАНЕСТИ
УДАР КУЛАКОМ
ПО ГРУДИНЕ**



**Удар можно наносить
в положении пострадавшего
«сидя» и «лежа»**

2

**УЛОЖИТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО НА
СПИНУ**



**Комплекс реанимации можно
проводить только в положении
пострадавшего
«лежа на спине» на ровной
жесткой поверхности.**


ВНЕЗАПГННАЯ СМЕРТЬ

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ, НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ

1


**ПОВЕРНУТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО
НА ЖИВОТ**

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ
«ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ» ПОСТРАДАВШИЙ
ДОЛЖЕН ОЖИДАТЬ ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ



2

**УДАЛИТЬ
СЛИЗЬ И СОДЕРЖИМОЕ
ЖЕЛУДКА**



Периодически удалять
из ротовой полости
слизь и содержимое
желудка с помощью
салфетки или
резинового
баллончика



Можно использовать
пузырь со льдом или
бутылки

**НЕЛЬЗЯ!
ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА
В СОСТОЯНИИ
КОМЫ ЛЕЖАТЬ НА СПИНЕ**

СОСТОЯНИЕ КОМЫ

