При работе с обучающимися модулями на экране будут появляться всплывающие подсказки. Традиционный знак означает, что вы можете закрыть поле с подсказкой в любое удобное для себя время.

Пример

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

Кликните здесь, чтобы закрыть подсказку…

$$2\cos^2 x - 2\sin^2 x - 4\cos x - 1 = 0$$

а). Решите уравнение $2\cos 2x + 4\sin\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)-1=0$

б). Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\pi\right]$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

Применим формулу приведения: Название **«синус»** изменится на **«косинус», т.к.**

VI чет.

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}+x\right) = -\cos x$$

В VI чет. знак исходной функции синуса отрицательный

$$2\cos 2x - 4\cos x - 1 = 0$$

$$2\left(\cos^2 x - \sin^2 x\right) - 4\cos x - 1 = 0$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$2\cos^2 x - 2\sin^2 x - 4\cos x - 1 = 0$$

$$2\cos^2 x - 2\left(1-\cos^2 x\right) - 4\cos x - 1 = 0$$

$$2\cos^2 x - 2 + 2\cos^2 x - 4\cos x - 1 = 0$$

$$4\cos^2 x - 4\cos x - 3 = 0$$

$$4a^2 - 4a - 3 = 0$$

$$D = 4^2 - 4\cdot 4\cdot(-3) = 64$$

$$a_{1,2} = \frac{4\pm 8}{2\cdot 4}$$

$$a_1 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \notin [-1;1]$$

$$a_2 = -\frac{1}{2}$$

$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi - \arccos\frac{1}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

Нам будет удобно записать решение в виде **двух множеств**.

$$x = \pm\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) + 2\pi n$$

$$x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi n;$$

Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi;\ -\pi]$

$$x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$$

n=-1

$$\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$$

$$[-3\pi; -\pi] \qquad \le \qquad \le \qquad /:\pi$$

$$-3 \le \frac{2}{3} + 2n \le -1 \; / -\frac{2}{3}$$

$$-3\frac{2}{3} \le 2n \le -1\frac{2}{3}$$

$$-\frac{11}{3} \le 2n \le -\frac{5}{3} \quad / : 2$$

$$-\frac{11}{6} \le n \le -\frac{5}{6}$$

$$\boxed{n = -1,}$$

$$x = -\frac{4\pi}{3}$$

n=-1

$$-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$$

$$[-3\pi; -\pi] \qquad \le \qquad \le \qquad /:\pi$$

$$-3 \le -\frac{2}{3} + 2n \le -1 \; / +\frac{2}{3}$$

$$-2\frac{1}{3} \le 2n \le -\frac{1}{3}$$

$$-\frac{7}{3} \le 2n \le -\frac{1}{3} \quad / : 2$$

$$-\frac{7}{6} \le n \le -\frac{1}{6}$$

$$\boxed{n = -1,}$$

$$x = -\frac{2\pi}{3} - 2\pi,$$

$$x = -\frac{8\pi}{3}$$

Отбор корней с помощью графиков

б). Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\pi\right]$



$$-\frac{5\pi}{2}^{\backslash 3}-\frac{\pi}{6}=-\frac{15\pi}{6}-\frac{\pi}{6}=-\frac{16\pi}{6}=-\frac{8\pi}{3}.$$

$$-\frac{3\pi}{2}^{\backslash 3}+\frac{\pi}{6}=-\frac{9\pi}{6}+\frac{\pi}{6}=-\frac{8\pi}{6}=-\frac{4\pi}{3}.$$

Отбор корней с помощью числовой окружности.

б). Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\pi\right]$

Выбрать корни по тригонометрическому кругу удобно, т.к. этот промежуток …

ровно один круг $\left[-3\pi;-\pi\right]$

Б). Ответ:

$$x = -\frac{4\pi}{3}$$

$$x = -\frac{8\pi}{3}$$

Эти корни можно было найти иначе. Посмотрим…



Если вы хорошо понимаете тригонометрический круг, то этот способ можно с успехом применить