



Городской
«Команда
конкурс
скорой
ПОМОЩ



1 этап




Вопрос №1

Первая медицинская помощь при открытом переломе:

- 1) концы сломанных костей совместить;*
- 2) убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом;*
- 3) наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности и дать покой больному.*

Вопрос №2

Определите вид кровотечения:



- 1) артериальное;**
- 2) венозное;**
- 3) капиллярное.**

Вопрос №3

Первая медицинская помощь при обморожении:

- 1) растереть пораженный участок жестким материалом или снегом;*
- 2) создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на обмороженный участок, дать теплое питье;*
- 3) сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном.*

Вопрос №4

Определите вид перелома



- 1) открытый;**
- 2) закрытый.**

Вопрос №5


Чем характеризуется капиллярное кровотечение:

- 1) кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску;*
- 2) кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета;*
- 3) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.*

Вопрос №6

Определите вид кровотечения

- 1) артериальное;*
- 2) венозное;*
- 3) капиллярное.*



Вопрос № 7

Чем характеризуется венозное кровотечение?

- 1) кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску;*
- 2) кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета;*
- 3) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.*

Вопрос №8

Определите вид кровотечения

- 1) артериальное;*
- 2) венозное;*
- 3) капиллярное.*



Вопрос №9

*Укажите правила выполнения реанимации,
если в оказании ПМП участвует
один человек:*

- 1) одно вдувание воздуха, пять надавливаний на грудину;*
- 2) два вдувания воздуха, пятнадцать надавливаний на грудину;*
- 3) три вдувания воздуха, двадцать надавливаний на грудину.*

Вопрос №10

Какое кровотечение наиболее опасно?



артериальное;

венное;

3) *артериальное.*




Вопрос № 11

Какую первую помощь нужно оказать на месте происшествия при простой и неглубокой ране?

- 1) наложить стерильную повязку;*
- 2) промыть рану водой;*
- 3) обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку.*

Вопрос №12

Определите вид перелома



- 1) открытый;**
- 2) закрытый.**

Вопрос № 13

При потере сознания и понижении артериального давления без кровотечения необходимо:

- 1) пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать обезболивающее;*
- 2) пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать успокоительное средство;*
- 3) пострадавшего уложить так, чтобы его ноги были выше уровня головы.*

Вопрос №14

Выход крови из повреждённых кровеносных сосудов называется:

- 1) кровотечение;*
- 2) ушиб;*
- 3) рана.*



Вопрос № 15

На доврачебном этапе раны закрывают:

- 1) полуспиртовыми повязками;*
- 2) мазевыми повязками;*
- 3) сухими антисептическими повязками.*

Вопрос №16

Определите вид повязки



- 1) крестообразная;**
- 2) спиральная;**
- 3) уздечка.**

Вопрос № 17


Признаки открытого перелома:

- 1) сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности;*
- 2) сильная боль, деформация конечности, повреждение кожного покрова;*
- 3) синяки, ссадины на коже.*

Вопрос №18

Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении?

- 1) спиралевидная;*
- 2) колосовидная;*
- 3) восьмиобразная.*



Вопрос № 19

Какую помощь нужно оказать пострадавшему с болями в области сердца?

- 1) дать принять одну таблетку анальгина или аспирин;*
- 2) дать понюхать нашатырного спирта;*
- 3) дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель корвалола в 50 мл воды.*

Вопрос №20

*Кровотечение из вен конечностей
останавливается наложением:*

- 1) спиралевидной повязки на рану;*
- 2) давящей повязки на рану;*
- 3) жгута или закрутки.*



Вопрос №21

Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки?

- 1) лежа на животе;*
- 2) лежа на спине;*
- 3) лежа на спине с приподнятой верхней частью туловища.*



Вопрос №22

При сотрясении головного мозга наиболее характерными симптомами являются:

- 1) кровотечение из носа;*
- 2) тошнота, рвота, потеря сознания;*
- 3) головокружение.*



Вопрос №23

В каком положении транспортируют пострадавшего с переломами ребер и грудины?

- 1) полусидя;*
- 2) лежа на спине;*
- 3) лежа на боку.*



Вопрос №24

Смещение кости по отношению к ее нормальному положению в суставе это:

- 1) ушиб;*
- 2) вывих;*
- 3) перелом.*



Вопрос №25

Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей пострадавшего?

- 1) поднять голову выше;*
- 2) подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть голову;*
- 3) открыть рот пострадавшему.*

Вопрос №26

В какой последовательности необходимо выполнять первую помощь при вывихе?

А. Наложить на поврежденное место тугую повязку.

Б. Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

В. Дать пострадавшему обезболивающее средство.

Г. Обеспечить поврежденной конечности покой.

1) Б, В, Г, А.

2) Г, А, В, Б.

3) Г, Б, А, В.

Вопрос №27

Какая повязка накладывается при повреждении пальца?

- 1) крестообразная;*
- 2) спиральная;*
- 3) пращевидная.*



Вопрос №28

В какой последовательности необходимо выполнять первую помощь при закрытом переломе?

А. Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Б. Провести иммобилизацию (обездвижить место перелома).

В. Дать пострадавшему обезболивающее средство и положить на место травмы холод.

1) Б, В, А.

2) А, В, Б.

3) Б, А, В.

Вопрос №29

По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?

1) цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание;

2) пульс, высокая температура, судороги;

3) резкая боль, появление припухлости, потеря сознания.

Вопрос №30


Как наложить транспортную шину при переломе костей предплечья?

1) от кончиков пальцев до локтевого сустава;

2) от кончиков пальцев до верхней трети плеча;

3) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча.

2 этап



*Что не входит
в состав
автомобильной
аптечки?*



Аспирин

Жгут

Анальгин

Андипал

Бинт нестерильный

Бинт стерильный

5×10 см

5×10 см

Бинт нестерильный

5×5 см

Портативный
гипотермический

(охлаждающий) контейнер

Бальзам

«Золотая звезда»

Атравматическая

повязка МАГ 8×10 см

Димедрол

Лейкопластырь

бактерицидный

2,5×7,0 см

Лейкопластырь 1×500 см

или 2×500см

Раствор йода

спиртовой 5%

Салфетки стерильные для

остановки капиллярного и
венозного кровотечения

Бромгексин

Бинт эластичный
трубчатый медицинский

нестерильный

Вата

Нитроглицерин

Раствор аммиака

(нашатырный спирт)

Валидол

Средство для сердечно-
легочной реанимации

Карвалол

или настойка валерианы

Энтеродез или уголь
активированный

Ответ:

Андипал


Бальзам
«Золотая звезда»

Бромгексин

Димедр



3 этап



«НЕОТЛОЖКА»



Желаем вам
безопасной
дороги!

