

Сүйел.
Жұқпалы
МОЛЛЮСК

Орындаған: Нуржанова Е
топ: ЖТД-7курс 012-1к
Қабылдаған: Хабижанов А. Б

Сүйел

мүйізді қабықтармен жабылған эпидермалық түйіршіктер немесе тері қабатына шығатын қабыну. Олар адамның папилломатоздық вирусының кейбір түрлерінен таралады. Тары дәнінен ірі бұршаққа дейінгі көлемде және сары, сұр түсті болып келеді. Тікелей қатынастан немесе әртүрлі заттар арқылы да жұғады.



Қолайлы факторлар:

- ❖ Иммунологиялық қорғаныштың төмендеуі
- ❖ Вегетоневроз
- ❖ Акрацианоз
- ❖ Алақан мен табанның қатты терлегіштігі
- ❖ Жеке гигиена сақтамау



Түрлері:

- Қалыпты (тығыз, ауру сезімсіз 3-10мм өлшемді, беті тегіс емес) орналасатын жерлері: алақанның ішкі жағында, саусақтарда, бетте, бастын шашты жерінде.
- Табандық- жіп тәрізді өрімнің түйінінен түзіледі, шеттерін мүйізше қабат қоршап тұрады. Ауру сезімді болып келед. Аяқ әрдайым қатты қысылғанда және аяқ киімге қатты үйкеле бергеннен пайда болады.
- Жалпақ (ювенильді) – диаметрі 3-5мм домалақ, беті тығыз және тегіс түйін, түсі терінің түсіндей немесе сарғыштау. Бетте немесе алақанның сыртқы жағында шығады.
- Үшкір ұшты кандилома – ұсақ ақшыл қызыл түсті түйіндер, бір біріне қосылып мүйізді қабатқа ұқсас құрылым түзеді. Көбінесе жыныс мүшелерінде болады. Әр түрлі тітіркендіргіштердің (физикалық, механикалық, химиялық) әсері салдарынан қатерлі ісікке айналуы мүмкін.
- Кәрілік- жастық кератомалар, вирусты инфекциямен байланыссыз шығады. Сұр түсті немесе қоңыр, қара түсті.

Сақтық шаралары

- қолды жиі жуу;
- дербес сүлгіні пайдалану;
- ұстараны, қайшыны ыстық сумен жақсылап жуу;
- тырнақ тазалайтын щетканы таза ұстау;
- біреудің шұлығын, қолбағын және т. б. киімдерін кимеу.



Емдеу жолдары

- дәрі-дәрмекпен емдеу; вирусқа қарсы дәрілер немесе вирусқа қарсы иммунизация. Бірақ жалпақ сүйелдерге әсер етпеуі мүмкін.
- Химиотерапия (фарезол, салицилды қышқыл, 5-фторурацил мазь түрінд, крем)
- Иммунотерапия (candida6 trichophylin usp антигендерін егу немесе төмен молекулалы имиквидазохиноламинді (цитокин мен интерферонның индукторы) егу)



- Хирургиялық жолмен емдеу (сұйық азот, хлоэтан, диметил эфирі, электрокоагуляция, гальваникалық тоқпен, Дарсонвальды тоқпен, емдейді)
- халықтық медицина жолымен емдеу;
 - өсімдіктер шырыны
 - әр түрлі шөптердің жапырақтары мен тұнбалары
- Сүйелді (әсіресе балаларға шыққанын) үйде емдеуге болмайды. Қышқыл мен сілтіні жөн-жосықсыз басу теріні күйдіріп, тыртық жасауы мүмкін. Сүйел пайда болғанда дәрігерге қаралған дұрыс.



Жұқпалы моллюск

- ▣ **Жұқпалы моллюск** — вирусты жұқпалы ауру. Тері және шырышты қабаттарда пайда болады.
- ▣ Аурудың пайда болуы
- ▣ Орамал, төсек-орын мен іш киім арқылы және науқаспен тығыз қатынас кезінде жұғады. Жасырын кезеңі бірнеше аптадан, бірнеше айға дейін созылады. Теріде ортасы ойыс, қызғылт түсті көптеген ұсақ түйіндер пайда болады. Бірақ кейде бірнеше түйіндер бірігіп, бір үлкен түйінді құрайды. Түйіндерді тырнақпен немесе пинцетпен басқанда, ортасындағы ойысынан ақ түйіршікті зат шығады. Контагиозды моллюскінің негізгі орналасатын жері: мойын, кеуде, іш, алақан аймақтарында орын алады.

- Балаларды бет , дене және аяқ қолда шығады. Үлкендерде: жыныс қабатында, іште, санның ішкі жағында
- Көбінесе ауру сезімсіз, қышу сезімді.
- Диаметрі 2-5 деиін
- Ортасында шұңқырша болады, жұмсақ, ақ түстес.
- Басында қатты, тері түстес, уақыт өте жұмсақ болады.



- ❖ Жасырын кезеңі 2 аптадан бірнеше айға дейін. Басында 1-2мм ұсақ, жалпақ түйін болады, сары-ақ түстес. Уақыт өте келе (5-7мм)үлкен жартышарлы, ортасында шұңқырша болады. Басқан кезде ақ қаймақ тәрізді бөлінді пайда болады.



Емі

- Химиялық күйдіру (йод, сутегінің асқын тотығы,) Термиялық (лазер, диатермакоагуляция, криотерапия)
- Антисептикалық препараттар
Лидокаин. Фукарцин ары қарай инфекцияның жайылмауы үшін

Қолданылған әдебиеттер:

- ▣ *Якобзон Л.Я.* Моллюск заразительный // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
- ▣ *Корсунская И. М., Мазанкова Л. Н., Тамразова О. Б.* Вирусные дерматозы у детей // Практика педиатра. — 2005
- ▣ *Щербаков И. М.* Контагиозный моллюск, типичные и атипичные формы // Вестник дерматологии и венерологии.