

**По страницам
Красной книги
природы
Ленинградской
области**

Класс Млекопитающие

18 животных этого класса требуют особого внимания!

*Скрипникова Наташа
Клирикова Лида
Лизнева Рита
Хочунская Лена*

В ленинградской области обитает 2 подвида

Ладожская нерпа и Балтийская кольчатая нерпа

Статус 2 (EN)

исчезающий подвид

Кольчатая нерпа



Балтийская кольчатая нерпа

Залежки нерпы образуют на каменистых грядах, где располагаются в непосредственной близости друг от друга, иногда к ним присоединяются и серые тюлени. Питается нерпа в основном морским тараканом и рыбой (килькой, корюшкой, сайрой, бельдюгой). Взрослые нерпы в Финском заливе держатся постоянно, концентрируясь в летнее время в его южной части.

Ладожская кольчатая нерпа

Статус 3 (LG) - требующий внимания подвид. Летом предпочитает держаться в прибрежной зоне северной части озера, изобилующей каменными грядами, отдельными крупными камнями и островками; зимой звери концентрируются в южных и юго-западных частях акватории озера, устраивая залежки на льду. Питается нерпа преимущественно корюшкой, ершом, ряпушкой, колюшкой и рачками



Росомаха

Статус 3 (VU) – уязвимый вид

Вид широко распространенный в таежной зоне и южной лесотундре, но в то же время очень своеобразный не похожий на других представителей семейства куньих. Росомаха-животное тяжелого массивного сложения на коротких и сильных лапах. Хвост короткий. Внешний вид росомахи - это миниатюрный медведь. Но в то же время гибкое и ловкое животное. Длина тела 70-105 см. Высота в плечах около 40 см. Основу зимнего питания составляют копытные звери, лоси, чаще молодняк, в районах увеличения численности волка- увеличивается доля падали

Факторы угрозы

Уничтожение массивов
темнохвойных лесов,
обеднение кормовой базы
(падение численности
тетеревиных птиц, копытных).
Низкий потенциал
размножения.



Европейская косуля

Статус в Красной книге

3 (VU) – уязвимый вид

Обычный вид фауны России. Большое число местных популяций поддерживается искусственно в охотничьих хозяйствах. Длина тела 120-130 см. Весит до 25 кг. Летнее питание - разнотравье, зимой побеги древесно-кустарниковой растительности. В Ленинградской области находится на северных границах ареала и поддерживается искусственно в лесохозяйственных хозяйствах. Численность невелика 450-480 особей. Наиболее устойчивая популяция существует в Кургальском заказнике. Лимитирующим фактором являются многоснежные зимы и браконьерский отстрел.



Европейская норка

Статус в Красной книге

2 (EN) – исчезающий вид

Водится в Восточной Европе, по берегам рек, питается рыбой, лягушками, раками. Долгое время являлась объектом промысла из-за ценного меха. В настоящее время её численность сокращается повсеместно из-за вытеснения норкой американской

Факторы угрозы

Европейская норка

вытесняется американской,

интенсивно заселяющей ее

станции и успешно

конкурирующей с ней из-за

кормовых объектов. Другой

причиной сокращения

численности вида следует

признать перепромысел в

неблагоприятные для него

годы (обмеление рек и

ручьев в засуху, загрязнение

водоемов и сокращение

запасов рыбы и раков).



Список литературы

- М.Д.Свидерская, В.М.Храбрый Сохраним для потомков, Лениздат, 1985
- <http://www.muldyr.ru/>
- <http://www.naukaspb.ru/>
- http://www.ecosafe.pu.ru/Red_Book/Bred.htm
- <http://www.paslo.ru/redbook1.html>
- <http://www.repolow.ru/istra.htm>
- <http://ecoclub.nsu.ru/raptors/species/pandion.shtm>
-