

ФГБОУВО
ТюмГМУ

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Операция наложения противоестественного заднего прохода по способу Майдля

Выполнил: студент 422 группы леч.фак.
Борсуков А.П.

Стома – хирургически созданное отверстие,
соединяющее просвет внутреннего органа
С поверхностью тела

Свищ толстой кишки накладывают для
отведения кишечного содержимого при
Неоперабельном раке; а кроме того, к нему
прибегают как к предварительному этапу

операции при резекции


Толстой кишки. Наиболее часто свищи
накладывают на слепую, поперечную
ободочную


и сигмовидную кишки

Показанием для наложения противоестественного заднего прохода являются ранения, неоперабильный рак и рубцовые сужения прямой кишки. Различают временный и постоянный противоестественный задний проход. Первый производится при ранениях прямой кишки, второй – при раке и рубцовых сужениях ее.

Способ Майдля (Maydl)


Способ Майдля (Maydl). Разрез кожи проводят длиной 10—16 см слева, параллельно и на 2 поперечных пальца выше паховой связки. Рассекают апоневроз наружной косой мышцы живота. По ходу волокон разделяют или рассекают внутреннюю косую и поперечную мышцы. Между двумя пинцетами рассекают брюшину. Рану брюшной стенки растягивают крючками и извлекают из брюшной полости петлю сигмовидной кишки. Под кишку через отверстие в ее брыжейке проводят марлевую держалку, которую фиксируют зажимом.





Для этого приводящее и
отводящее колена
Петли на протяжении 4-5 см
сшивают рядом
Узловых серозно-мышечных
швов

Затем рядом узловых швов
подшивают париетальную
Брюшину к коже по краям
операционного разреза и
приступают к образованию
«шпоры»



Извлекают марлевую держалку и кишку подшивают узловыми серозно-мышечными швами к париетальной брюшине. Через несколько дней выведенную петлю кишки вскрывают

