



Укусы змей насекомых. Оказание ПОМОЩИ

Заведующий школой медицины катастроф
Ю.Н. Червяков

г.Пенза





Клинические формы

- Анафилактический шок
- Отек Квинке
- Крапивница
- Генерализованная эритема
- Ляринго-бронхоспазм




Признаки

- боль в месте укуса
- озноб
- головокружение
- страх смерти
- чувство тяжести в груди
- тахикардия
- снижение АД
- одутловатость лица
- зуд кожи
- сыпь по типу крапивницы
- отёк гортани (осиплость голоса, лающий кашель, шумное дыхание)
- бронхоспазм
- тошнота, рвота
- боли в животе
- жидкий стул



Причины





Причины смерти

- Нарушение проходимости дыхательных путей (основная)
- Стойкое снижение АД
- Отёк головного мозга



Неотложная помощь

- личная безопасность
- уложить больного с приподнятым ножным концом
- оценка ABC (особое внимание уделить проходимости дыхательных путей,
- т. к. нарушение проходимости дыхательных путей основная причина смерти)
- при признаках клинической смерти проведение сердечно-лёгочной реанимации



Неотложная помощь (2)

- адреналин (при снижении АД в/в или э/т, при бронхо-и ларингоспазме, отёке гортани п/к) 0,5 - 1 мг.
- обеспечение венозного доступа, инфузионная терапия, внутривенно струйно глюкозо -солевые растворы в дозе 20-40 мл/кг
- преднизолон 2 - 5 мг на кг массы тела
- введение антигистаминных препаратов (тавегил, супрастин, димедрол)



Клиника

