


**ВОГНЕПАЛЬНІ ТА  
НІЕВОГНЕПАЛЬНІ  
ПОШКОДЖЕННЯ  
ЩЕЛЕПІ**



# СТАТИСТИКА

- Хворі з ушкодженнями кісток обличчя складають за даними від 20% до 30% в структурі щелепно-лицевих відділень.

# Класифікація травматичних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки по етіології

- Побутова.
- Виробнича: промислова,
- Сільськогосподарська.
- Транспортна.
- Вулична.
- Спортивна.
- Інші (лікарські помилки, патологічні переломи, епілепсія).

# Класифікація невогнепальних переломів нижньої щелепи (Лур'є, Аржанцев, Іващенко, 1975)

## *Характер пошкоджень:*

- 1. Ізольовані.
- 2. Поєднані:
  - 2.1. з черепномозковою травмою;
  - 2.2. з ушкодженнями м'яких тканин інших ділянок;
  - 2.3. з ушкодженнями інших кісток скелета.

# Класифікація невогнепальних переломів нижньої щелепи (Лур'є, Аржанцев, Іващенко, 1975)

*Кількість переломів :*

- 1. Поодинокі.
- 2. Подвійні:
  - 2.1. односторонні;
  - 2.2. двосторонні.
- 3. Потрійні і множинні.

# Клінічна класифікація переломів нижньої щелепи

- I. Переломи альвеолярного відростка нижньої щелепи.
- II. Одинарні переломи тіла нижньої щелепи:
  1. Переломи центрального відділу нижньої щелепи.
  2. Переломи тіла нижньої щелепи на боковій ділянці.
  3. Переломи нижньої щелепи в ділянці кута.
- III. Переломи гілки нижньої щелепи.
- IV. Подвійні переломи нижньої щелепи:
  1. Подвійні переломи тіла нижньої щелепи в центральній ділянці.
  2. Подвійні переломи тіла нижньої щелепи в боковій ділянці.
    - A) з одної сторони;
    - B) з обох сторін
  3. Подвійні переломи тіла нижньої щелепи в боковій та центральній ділянках.

**4. Подвійні переломи тіла нижньої щелепи в боковій ділянці і в ділянці кута з протилежного боку.**

**5. Переломи тіла нижньої щелепи в центральній ділянці і в ділянці кута.**

**6. Переломи тіла і гілки нижньої щелепи:**

**а) перелом тіла в боковій ділянці і гілки (з одної сторони)**

**б) перелом тіла в боковій ділянці і гілки (з обох сторін)**

**V. Потрійні та множинні переломи нижньої щелепи.**

**VI. Переломи нижньої щелепи при частковій та повній відсутності зубів.**


# Класифікація вогнепальних переломів нижньої щелепи

1. Переломи типу лінійних.
2. Колоті.
3. Крайові переломи зі збереженням безперервності щелепи.
4. Дірчасті.
5. Переломи з сегментарним переломом щелеп.
6. Відриви значних частин щелепи.
7. Поєднання вказаних видів переломів.

# Класифікація вогнепальних переломів нижньої щелепи



# Класифікація вогнепальних переломів нижньої щелепи



# Клініка

## Скарги:

- біль;
- асиметрія обличчя
- припухлість м'яких тканини
- порушення функцій жування, ковтання, мови
- кровотеча з порожнини рота
- порушення загального характеру.


# Клініка


## Біомеханіка зміщення відламків

3 важливих моменти:


1. Різна вага- тяжкість відламків, т.о. зазвичай несиметричні переломи.
2. Сила удару, зміщаюча відламки.
3. Порушення фізіологічної рівноваги жувальних м'язів і нерівномірною тягою їх окремими групами м'язів та їх пучків.

# Направлення тяги м'язів, прикріплюючих до нижньої щелепи(по Ізару)







## Зміщення відламків нижньої щелепи при переломі в боковій ділянці(між 2-им малим і першим великим корінним зубом)




1. Зміщення відламків при переломі нижньої щелепи спереду кута.
2. Зміщення відламків при односторонньому переломі суглобового відростка



# Двосторонній перелом нижньої щелепи попереду кутів. Відвисання переднього відділу щелепи (середнього відломку)




# Подвійний перелом нижньої щелепи в підборідній ділянці. Зміщення відламків.




**1. Двосторонній перелом суглобових відростків нижньої щелепи.**

**2. Зміщення відламків при односторонньому подвійному переломі нижньої щелепи.**



# Зміщення відламків при потрійному переломі тіла нижньої щелепи




# КЛІНІКА


## ■ Об'єктивно:

- асиметрія обличчя;
- патологічна рухливість відламків (бімануальна пальпація);
- симптом «сходинки»;
- симптом Венсана;
- позитивний симптом лінійного навантаження;
- порушення прикусу.

Зміщення відламків нижньої щелепи при  
косому переломі, який проходить на рівні  
правого бокового різця



# Положення пальців при визначенні рухливості відламків нижньої щелепи



# Загальні принципи лікування переломів нижньої щелепи

1. Репозиція – точне співставлення відlamків.
2. Співставлення відlamків в положенні тісного прилягання.
3. Фіксація – надійне скріплення співставлених відlamків.
4. Іммобілізація – виключення з функції травмуючого органа.
5. Поступове виключення функціонального навантаження.


Транспортна або тимчасова іммобілізація здійснюється до доставки потерпілого в спеціалізований лікувальний заклад.

*Види транспортної іммобілізації:*

- іммобілізація за допомогою пращоподібних пов'язок;
- іммобілізація за допомогою лігатурного зв'язування зубів.


# Нестандартні працюоподібні пов'язки

- вісімкоподібна пов'язка;
- марлева пов'язка;
- тім'яно-підборідна;
- із лейкопластиря по Тобо.




# Нестандартні працоподібні пов'язки

- використовують шапку-ушанку;
- використовують пілотку;
- використовують каску.




# Стандартні працюючі пов'язки

- по Ентіну;
- по Померанцевій-Урбанській;
- гіпсова;
- брезентова.



# Лігатурне зв'язування зубів

- по Айві;
- по Гейкіну;
- по Вільга;
- по Гауптмееру;
- по воєнно- медичній академії.



# Постійна лікувальна іммобілізація нижньої щелепи


- ортопедичні методи;
- оперативні методи;
- оперативно-ортопедичні методи.

# Ортопедична іммобілізація (назубні металічні шини)


- по Тігерштедту;
- по Васільєву;
- по Баронову;
- по Попудренко-Степанову;
- по Центіло;
- за допомогою брекет-системи.



Назубные проволочные шины Ти-  
герштедта (схема).




Ленточная шина Васильева (схема).



Варианты межчелюстного лига-  
турного связывания зубов по Баронову  
(схема).


# Шини по Тігерштедту

- гладка шина-скоба;  
(лікування переломів  
альвеолярного відростка  
і вивихів зубів);
- шина с розпірковим  
вигином (при дефектах  
зубних рядів).



# Шини по Тігерштедту

- шина з похилою площиною;
- двощелепна шина с зачепними петлями та резиновою тягою.



# Позитивні сторони металевих шин:


- Індивідуальне виготовлення для кожного хворого.

# Негативні сторони металевих шин:

- Тривалий час виготовлення;
- травматизація зачепними петлями м'яких тканин порожнини рота;
- складність в гігієнічній підтримці порожнини рота;
- складності в годуванні хворого;
- ускладнення із сторони СНІЦС;
- негативні результати лікування ангулярних переломів.

# Назубні шини із швидкотвердіючої пластмаси:

- по Швиркову;
- по Єгорову-Маркіну;
- по Бадзошвілі;
- по Поліпасю;
- по Фрігофу;
- по Керейко;
- по Сазама.




# Негативні сторони пластмасових шин:

- необхідність зубо-технічної лабораторії;
- складності в знятті шини;
- наявність алергічних реакцій на пластмасу.

# Зубоясеневі і наясеневі шини:

- по Веберу;
- по Ванкевич;
- по Порта;
- по Лімбергу.



# Оперативні методи: *показання*

- беззубі щелепи;
- виражене зміщення відламків;
- інтерпозиція м'яких тканин;
- оскольчаті переломи;
- у хворих з порушенням психіки;
- негативне ортопедичне лікування;
- при поєднаних пошкодженнях.

# Пряний остеосинтез

Фіксуючі пристосування безпосередньо з'єднують кінці уламків: проходять через лінію перелому у середині кістки, накладаються на поверхню кістки або частково вбудовують в кістку.

# Методи прямого остеосинтеза

- *Внутрішньокісткові*: штифти, стержні, спиці, винти.
- *Надкісткові*: кістковий клей, кругові лігатури без ясеневих шин, напівмуфти і жолобки які охоплюють край щелепи.
- *Внутрішньокісткові - надкісткові* : кістковий шов, кісткові пластиинки і мініпластиинки.

# Непрямий остеосинтез


Фіксуючі конструкції накладаються на кістку або впроваджуються в неї на деякій відстані від місця перелому, а закріплення відламків проводиться внекістковій рані.

# Методи непрямого остеосинтеза

- Внутрішньокісткові: спиці Кіршнера, штифтові позаротові апарати.
- Накісткового: підвішування нижньої щелепи до верхньої (назо-мандibулярна, вилично-, фронтально-мандibулярна фіксація), кругові лігатури з наддесневої шини і протезами, клемові позаротові апарати.


# Кістковий шов (матеріали)

- стальна проволка;
- тітанова ;
- ніхромова;
- танталова;
- віталіум;
- ловсанова ніть;
- поліамідна ніть.




# Кістковий шов (варіанти)

- трапеційоподібний;
- хрестоподібний;
- восьмиподібний;
- петлеподібний;
- подвійний.



# Кістковий шов (методи)

- по Кабакову;
- по Малєвічу;
- по Пікалову;
- по Йовчеву;
- по Кручинському;
- по Іващенко;
- по Матросу-
- Таранцю.




Етапи накладання кісткового шва капроновою ниткою крізь три отвори в кістці за Малевичем.

# Негативні сторони кісткового шва

- ослаблення фіксації уламків;
- прорізування проволоки і резорбція кістки в області отвору;

# Внутрішньокісткові штифти та спиці (методи)


- по Макієнко;
- по Грігорашу;
- по Павлову;
- по Любарському.



# Внутрішньокісткові штифти та спиці


## (негатині сторони)

- Вихід штифта за межі кістки;
- Травма судинно-нервового пучка;
- Ротація стержня;
- Травма навколишніх тканин і органів..




# Накісткові пластинки


- за Павловим;
- за Деспотовим;
- за Робінзоном.




# Накісткові міні-пластиини система «Спатру» (Франція)



# Зшиваючі апарати




Сшивающий аппарат Жадовского.



І. Сшивающий аппарат Карапетяна.

# Оперативно-ортопедичні методи



а

б

Рис. 17.30. Внеочаговый остеосинтез спицей Киршнера по методу Донского (схема).  
а — создание костного туннеля для спицы; б — фиксация спицы к назубной шине.

# Остеосинтез за допомогою позаротових апаратів

- по Рудько;
- по Пенну-Брауну;
- по Єрмолаєву-Кулагову;
- по Бернадському;
- по Бадзошвілі;
- по Соловйову-Магарелла.




Рис. 17.35. Внеротовые аппараты.  
а — Пенна—Брауна; б — Рудько; в — Збара-  
жа; г — Бернадского; д — Панчохи; е —  
Уварова; ж — Роджерса—Андерсена.

# Остеосинтез за допомогою позаротових апаратів (види)

- фіксуючі апарати;
- репонуючі апарати;
- компресуючі апарати;
- дістрогіруючі апарати.




# Показання до позаротовим аппаратам

- наявність дефекту кістки щелепи;
- хронічний остеомієліт щелепи;
- наявність в щелепі зачатків постійних зубів.




# Класифікація нижньої щелепи по Ле Фор



**Види переломів верхньої щелепи за Ле Фором:**


# Класифікація переломів верхньої щелепи за Васмундом і Гереном



# Класифікація вогнепальних переломів верхньої щелепи за Лукомським

- переломи в межах щелепи;
- суборбітальні переломи;
- субазальні переломи.

# Класифікація вогнепальних переломів верхньої щелепи по Збаржу



# Ле Фор I (нижній тип)

- Скарги:
- біль;
  - асиметрія обличчя;
  - рухливість альвеолярного відростка в цілому або окремій ділянці;
  - кровотеча;
  - порушення функцій жування, ковтання, мови;
  - загальні розлади.

# Ле Фор I (нижній тип)

Об'єктивно: - на шкірі обличчя гематоми,  
садна, рани;

- обличчя асиметричне;
- з рота витікає слина з  
домішкою крові;
- порушення прикусу (ранній контакт  
ріжучих країв передніх зубів);
- пальпаторно визначається рухливість  
відламків різного ступеня (плаваюче небо);
- рентгенологічне дослідження у двох  
проекціях.

# Ле Фор II-III (середній і верхній тип)

Скарги (якщо хворий у свідомості):

- біль у різних відділах обличчя;
- головний біль;
- головокружіння;
- порушення функцій жування, ковтання, мови;
- набряк обличчя;
- неможливість змикання зубних рядів.

# Ле Фор II-III (середній і верхній тип)

Об'єктивно: - набряк м'яких тканин.

При поперечних переломах набряк локалізується в ділянці крил носа, верхньої губи, щік.

При субборбітальних і суббазальних набряк м'яких тканин на значному протязі.

Подовження або сплощення середньої частини обличчя (за рахунок зміщення щелепи вниз або назад).

# Ле Фор II-III (середній і верхній тип)

- Об'ективно:
- кровотеча з розривів шкіри, порожнини рота, носа, вух;
  - лікворея (при переломах основи черепа);
  - при пальпації болючість, рухливість верхніх щелеп і величних кісток, кісток носа;
  - симптом сходинки в області орбіт величних дуг;
  - прикус від відкритого до хибної прогнатії н/щ.

# Ле Фор II-III (середній і верхній тип)

Об'єктивно: «симптом окулярів» буває при пошкодженні місцевих тканин і при переломі основи черепа.

Діагностика: за часом появи, по локалізації щодо кругового м'яза ока, кольором.

При переломі основи черепа симптом з'являється через кілька годин або днів після травми, завжди знаходиться в межах кругового м'яза ока, різко багряного кольору.

# Ле Фор II-III (середній і верхній тип)

Об'єктивно: «симптом ліквореї» витікання спинно-мозкової рідини з носа і вух.

Діагностика:

Тест «носової хустки», спинно-мозкова рідина – хустка м'яка, носовий секрет жорсткий накрохмалений.

Тест «подвійної плями» якщо кров - бура пляма, при ліквореї - середина бура, перефирії плями світлі.

# Клініка вогнепальних переломів (особливості)

Завдяки нерухомому зв'язку верхньої щелепи з кістками мозкового черепа, близькістю головного мозку, очних яблук, органів слуху і нюху симптоматика вогнепальних ушкоджень різноманітна.

# Клініка вогнепальних переломів (особливості)

- При пораненнях самої верхньощелепної кістки пошкодження відзначаються на місці прикладання живої сили ранящого снаряда і по ходу його просування.
- Найчастіше пошкоджуються тонкі стінки верхньощелепної пазухи в яких знаходяться кров, осколки кісток, зуби, чужорідні тіла.

# Клініка вогнепальних переломів (особливості)


- При пошкодженні верхньої щелепи по шляху просування раневого снаряда пошкоджуються кістки основи черепа, головний мозок, ЛОР-органи, різні нервові і судинні утвори. Звідси неврологічна симптоматика.

# Лікування переломів верхньої щелепи

У першу чергу лікуємо  
загальні розлади, потім  
проводимо місцеве лікування

# Транспортна іммобілізація переломів верхньої щелепи

## нестандартні засоби іммобілізації




# Транспортна іммобілізація переломів верхньої щелепи

Стандартна  
дощечка Лімберга



Временное закрепление верхней челюсти на стандартной деревянной дощечке (Лимберг).

# Транспортна іммобілізація переломів верхньої щелепи




Временная иммобилизация верхней челюсти деревянной палочкой (схема).



Транспортная иммобилизация верхней челюсти при помощи дощечки (схема).

# Транспортна іммобілізація переломів верхньої щелепи


Фіксація верхньої  
щелепи, нижньої  
за допомогою працо-  
подібної пов'язки.



Закрепление верхней  
челюсти на нижней челюсти под-  
бородочной працой и межзубными  
распорками.


# Ортопедичні методи лікування верхньої щелепи

- Апарат Аржанцева
- Апарат Петрова
- Шина Вебера
- Апарат Орлова
- Піднебінна ложка Галмоша-  
(«оленьи рога»)




# Ортопедические методы лечения верхней челюсти

- Шина-ложка Лимберга
- Шина-ложка по Вильге
- Метод Фальтина
- Метод Романова
- Ложка Уляницкого




# Ортопедичні методи лікування верхньої щелепи

- Метод Вассменда
- Метод Збаржа
- Стандартний комплекс Збаржа




# Ортопедичні методи лікування верхньої щелепи

- Стандартний комплекс Збаржа




# Хірургічні методи лікування

## ■ Остеосинтез верхньої щелепи по Макієнко



# Хірургічні методи лікування

- По методу  
Роу-Кіллі
- По методу  
Фальтіна-Адамса
- По методу  
Федершпіля



ДЯКУЮ  
ЗА УВАГУ!