

- ▶ **Ойылу**-терінің асты бұлшық ет сүйек қабыршағы шырышты қабатының зақымдануы.
- ▶ Оның себебі жұмсақ еттердің, тіндердің зақымдануы.



# Белгілері


- ▶ Терінің бозаруы
- ▶ Қызаруы
- ▶ Көк дақ пайда болуы
- ▶ Ұлпалардың ісінуі
- ▶ Көпіршік
- ▶ Терінің сырылуы
- ▶ Бұлшық еттің зақымдануы




# Ойылудың пайда болу себебтері

- ▶ Науқас жалпы күтімінің нашар болуы
- ▶ Сал және гипсте жатқан науқас
- ▶ Терінің сезімталдығы бұзылғанда
- ▶ Қан айналымының бұзылуы
- ▶ Дене қызуы көтерілгенде
- ▶ Зәр және нәжістің ұстамауы кезінде
- ▶ Анемия кезінде
- ▶ Науқас наркозда жатқан кезде
- ▶ Ассит кезінде
- ▶ Жаймалары қыртыс және тамақ қалдықтары қалғанда
- ▶ Науқас бір қалыпта және естүссіз жатқанда

# Ойылудың пайда болатын негізгі жерлер

Желке, жауырын, омыртқа, шынтақ, жамбас, құйымшақ, құлақ, иық, тізе, балтыр, өкше








Науқастың  
жағдайына және  
диагнозна қарай 1-2  
күнде ойылу пайда  
болуы мүмкін



# Кезеңдері

- ▶ Терінің қызаруы қызылдақ пайда болуы
- ▶ Терінің зақымдалуы көпіршік 4 мл
- ▶ Тері астының зақымдануы
- ▶ Бұлшық ет сүйек зақымдануы
- ▶ Струп

Стадия 1



Стадия 2



Стадия 3



Стадия 4













**Пролежни 3-4 стадии,  
местные гнойные  
осложнения, сепсис**



# Ойылудын алдын-алу шаралары



Науқастардың іш киімін және төсек жаймаларын ауыстыру

Науқаста ойылу көп болса тәулігіне 1 рет нортон ватерлоо шкаласымен өлшеу

Ыстық су және күшті жуатын заттарды қолданбау

Науқастын 2 сағ жату қалпын ауыстыру