

# Лечение ларинготрахеита

# Отхаркивающие при трахеите не показаны

## (показаны при бронхите)

- **Таблетированные препараты**
- Ацетилцистеин (табл., порошок, сироп) АЦЦ, Флуимуцил, Викс Актив Бромгексин
- Амброксол (коделак бронхо – влажный кашель; лазолван)
- Карбоцистеин
- **Средства на основе лекарственных трав:**
- Гербион, Геделикс, Проспан – сиропы с экстрактом плюща.
- Доктор Тайсс – подорожник
- Бронхикум, Бронхипрет - средства с тимьяном
- Термопсол (термопсис)
- Мукалтин (на основе корня алтея)
- **Ингаляции**
- Мать-и-мачеха, солодка, душица, багульник, ромашка, календула, шалфей

# Противокашлевые

- Противокашлевые средства применяют в тех случаях, когда кашлевая реакция не обусловлена необходимостью удаления секрета (мокроты) из дыхательных путей (сухой непродуктивный кашель).

# Противокашлевые центрального действия

- Противокашлевые средства центрального действия подавляют кашлевой рефлекс, угнетая соответствующие участки продолговатого мозга. Основными средствами этой группы являются производные морфина – кодеин и этилморфин, а также бутамират (синекод, коделак нео), глауцин, окселадин и преноксдиазин, декстрометорфан. Кроме кодеина и этилморфина, остальные препараты этой группы не угнетают дыхательный центр. Преноксдиазин к тому же снижает чувствительность слизистой оболочки дыхательных путей (-- местноанестезирующее действие).

# Противокашлевые периферического действия

- Противокашлевые средства периферического действия влияют на чувствительные окончания в слизистой оболочке дыхательных путей. Они оказывают смягчающее и местноанестезирующее действие, уменьшая поступление “кашлевых стимулов” из гортани, трахеи и бронхов. Типичным примером такого лекарства является ацетиламинонитропропоксибензен, типепидин, преноксдиазин (либексин).

- Rp.: Tab. Libexini 0,1 №20  
D.S. По 1 таб. 3 р/д.
- **Для взрослых:** Средняя доза для взрослых составляет 100 мг 3-4 раза/сут (по 1 таб. 3-4 раза/сут). В более сложных случаях - по 2 таб. 3-4 раза/сут или по 3 таблетки 3 раза/сут. Средняя доза для детей, в зависимости от возраста и массы тела 25-50 мг три или четыре раза в день (по 1/4 - 1/2 таб. 3-4 раза/сут).