

# Австралопитек



Австралопитек – это группа ископаемых высших приматов, кости которых впервые были обнаружены в пустыне Калахари (Южная Африка) в 1924 году, а затем в Восточной и Центральной Африке.




**Австралопитек афарский** - вымерший вид австралопитека, семейство гоминид, живший около 4 миллионов лет назад.

Австралопитек афарский получил своё имя по находкам в так называемом Северном Афарском треугольнике в Эфиопии.



**Австралопитек африканский** - вымерший вид австралопитека, семейство гоминид, живший около 3,5—2,4 миллиона лет назад. В отличие от афарского австралопитека имел более обезьяноподобный скелет, но более объёмный череп.



**Австралопитек седиба** - вид австралопитеков, известный по останкам, возраст которых оценивается в 1,78—1,95 млн лет.



**Парантроп эфиопский** - ископаемый вид рода парантропов («массивных австралопитеков»), обитавший в Восточной Африке около 2,5 миллионов лет назад. Это наиболее древний из парантропов, известных науке.

Первая находка, относимая к данному виду, — это обломок нижней челюсти, обнаруженный в 1967 году в долине реки Омо в Эфиопии.



**Зинджантроп (Парантроп Бойса) - самый массивный вид парантропов, обнаруженный в 1959 г. супругами Лики в восточноафриканских ущельях Олдувай, Кооби-Фора, Локалеи и ряде других. Они датированы от 2,5 до 1 млн лет назад. Вплоть до 1972 года считался «не**



**Робустус (*Paranthropus robustus*)** - вид ископаемых высших приматов, обнаруженный в Южной Африке в 1938 году южноафриканским доктором и палеонтологом Робертом Брумом. Останки были датированы периодом от 2 до 1,2 млн. лет. Считаются родственной австралопитекам тупиковой ветвью эволюции человека.

