

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of a network of light blue lines and circles that resemble a circuit board or a data network. The lines are of varying thickness and connect to small circles of different sizes, creating a complex, branching structure.

ΒΕΦΡΟΗ

ДӘРІЛІК ЗАТ-БЕФРОН®

- Саудалық атауы – Бефрон
- Халықаралық патенттелмеген атауы – Ибупрофен
- Дәрілік түрі – суспензия түрінде ішке қолдануға арналған
100мг/5мл

ҚҰРАМЫ:

- Активті заты – ибупрофен 100 мг;
- Көмекші заттар : лимон қышқылының моногидраты, натрий цитратының дигидраты, натрий бензоаты, сорбитол 70%, жүзім ароматизаторы, таза су және т.б

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ТОБЫ:

- Қабынуға қарсы және ревматикаға қарсы препарат
- Стероидты емес қабынуға қарсы

ФАРМАКОКИНЕТИКАСЫ:

- Асқазан ішек жолдарында тез сіңеді. Әсер ету уақыты 1-2 сағат. Бауыр метаболзіміне ұшырайды. Қан плазмасындағы ақуыздармен байланысы 90%. Бүйрекпен шығарылады (өзгермеген түрде артық емес 1%) және аз дәрежеде өтпен бірге шығарылады.

ФАРМАКОДИНАМИКАСЫ:

- Бефрон – стероидты емес қабынуға қарсы препарат. Ауру сезімін басу үшін, дене температурасының ыстығын төмендету үшін және қабынуға қарсы қолданады.

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТКІШТЕРІ:

- Бефрон 3 айлық баладан 12 жастағы балаларға қолдануға болады егер, дене қызуын түсіруге және ауру сезімін басуға арналған жағдайда:

1. Бас немесе тіс ауырған кезде
2. Тұмау
3. Тамақ немесе құлақ ауырған жағдайда
4. Жіті респираторлық инфекциялар кезінде
5. мигрень

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ ЖӘНЕ ДОЗАСЫ:

○ Қолданар алдында флаконды жақсылап шайқау қажет. Препаратты тамақтан сон , көп сұйықтықпен қабылдау қажет. Тамақпен бірге қабылдауға болмайды. Дәрінің мөлшері балааның жасы мен салмағына байланысты болады:

1. 3-6 ай: 2,5 мл-ден 3 рет 24 сағат ішінде 150мг тәулігіне.
2. 6-12 ай: 2,5 мл-ден 3-4 рет 24 сағат ішінде 200 мг тәулігіне.
3. 1-3 жыл: 5,0 мл 3 рет 24 сағат ішінде 300 мг тәулігіне.
4. 4-6 жыл: 7,5 мл-ден 3 рет 24 сағат ішінде, 450 мг тәулігіне.
5. 7-9 жыл: 10 мл-ден 3 рет 24 сағат ішінде 600 мг тәулігіне.
6. 10-12 лет: 15 мл-ден 3 рет 24 сағат ішінде, 900-ден астам мг тәулігіне.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ:

- 3 айға дейінгі балаларға
- Жүктілік және лактация кезінде
- Асқазан және он екі елі ішек ауруларында
- Бронхиалды астма ауруларында
- Ибупрофенге жоғары сезімталдық кезінде
- Бүйрек ауруларында

САҚТАУ

- 25 °C жоғары емес, қараңғы, құрғақ жерде
- Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек
- Сақтау мерзімі 3 жыл

ӨНДІРУШІ:

- АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»
- Республика Казахстан,
- г. Алматы, ул. Шевченко 162 Б.