

Степи Южной Америки

Степь - зональный тип ландшафта с травянистой растительностью с сомкнутым или почти сомкнутым травостоем, отсутствием деревьев в умеренных и субтропических поясах Северного и Южного полушарий. Для степи характерно преобладание дерновинных злаков и засухоустойчивого разнотравья, почвы - черноземные и каштановые.

Степи широко распространены в районах с умеренным и субтропическим климатом и с небольшим количеством летних осадков. Степи протянулись полосой с запада на восток в Евразии и с севера на юг в Северной Америке; встречается также в Южной Америке и в Австралии. Значительная часть территории, занимаемой степями, распахана.

Степи Южной Америки (пампа) имеют плодородные красновато-черные почвы, преобладают злаки. Типичны быстрые пампасные олени, пампасная кошка, несколько видов лам, страусы нанду.





Степь в физической географии — равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренных и субтропических зонах северного и южного полушария. Характерной особенностью степей является практически полное отсутствие деревьев (не считая искусственных насаждений и лесополос вдоль водоёмов).



Пампасы или пампа - это равнинные травянистые степи в Южной Америке

















Пампасская трава
















КОВЫЛЬ



Дикое просо



Лама









Пампасская кошка



