

*Жедел гастрит- асқазанның  
шырышты қабықшасының жедел  
қабынуы, асқазан қуысына түсетін  
(түскен) қатты тітіркендіргіштің  
әсеріне байланысты болады.*

## **Этиологиясы:**

*Жедел гастриттің дамуы экзогенді және эндогенді факторларға байланысты болуы мүмкін. Жедел гастриттің келесі түрлерін ажыратады.*

*- I ші ретті жедел (экзогенді) гастрит:*

*- алиментарлы*

*- токсикалық - инфекциялық*

*- II ші ретті жедел гастрит, ауыр инфекциялық және соматикалық ауруларды қиындатады.*

*- Коррозивті гастрит, асқазанға концентрленген қышқылдардың, сілтілердің түсуінен пайда болады;*

*- Жедел флегмонозды гастрит (асқазанның іріңді қабынуы);*

*- Жедел гастритті шақыратын этиологиялық факторлар*

*Экзогенді гастрит*

*Алиментарлы формасы:*

*сандық және сапалық күштежелер  
(майлы, ащы, қуырылған тамақ және  
т.б.)*

*«Құрғақ тамақ»*

*Дәрілік заттарды қодану  
(салицилаттар, глюкокортикоидтар);*

*Эндогенді гастрит*

*Жедел инфекциялық аурулар*

*(стафилококкты инфекция және т.б.);*

*Патогенезі: Алиментарлы даму жолы бар экзогенді гастрит кезінде сапасыз тағам асқазанның шырышты қабықшасына тітіркендір уші әсер етеді, асқорыту процесстерін, ферменттердің бөлінуін бұзады. Эндогенді гастрит кезінде асқазанның гастрит кезінде асқазанның шырышты қабықшасындағы қабыну процессі этиологиялық агенттің гематологиялық жолмен түсуінен болады.*

- **Клиникалық көрінісі:**Жедел гастриттің клиникалық көрінісі оның формасына және этиологиясына байланысты.
- Негізгі клиникалық белгілері:
- • баланың мазасыздығы, жалпы жағдайдың нашарлауы, көп мөлшерде сілекей ағу, жүрек айну, тәбеттің төмендеуі, эпигастральды аймақта «толу» сезімі;
- • тоңу, содан кейін субфебрильді қалтырау болуы мүмкін;
- • содан кейін іштің ауырсынуы болады, бірнеше рет құсу, құсық массаларында -4-6 сағат бұрын ішкен тамақтың қалдықтары;
- • **Объективті:**терісінің бозаруы, тілдің ақшыл сары жамылғымен жабылуы, метеоризм, іштің пальпациясы кезінде -

Объективті:терісінің бозаруы, тілдің ақшыл сары  
жамылғымен жабылуы,  
метеоризм, іштің пальпациясы кезінде -  
эпигастральды аймақтағы ауырсыну;

Диарея;

Токсикалық - инфекциялық гастриттің  
ерекшеліктеріне жатқызады:

жиі құхудың әсерінен сусызданудың даму мүмкіншілігі;  
ауырсынудың эпигастральды және параумбиликальды  
аймақта болуы;