

# КАЛЬЦИЙ-Д<sub>3</sub> НИКОМЕД

**КАЛЬЦИЙ-Д<sub>3</sub> НИКОМЕД**  
**Источник кальция и витамина Д<sub>3</sub>**  
Образовательный материал



# Бренд Кальций-Дз Никомед представлен курсовыми упаковками №120 и №60, и, по справедливой цене!



## СОСТАВ

### Кальций-Дз Никомед

- Кальция карбонат ( $\text{CaCO}_3$ ) – 1250 мг (500 мг – элементарный Ca)
- Витамин Д<sub>3</sub> (колекальциферол) – 5 мкг (200 МЕ)

### Кальций-Дз Никомед Форте

- Кальция карбонат ( $\text{CaCO}_3$ ) – 1250 мг (500 мг – элементарный Ca)
- Витамин Д<sub>3</sub> (колекальциферол) – 10 мкг (400 МЕ)



- Жевательные таблетки с приятным вкусом, удобно, в любом месте и в любое время!
- 4 вкуса – апельсин, мята, лимон и клубника-арбуз
- Принимать по 2 таблетки в день и не менее месяца, как в инструкции



# Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D<sub>3</sub>



Прием Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед значительно повышает уровень кальция и витамина D\*

Комбинированный приём кальция и витамина D снижает частоту переломов любой локализации, включая перелом шейки бедра, у пожилых мужчин и женщин старше 65 лет

При профилактике и терапии остеопороза более целесообразно использование комбинированной терапии кальцием и витамином D, чем их монотерапии\*\*

Кальция карбонат (Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед) содержит около 40% кальция, а цитрат – в среднем 21% элементарного кальция\*\*\*


Прием Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед значительно снижает риск развития перелома на 22% и значительно повышает минеральную плотность кости\*\*\*\*

# Россия – зона дефицита. Необходимость приема кальция и вит. Д – научно обоснована!



## Дефицит потребления кальция

Более **70%** пациентов нуждаются в применении дополнительного кальция с пищей или в виде лекарственных препаратов<sup>1</sup>



Женщины **после 50 лет** потребляют в среднем около **45%** нормы кальция с пищей, мужчины – **42%**

## Дефицит витамина Д


Недостаточность витамина Д<sub>3</sub> встречается у **8 из 10** женщин<sup>1</sup>



У **97%** женщин старше **50 лет**, проживающих в Москве, выявляется недостаточность витамина Д<sup>1</sup>



Среди населения критично высокая распространенность лактазной недостаточности 8 из 10-ти – имеют лактазную недостаточность!



Возможные последствия приема препаратов с содержанием лактозы людьми с лактазной недостаточностью<sup>6</sup>

<b>Метеоризм</b>	<b>Диарея</b>
<b>Боль в животе</b>	<b>Аллергия</b>

**До 78% жителей планеты<sup>6</sup>**

имеют лактазную недостаточность, но большинство об этом не знают

# Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед



Бренд	Кальций (элементарный), мг		Витамин Д <sub>3</sub>		Содержание лактозы
	В 1 таб.	В 2-х таб.	В 1 таб.	В 2-х таб.	
Кальций-Д <sub>3</sub> Никомед	500	1000	200 МЕ (5 мкг)	400 МЕ (10 мкг)	Нет
Кальций-Д <sub>3</sub> Никомед Форте	500	1000	400 МЕ (10 мкг)	800 МЕ (20 мкг)	Нет
<b>Кальцемин</b>	250	<b>500</b>	50 МЕ (1,25 мкг)	<b>100 МЕ (2,5 мкг)</b>	Нет
Кальцемин Адванс	500	1000	200 МЕ (5 мкг)	400 МЕ (10 мкг)	Нет
Кальций Компливит (Компливит® кальций Д <sub>3</sub> )	500	1000	200 МЕ (5 мкг)	400 МЕ (10 мкг)	Да
Кальций Компливит Форте (Компливит® кальций Д <sub>3</sub> , форте)	500	1000	400 МЕ (10 мкг)	800 МЕ (20 мкг)	Да

## Суточная потребность\*

Для взрослых	1000 мг/сутки	10 мкг/сутки
Для лиц старше 60 лет	1200 мг/сутки	15 мкг/сутки

\*Согласно Методическим рекомендациям МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»



# Кальций-Дз Никомед



- Оптимальные дозировки кальция и витамина Дз (соответствует клиническим рекомендациям Российской ассоциации по остеопорозу) – научно обосновано и рекомендовано
- Не содержит лактозы – нет риска побочных эффектов
- Имеет широкую линейку на любой вкус (лимон, мята, апельсин, арбуз-клубника) – соответствует любым предпочтениям
- Жевательная форма таблеток – удобно принимать
- Курсовые упаковки (120 и 60 таблеток) – по 2 таблетки в день и не менее месяца, как в инструкции – как раз на курс



# Как найти потенциального покупателя?





# Кому предложить?



## МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ НА ДИЕТЕ<sup>1</sup>

- Исключение из рациона продуктов животного происхождения приводит к дефициту Ca



≥18 лет

≥50 лет

≥60 лет

~6,6 млн ПОКУПОК В ГОД<sup>6</sup>

в категории «для снижения веса»



Турбослим, Редуксин  
+ БАД



# Кому предложить?



## КАЖДАЯ 3-я ЖЕНЩИНА<sup>2</sup> С ДИАГНОЗОМ «ОСТЕОПОРОЗ»

- Снижение **плотности костной ткани** при менопаузе
- **14 млн чел.** – остеопороз в РФ
- **+20 млн чел.** – остеопения в РФ
- Итого **34 млн чел.** В РФ имеют риск остеопоротических переломов



≥18 лет



≥50 лет

≥60 лет

~4 млн **ПОКУПОК В ГОД**<sup>4</sup>

в категории «при менопаузе»



**Ци-Клим и гомонзаместительные средства**



# Кому предложить?



## БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В КОЛЕННЫХ СУСТАВАХ, ЧАСТЫЕ ПРИСТУПЫ ОСТЕОАРТРОЗА<sup>3</sup>

- Снижение **плотности костной ткани** при менопаузе
- **>15 млн чел.** – остеоартроз
- **+600 тыс. чел.** каждый год



**≥60 лет**

**~5,5 млн ПОКУПОК В ГОД<sup>4</sup>**  
в категории «хондопротекторы»



**Арта и Терафлекс**

**≥18 лет**

**≥50 лет**



# КАЛЬЦИЙ-Д<sub>3</sub> НИКОМЕД



Не упустить момент, накопить прочность

