

**Заболевания
передающиеся
половым
путём**

Выполнил врач акушер-гинеколог Руписова Ю.А
акушерка Овчинникова И.А



Известно более 20 возбудителей болезни, передающихся половым путем:

- Бактерии
- Вирусы
- Простейшие
- Дрожжевые грибы
- Членистоногие

**К ЗПП относятся 22 болезни трех
групп :**

**-классические венерические
заболевания** (сифилис, гонорея)
-болезни мочеполовой системы
(мочеполовой хламидиоз, трихомониаз,
микоплазмоз, генитальный герпес,
лобковый педикулез (вшивость, чесотка))
**-болезни передающиеся
преимущественно половым путем**
(СПИД, гепатит, сепсис новорожденных)



В последние годы во всем мире широко распространились инфекционные заболевания, передающиеся от человека к человеку преимущественно половым путем. Одна из главных причин – это более свободный взгляд на секс и сексуальные отношения молодых людей. Раньше они назывались венерическими заболеваниями, сейчас по классификации Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) заболевания, передаваемыми половым путем (ИППП).



Статистика

- Заболеваемость сифилисом выросла в 40 раз
- Число случаев врожденного сифилиса в 20 раз увеличилось
- ЗППП прослеживается у подростков с 12 до 14 лет
- Среди заболевших на I месте лица с 20-21 года, II место 15-19 лет.



Венерические болезни(от Венера-богиня любви и красоты в римской мифологии) это группа инфекционных болезней, возбудители которых, передаются преимущественно половым путем.



Сифилис

Хроническая венерическая болезнь, характеризующаяся поражением нервной системы, костей, внутренних органов. Название происходит от имени греческого пастуха Сифилуса, имевшего интимные отношения со свиньей (1530 год, описано поэтом Фрагостором).

Возбудитель – **бледная трепонема** которая попадает в кровь не только половым путем, но и через порезы, ссадины, даже поцелуи. Проявляются признаки заболевания через 3-4 недели после контакта.



Симптомы сифилиса



Сифилисом заражаются:

- при любом незащищенном сексуальном контакте;
- при поцелуях;
- при переливании зараженной крови;
- внутриутробно;
- в редких случаях – бытовым путем.


Различают три периода заболевания:

- **первичный период**
характеризуется: появлением эрозии или язвы (твердый шанкр) на половых органах, анусе, на слизистой губ, глотки.
- увеличиваются близлежащие лимфатические узлы.




- **вторичный период** может длиться от 2-5 до 10 лет;
- появляется сыпь на коже и слизистых оболочках, пигментация, усиленное выпадение волос, возникает осиплость голоса, увеличиваются лимфоузлы.
- если не приступить к лечению, то наступает **третичный период**, когда поражается:
 - первая ткань спинного мозга, теряется чувствительность ног, поражаются зубы, проваливается нос.

Третичный период сифилиса



Третичный период сифилиса



Третичный период сифилиса

MedUniver.com
все по медицине...



“BENIGN” TERTIARY SYPHILIS



- В случае подозрения на заболевание немедленно обратиться в лечебное учреждение.
- Иммунитет после сифилиса не вырабатывается.
- Сифилис передается по наследству.
- На ранней стадии сифилис лечится , но процедура эта очень болезненна и стоит достаточно дорого.
- Предотвратить заболевание сифилисом невозможно, вакцины против него не существует.
- Сифилис родителей опасен для потомства – дети сифилитиков имеют специфическое поражение костей, глухоту и часто рождаются дебилами.

Гонорея

Инфекционное заболевание слизистых оболочек мочеполовых органов, рта и прямой кишки.



Возбудитель заболевания – **гонококк**. Возможно бытовое заражение при пользовании общей с больным постелью, бельём, полотенцем. Выделяют мужскую, женскую и детскую гонорею.

Инкубационный период 3-5 дней.

Симптомы гонореи:


У мужчин поражается

мочеиспускательный канал.
Возникают режущие боли при мочеиспускании, обильные гноевые выделения, частые неудержимые позывы к мочеиспусканью.



□ **У женщин** гонорея протекает без отчетливых признаков. Отмечаются зуд, выделения. Поражаются почти все отделы мочеполовой системы, а также прямая кишка, мочеиспускательный канал, влагалище, матка, придатки, шейка матки, яичники.

У девочек в основном поражаются влагалище, мочеиспускательный канал и область заднего прохода. Отмечается болезненность при мочеиспускании и дефекации. Лечение больных должно быть комплексным, индивидуальным, одновременным для обоих половых партнеров.



Гонобленорея новорожденных



Клиника гонореи




Трихомониаз

- Вызывается простейшим организмом – **трихомонадой**.
- Пути передачи – **контактно - половой и бытовой** - купание в грязных водоёмах, стоячей воде ,в том числе иногда и в частных бассейнах.
- Симптомы похожи на симптомы гонореи, поэтому любое состояние дискомфорта в половых путях - зуд, выделения и прочее требует лабораторной диагностики с целью определения возбудителя. Заболевание излечимо.





Генитальный герпес

- Вирусное поражение кожи и язвенное поражение половых органов, возбудителем которого является **вирус простого герпеса**.
- Заболевание характеризуется пузырьковыми высыпаниями на лице, половых органах и ягодицах.
- Генитальный герпес вызывает язвы на половых органах и вокруг них.
- Появление сыпи нередко сопровождается головной, недомоганием, температурой.



Генитальный герпес





Herpes lesion:
Found on shaft of penis (male),
vagina, vulva, cervix (female),
and around anus





- Передача заболевания осуществляется от больного человека здоровому при **прямом контакте**(поцелуи, половые связи) или через предметы домашнего обихода.
- Появление сыпи сопровождается чувством жжения, зудом.
- Пузырьки либо ссыхаются в корочки, либо вскрываются с образованием эрозии.
- От момента появления сыпи до её регресса в среднем проходит 7-10 дней.
- Процесс склонен к частому рецидивированию.


Хламидиоз



Хламидийная инфекция



Хламидийная инфекция



Чем опасны ИППП :

- поражением внутренних органов
- параличом и нарушением психики
- бесплодием
- рождением больных детей и уродов
- распадом семьи
- вырождением нации

Профилактика ИППП :

- использование презервативов
- постоянные сексуальные партнеры
- здоровый образ жизни
- своевременное обращение при появлении первых симптомов заболеваний в медицинское учреждение.

Самолечение недопустимо!



Заведомо известное заражение другого лица венерической болезнью наказывается по статье 121 УК РФ 1997 г. :

штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда


или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет

либо арестом на срок от трех до шести месяцев

ВЫВОД:

- Одним из наиболее простых и эффективных способов профилактики всех венерических заболеваний является **чистоплотность в интимных отношениях, единопартнёрство, отсутствие случайных интимных контактов.**
- В условиях роста ИППП **пользование презервативом** становится элементарным гигиеническим требованием.



□ «Наивно размышлять о злой заразе и невинных жертвах. В игре под названием ИППП нет победителей и проигравших, только проигравшие. Мужчины и женщины должны понять, что, защищая других, они защищают себя».

Берегите друг друга