

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық казақ-түрік университеті

Стоматология факультеты

СӨЖ

Тақырыбы: Қабыну ауруларының асқынулары.
Сепсис

Қабылдаған:
Орындаған:Кидирова Д.А
Тобы:СТК-436

Жоспар

- I Кіріспе
II Негізгі бөлім
- а) Жұқпалар патофизиологиясы
ә) Сепсис. Сепсистің дамуы
б) Сепсистің клиникасы
в) Сепсистің жіктелуі
г) Сепсистің диагнозы
- д) Сепсистің емі
- III Қорытынды
- IV Пайданылған әдебиеттер
-

Kіріспе

Сепсис – бұл ауыр инфекционды ауру. Әр түрлі қоздырғыштардың және олардың токсиндерінің әсерінен пайда болады.

Сепсис туралы түсінік тарихи көзқарастарға ұшырады. Бұгінгі күні сепсис дамуында адам тәнінің серпілістеріне маңызды орын беріледі.

Шын мәнінде микробтың түріне қарамай организмнің сепсиске қайтаратын жауабы әрдайым бірдей болады.

Америка ғалымдарының ұсыныстары бойынша жүқпалы үрдістерді: жүйелі қабынулық серпілістер синдромы, сепсис, жүқпа, бактериемия, ауыр сепсис, сепсистік сілейме деп ажыратады.

Жүйелі қабынулық серпілістер синдромы – деп микроорганизмдердің, олардың тіршілік өнімдерінің немесе қабыну медиаторларының, жергілікті ошағынан шығып, жалпы қан айналыммен бүкіл денеге тарап кетуін айтады.

Жұқпалар патофизиологиясы

Жұқпалар сезімтал организм мен микробтардың өзара әсерлерінен дамиды. Жұқпалы аурулардың, басқа аурулар сияқты, өздерінің себепкөр ықпалдары мен даму жолдары болады. Олардың дамуында сырттан енген жұқпаларға қарсы тұтас организмнің, жүйелердің, ағзалар мен тіндердің және жасушалардың деңгейлеріндегі қорғаныстық тетіктері қосылады. Бұл тетіктер жеткілікті болғанда организм жұқпалардан нәтижелі қорғанып, сырқаттану болмайды немесе ол жеңіл түрде ғана болады. Ал олар жеткіліксіз болғанда ауыр жұқпалы аурулар дамиды. Жұқпалы үрдістердің бірнеше түрлерін ажыратады:

- Сепсис – жұқпалардың бүкіл денеге жайылған ауыр түрі. Бұл кезде міндетті түрде немесе шартты түрде дерптты түрлерінде микробтардың денеге жайылуынан организмнің жүйелі қабынуы болады;
- Септикопиемия – науқас адамдардың әртүрлі ағзалары мен тіндерінде ірінді ошақтардың қалыптасуымен сипатталатын түрі;
- Бактериемия, вирусемия, фунгиемия – бактериялардың, вирустардың, майда саңырауқұлактардың қанда болуымен, бірақ олардың онда өсіп-өнү белгілері болмауымен, көрінетін түрі; Салдарлық жұқпалар – организмде бар бір жұқпалы ауру кезінде екінші бір микробтардан туындаған жұқпалы үрдістің түрі;
- Микстинфекция – бір мезгілде бірнеше микробтардан дамитын жұқпалы үрдіс түрі; Реинфекция – науқас адам сауықканнан кейін сол дерптті түрлерден туындаған микробтың әсерінен жұқпалы үрдістің қайталануы;
- Суперинфекция – науқас адам сауықпай жатып, сол дерптті түрлерден туындаған микробтың қайта жұқтыруы.

Сепсис. Сепсистің дамуы

Сепсис (латынша, sepsis — шіру, іріндеу) — ірің микробтарымен залалданған қаннан дамитын ауру. Сепсистің негізгі қоздырғыштарына стафилакокк, стрептококк, менингококк, т.б. іріндеткіш микроорганизмдер жатады. Сепсистің дамуында жергілікті ірінді ошақтың сипаты, сол жердегі бактериялардың саны және адамның иммундық жүйесінің әлсіреуі үлкен рөл атқарады. Көбінесе организмнің қабынуы мен ірінді жаралардың асқынуынан, ауыр операциядан, қан кетуден, қоректің жетіспеуінен, аурудан кейін организм әлсірегендеге адам сепсиске ұшырайды. Сепсисте фагоцитоз процесі бұзылып, лейкоциттер сіңіріп алған микробтар жойылмастан жасуша ішінде көбейе бастайды. Лимфоциттер мен моноциттердің белсенделілігі төмендей, иммундық антиденелердің түзілуі бұзылады.



Бемистің алғашқы белгілері

Клиникалық белгілері:

Науқастың дене қызуы 39-40 С дейін көтеріледі. Науқас жүдейді, кейде тері жабындысында қанталау байқалады. Науқастың артериалды, венозды қан қысымы төмендеп, қан айналымы бұзылуынан денениң ойылуы, тромбофлебит, тромбоздар, қол-аяқтың ісінуі пайда болады. Қан анализдерінде анемия, лейкоцитоз, лейкоциттық формуланың солға ығысуы, қан тромбині 45-50% дейін төмендейді. Кейбір ауруларда бактериемия анықталады. Бауыр, бүйрек функциялары бұзылады. Науқас сарғайып гепатит дамиды. Зәр анализдерінде альбуминурия, гематурия, лейкоцитурия анықталады. Көкбауыр ұлкейеді. Аскорыту жүйесін алсақ, тәбеті жоғалады, аузы құрғап іші өтеді, жүрегі айнып құсады . **Жергілікті симптомдар** – сепсистегі жараларда өлі еттен тазару және регенерация белгілері байқалмайды, грануляциясы жансыз, бозғылт, жара ісінген, дымқыл, шірік иісті. Көктамырлардың тромбозы, лимфа жүйесінде лимфаденит дамиды.



Сепсистің орналасқан орнына қарай:

- * терапевтік (өкпенің ірінді қабынуы);
- *бадамша бездік (ірінді баспа);
- *хирургиялық (шиқан шыққанда);
- *гинекологиялық (ауруханадан тыс жасатқан аборттан кейін);
- *урогендік (несеп жолдарындағы ірінді қабынулар);
- *отогендік (ірінді отиттің асқынуы);
- *кіндіктік (нәрестенің кіндігінің айналасындағы қабыну) түрлері бар.

Егер инфекцияның қай жерден түскенін анықтай алмаса, оны криптогендік (жасырын) сепсис деп атайды

Клиникалық-морфологиялық белгілеріне қарай:

- 1. септициемия**
- 2. септикопиемия**
- 3. бактериалды эндокардит**
- 4. хрониосепсис**

Септициемия — сепсистің метастазсыз түрі. Бұл кезде көкбауыр үлкейіп, лимфа түйіндері ұлғаяды. Ішкі органдарда дистрофиялық өзгерістер, қабынулар байқалады.

Септикопиемия кезінде сепсистік ошақтар өкпеде, бүйректерде, ми тінінде, жүректе басталады. Іріңді қабыну сепсис ошағынан айналадағы тіндерге өтіп, іріңді плеврит, перикардит, перитонит дамиды.


Сепсистік эндокардит жүрек қақпақшаларынан басталады. Соның нәтижесінде некроз ошақтары пайда болады. Өзгерген қақпақшалар ыдырап, олардың бетінде тромбтар түзіледі.

Тромбоз организмде инфаркт ошақтарының қалыптасуына жағдай туғызады. Кейбір жағдайда ішектің, аяқтың және терінің гангренасы дамуы мүмкін.

Хрониосепсис-созылмалы және жазылмайтын іріңді-септикалық ошақтармен сипатталатын сепсистің төртінші формасы. Ішкі ағзалар мен мүшелердегі өзгерістер атрофиялық көріністерімен сипатталады. Жалпы азу, көкбауырдың кішіреюі, бауырда, миокардта және көлденен салалы бұлшықеттерде қоныр атрофия байқалады.

Ауыр сепсис – деп, айқындалған жүқпа ошағы және жүйелік қабынулық серпілістер синдромының екіден астам көрсеткіштері болуымен көрінетін, белгілі организм жүйесінің жеткіліксіздігімен сипатталатын сепсисті айтады. Бұл кезде ересек адамдарда тыныстық дистресс-синдром, кардиогендік қан айналым жеткіліксіздігі, бүйрек қызметінің жеткіліксіздігі т.с.с. бұзылыстар байқалады.

Сепсистік сілейме – артериялық қысым сынап бағанасы бойынша 90 мм-ден төмен түсіп кетуімен көрінетін сепсистік синдром және бұл кезде тамыр тарылтатын дәрілер әсер етпейді.





Пупочный сепсис

Сепсистің диагнозы

Сепсис ауруның диагнозы — оның жергілікті және жалпы симптомдарына, лабораториялық, бактериологиялық зерттеулерге сүйене отырып нақтыланады. Бактериологиялық зерттеудің маңызы зор. Зерттеуге қанды тәулігіне бірнеше қайтара, науқастың дене қызуы жоғарылағанда алған дұрыс. Бактериологиялық зерттеуге науқастың зәрі, қақырығы, ірің, жарадан және серозды қуыстардан алынған экссудатты жіберуге болады. Сепсисті сұзек, милиарлы туберкулез, бруцеллез, жедел ірінді интоксикациядан, безгектің (маллярия) ауыр түрлерінен ажырата білу керек.

Сепсистің емі

Сепсистің емі этиология, патогенезіне сай бағытта жүргізіледі. Комплексті өмді сепсиске әкелген біріншілік хирургиялық ірінді ошақты кеңінен тіліп ашып, жараны ірінен, өліеттерден мұқият тазартып, пассивті немесе активті дренаждаудан бастаған абзал, онсыз ем нәтижелі болмайды

Корытынды

Сепсис – жалпы ірінді инфекция. Адам ағзасындағы көптеген ірінді процестер (абсцесс, флегмона, карбункул, ірінді плеврит, остеомиелит және т.б.) сепсиске әкелуі мүмкін. 1500 хирургиялық науқастардың біреуі сепсиспен ауырады. Инкубациялық кезең бұл ауруға тән емес, бірақ та, міндетті түрде инфекция енетін жері және біріншілік ірінді ошақ болады: жара, күйік, іріндіктер сияқты. Сепсистің даму жылдамдығы, ағымы әртүрлі болады – бірнеше сағаттан (найзағай тәріздес түрі), бірнеше жылға созылуы мүмкін (созылмалы түрі).

Сепсис ауруы **бактериалды – токсикалық шокпен** асқынған жағдайда науқасқа преднизолонды бірінші тәулікте 500 – 800 мг, қалған 2 – 3 күнде 150 – 50мг енгізіледі. Сепсисте қандағы кининогендердің деңгейі өсіп, микроциркуляция бұзылыстарына әкелуіне байланысты, кешенді емге протеолиз ингибиторларын қосқан абзал (годокс тәулігіне 200000 -300000 бірлік немесе контрикал тәулігіне 40000 – 60000 бірлік). Сепсистің қарқынды этиопатогенезді, симптоматикалық (жүрек – тамыр препараттары, анальгетиктер, антикоагулянтар, ангиопротекторлар) кешенді емі, науқастың жағдайы толық қалпына келгенше, гомеостаз толық реттелгенге дейін жүргізіледі.

Пайдаланылған әдебиеттер

Темуров.Ф.Т ХИРУРГИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ, Түркістан-2014 жыл.

<https://www.yandex.kz>

<https://www.KazMedic.kz>