

Соболь



Цели:

- развивать познавательный интерес к изучению животных;
- Воспитывать любовь к родной природе, прививать основ экологической культуры;
- Изучить с детьми особенности поведения соболя.



- О каком животном пойдет сегодня речь, мы узнаем отгадав загадки.









KINOPOISK.RU







льше тигра, но немнож
це крупной рыжей кош
На суку она обычно,

притаившись, ждет добычу

Н... тись



ПОСМОТРИТЕ ЧТО У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ

л о с ь

в о л к

б о б

к р о т

л и с а

р ы с ь





С о б о л ь

- Видели ли вы это животное? Где?
- Что вы о нем знаете?
- Где живет этот зверёк?



A photograph of a forest path. In the foreground, several young, vibrant green pine trees stand in a grassy clearing. A dirt path leads from the bottom center towards the background, where a dense forest of taller, mature pine trees is visible. The sky is bright and slightly overcast.

Ареал:


Россия (Сибирь, Дальний Восток, Курильские о-ва, Сахалин), Корея, Китай, Монголия, Япония (о. Хоккайдо)

Среда обитания: горная и равнинная тайга (кедровые, лиственные и сосновые леса), заросли кедрового и березового стланика, каменистые россыпи, буреломы, лесотундра, верховья горных рек, субальпийские редколесья - 1200-1500 м. над уровнем моря. Бесплодных горных вершин избегает.

Соболь - стройный и изящный хищник. Тело гибкое вытянутое. Голова клиновидная с заостренной мордой, уши треугольной формы. Лапы маленькие. Хвост короткий, покрыт пушистым мехом. Мех у соболя мягкий и пушистый. Зимой шерсть закрывается подушечки лап и когти. Линяют зверьки раз в год. Самцы крупнее самок (примерно на 5-10%



- ▣ **Окрас:** сильно изменчив - от темно-бурого до желто-палевого, на горле светлое пятно (серое, белое или бледно-желтое). Хвост и лапы темные, голова светлая, подпушь от желтовато-рыжего до темно-серого



РАЗМЕР: ДЛИНА ТЕЛА 35-56 см, ХВОСТ 10-17 см.

ВЕС: САМЦОВ 0,88-1,8 кг, САМОК 0,7-1,56 кг.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ: в неволе до 15 лет, в природе до 8.

ГОЛОС: ПОХОЖ ЧЕМ-ТО НА УРЧАНИЕ КОШКИ. При защите соболя яростно стрекочет



Соболь



У соболя очень красивый, густой, пушистый мех. Соболи любят лакомиться кедровыми орехами.

Также пищей являются мелкие млекопитающие птицы и их яйца орехи (кедровые), ягоды (рябина, голубика, брусника, черника, черемуха, смородина, шиповник, морошка) и растения (багульник), падаль и пчелиный мед

Поведение: соболь - подвижный и быстрый зверь. На охоту выходит ночью, иногда (при нехватке пищи) и в светлое время суток. Слух и обоняние хорошо развиты. Грабит запасы грызунов и птиц, поедая орехи. В основном охотится на земле. Взрослые (опытные) зверьки меньше времени тратят на поиски корма, чем молодые.

Лазает по деревьям хорошо, а вот прыгать с дерева на дерево может только в том случае, если ветви деревьев плотно сомкнуты.

Для отдыха пользуется гнездом, которое устраивает в различных пустотах: под упавшими деревьями, в низких дуплах деревьев или под камнями. Выстилает дно древесной трухой, сеном, перьями и мхом. Во время плохой погоды остается в гнезде. Внутри гнезда температура держится в пределах 15-23°C. Недалеко от норы устраивает уборную.

Если гнездо находится на земле, то зимой в снегу соболь выкапывает к нему туннель (до 2-3 м длиной). Раз в 2-3 года меняет старое гнездо на новое.

Плохо плавает, т.к. мех быстро намокает



- Враги: совы, орлы и другие хищные птицы.
Основные пищевые конкуренты соболя
- колонок, горноста́й и солонгой.



- ▣ **Польза/вред для человека:** соболь - ценный пушной зверек, чем темнее окрас меха, тем дороже он стоит. На меховых аукционах особенно ценится баргузинский соболь. На соболе паразитирует трихинелла (*Trichinella spiralis*). Соболь легко приручается, даже будучи взрослым, а его поведение очень похоже на кошачье. Регулирует численность мелких мышевидных грызунов.

Популяция/статус сохранения: в начале XX в. соболь, как вид, был практически истреблен.

Но благодаря охране в 1940-60 г.г. численность начала увеличиваться. В 1970 г. популяция насчитывалась около 200 тыс. особей. Вид внесен в Международную Красную книгу.

Соболь создает бесплодные гибриды с лесной куницей, которых называют - киндус.

Различают несколько подвидов: западносибирский соболь (*Martes zibellina zibellina*), енисейский соболь (*M. z. yenisejensis*), саянский соболь (*M. z. sajanensis*), баргузинский соболь (*M. z. princeps*), камчатский соболь (*M. z. camtshadalis*), сахалинский соболь (*M. z. sahalinensis*).





- Что нового вы для себя открыли?
- Что вас удивило?



□ Спасибо за внимание!



ИСТОЧНИКИ

- <http://www.zooclub.ru/wild/hish/323.shtml>
- <http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/9899/fev2000/loup3.jpg>
- http://givotnie.com/wp-content/uploads/2011/05/krot_1.jpg
- http://www.ugrales.ru/files/fotogal/upravleniya/lesnoe_hoz.jpg
- http://kolyan.net/uploads/posts/2011-05/1306822359_image_149.jpg
- http://barguz.bos.ru/images/9_05B.jpg
- <http://img-2007-09.photosight.ru/25/2321769.jpg>
- http://twarini.com/wp-content/uploads/2012/08/sobol_2.jpg
- http://icon.s.photosight.ru/img/2/0f4/3353588_large.jpeg
- <http://www.kamchatkadventures.ru/images/gallery/1195726247.jpg>
- http://ib.komisc.ru/add/dbanimals/izobrazheniya/image/380_Martes%20zibelli_na7.jpg
- http://zxcc.ru/upload/normal/krasnoyarsk-sobol_zhivoy_69669.jpeg
- <http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13194683637017.jpg>
- <http://900igr.net/datas/o-zhivotnykh/Sibir-2.files/0013-013-Sobol.jpg>
- http://katyaburg.ru/sites/default/files/pictures/zabavnie_jivotnie/sobol_foto_24.jpg
- <http://biodat.ru/vart/animal/79.jpg>
- Е.М. Елизарова «Знакомые незнакомцы»- Волгоград: Учитель, 2007.

