


**Последовательность
оказания первой помощи
пострадавшему
при ДТП**

При оказании первой доврачебной медицинской помощи необходимо, прежде всего, устранить воздействие на пострадавшего травмирующих и угрожающих его жизни факторов:


- извлечь его из под обломков или из-под колес транспортного средства;**
- извлечь пострадавшего салона автомобиля;**
- освободить пострадавшего от тлеющей или горячей одежды;**

ИЗВЛЕЧЬ ЕГО ИЗ АВТОТРАНСПОРТА



Выполнить обязательно!

У каждого пострадавшего должен фиксироваться шейный отдел



Осмотр пострадавшего

- Осмотр головы
- Осмотр плечевого пояса и грудной клетки
- Осмотр рук
- Осмотр живота
- Осмотр таза
- Осмотр ног
- Оценка подвижности суставов

Первая помощь

- если пострадавший не дышит, то немедленно приступают к проведению искусственного дыхания;
- если у пострадавшего не прощупывается пульс, то одновременно с проведением искусственного дыхания осуществляют наружный массаж сердца (закрытый, непрямой);
- останавливают угрожающее жизни кровотечение;
- обрабатывают раны и накладывают повязки;
- при переломах костей накладывают шину или применяют любые другие подручные средства для исключения подвижности (иммобилизации) в месте перелома.

Правила транспортировки

Транспортное положение пострадавшего зависит от:

- локализации травмы (голова, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности);
- состояние сознания пострадавшего.

Черепно-мозговая травма:

**возвышенное положение головы;
голову не запрокидывать (среднее
положение);**

Цель:

- **увеличить отток венозной крови от головы;**
- **уменьшить отек мозга.**

ЧМТ



ЧМТ без сознания



Травма груди

- возвышенное положение верхнего конца туловища;
- возможно с полуповоротом на больную сторону.

Цель:

- уменьшить боль;
- облегчить дыхание;
- уменьшить подвижность поврежденной половины грудной клетки.



**при травме груди возвышенное
положение с полуповоротом на
поврежденную сторону.**



Травма живота (сильные боли в животе)

- положение на спине;
- валик под полусогнутыми коленями;
- валик под голову и плечи.

Цель:

- уменьшение напряжения передней брюшной стенки;
- уменьшение боли



Перелом костей таза

- положение на спине;
- колени слегка разведены (поза лягушки);
- валик под коленями.

Цель:

- иммобилизация костей таза;
- уменьшение боли;
- предупреждение вторичных повреждений



Травма позвоночника


- не перемещать пострадавшего до приезда скорой медицинской помощи;
- зафиксировать шейный отдел позвоночника

Цель:

- иммобилизация, предотвращение дальнейших повреждений.



Скандинавский мост



Шок

- стабильное боковое положение;
- ножной конец приподнят под углом 15 градусов.

Цель:

- поддержание проходимости верхних дыхательных путей;
- улучшение притока крови к мозгу



Положения пострадавшего без сознания

- стабильное боковое положение.

Цель:

- поддержание свободной проходимости дыхательных путей (западание языка);
- предупреждение аспирации жидкостей в органы дыхания.



Спасибо

за

внимание!!!