

# Венерические заболевания

Презентацию подготовила Ращенья  
Дарья

Инфекци́онные  
заболева́ния —

группа заболеваний,  
вызываемых проникновением  
в организм патогенных  
(болезнетворных) микроорганиз  
мов, вирусов и прионов.




**Сифилис** — хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum*

# Врождённый сифилис

Сифилис может передаваться при беременности, от инфицированной матери ребёнку на 10-16 неделях. Частые осложнения – самопроизвольные аборт и смерть плода ещё до родов. Врождённый сифилис по временным критериям и симптомам разделяют на ранний и поздний.



## Общие симптомы венерических заболеваний



# Симптомы венерических болезней

## Симптомы у мужчин:

[Жжение и боль при мочеиспускании](#)

[Выделения из полового члена](#)

[Высыпания на половых органах](#)

## Симптомы у женщин:

[Необычные выделения из влагалища](#)

[Неприятный запах выделений из влагалища](#)


[Жжение и зуд половых органов](#)

[Кровянистые выделения из влагалища в период между месячными](#)

[Боль при мочеиспускании](#)

[Боль при половом акте](#)

**Гонорéя** — инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком — гонококком *Neisseria gonorrhoeae*. Передаваемая половым путём и характеризующаяся поражением слизистых оболочек мочеполовых органов.



# Заражение гонореей новорожденного ребенка

Гонококки не могут проникнуть через неповреждённые плодные оболочки во время беременности, но преждевременный разрыв этих оболочек приводит к инфицированию околоплодных вод и плода. Заражение гонореей новорожденного может произойти при прохождении его через родовые пути больной матери. Поражается при этом конъюнктура глаз, у девочек еще и половые органы. Слепота у новорождённых в половине случаев вызвана заражением гонореей.



# Выявление заболевания



Для диагностики используется осмотр  
пациента, выявление клинических симптомов



Для изучения лабораторных анализов образцов используются следующие методы:

*микроскопия*

*культуральный метод*

*выявление антигенов к возбудителю*

*выявление ДНК возбудителя*

*выявление антител в крови*




# Осложнения



Не излеченные и длительно присутствовавшие в организме ИППП способны вызывать осложнения: мужское и женское бесплодие , простатит, воспалительные заболевания матки и придатков, эпидидимит, новообразования половых органов.

# Профилактика

а



Сексуально активным лицам, не имеющим единственного и здорового партнёра, необходимо помнить о правилах защищённого секса (презерватив) — хотя он и не обеспечивает 100 % надёжности для профилактики заражения.

Всем сексуально-активным лицам рекомендуется ежегодное профилактическое обследование на сифилис, ВИЧ, гепатит В,

# Лечение



Для лечения ИППП используются антибиотики, противовирусные или противопаразитарные средства, в зависимости от возбудителя инфекции.

# Ответственность



В России умышленное заражение другого лица венерической болезнью является преступлением, за это деяние установлена уголовная ответственность.



Задумайтесь !