

Неспецифическая хирургическая инфекция

Лимфангит, Лимфаденит,
Гидраденит, Артрит



Лимфангит

Лимфангит - это вторичное неспецифическое воспаление лимфатических сосудов, осложняющее течение различных воспалительных заболеваний



Симптомы Лимфангита

В зависимости от калибра поражённого сосуда лимфангит бывает:

Поверхностный (сетчатый) и глубокий.

Клиническая картина. При сетчатом лимфангите наблюдается выраженное покраснение кожи без чётких границ; определяется сетчатый рисунок кожи в зоне покраснения. При глубоком лимфангите гиперемия кожи имеет вид отдельных полос, идущих от очага воспаления к зоне ближайших лимфатических узлов. При надавливании отмечаются болезненные уплотнения по ходу лимфатических сосудов. Близлежащие лимфатические узлы увеличены, плотные, болезненные. Лимфангит чаще всего протекает на фоне высокой температуры тела (до 39-40 градусов С), сопровождаясь ознобом, слабостью, головной болью, потливостью. В анализах крови обнаруживается лейкоцитоз.

Причины Лимфангита

Очагом инфекции могут быть инфицированные раны и ссадины, абсцессы, флегмоны, панариций и гнойные заболевания. Чаще всего лимфангит осложняет течение гнойно-воспалительных заболеваний конечностей



Лечение Лимфангита

Лечение должно быть направлено на ликвидацию первичного очага - вскрытие абсцесса, флегмоны, гнойных затёков, дренирование гнойников, адекватное лечение инфицированных и нагноившихся ран с последующей иммобилизацией конечности. Пациент должен находиться в больнице. Антибиотики обязательны. Противовоспалительное лечение проводится с использованием местной охлаждения, приёма больным противовоспалительных и антигистаминных препаратов.

Лимфаденит

Лимфаденит – воспаление лимфатических узлов.



Причины

Инфекционные причины лимфаденита


- Бактериальные и вирусные инфекции
- **ВИЧ**
- Инфекционный мононуклеоз
- Другие бактериальные или вирусные инфекции
- Стафилококк
- Стрептококк
- Туберкулез
- Вирусные инфекции верхних дыхательных путей

Неинфекционные причины лимфаденита

- Воспаление в ответ на инородное тело
- Лимфома (рак лимфатических узлов)
- Вторичный (метастатический) рак, который распространяется из других областей тела

СИМПТОМЫ

- Воспаленные, опухшие лимфатические узлы
- Зуд кожи
- Сыпь
- Покраснение или отек
- **Повышенная температура тела**



Лечение

Лекарства для лечения лимфаденита

Ваш лечащий врач может назначить или предложить различные виды лекарств для лечения вашего лимфаденита в том числе:

Анальгетики (обезболивающие), чтобы контролировать боль

Антибиотики для лечения основной инфекции

Противовоспалительные препараты, чтобы уменьшить отек и воспаление

Другие препараты, в зависимости от конкретной причины лимфаденита

Гидраденит

Гидраденит – это гнойно-воспалительное заболевание апокриновых желез, возбудителем которого является золотистый стафилококк.

Локализация

У мужчин чаще поражается промежность, у женщин - подмышечные впадины.

Обычно гидраденит возникает в подмышечных впадинах (чаще поражается у женщин) и в промежности (чаще поражается у мужчин).

СИМПТОМЫ

Небольшие плотные узелки на коже, которые чешутся и при надавливании болят – это начальная стадия заболевания.

Через пару дней узелки увеличиваются в размерах (до 20 мм в диаметре), становятся выпуклыми. Появляется слабость, головная боль, иногда даже лихорадка.

Кожа в пораженных местах отекает, становится красной, болит при прикосновении, может увеличиваться температура тела – это стадия созревания.



Если воспаление затрагивает подкожную жировую клетчатку – может возникнуть флегмона, при затрагивании лимфатических узлов – лимфаденит.

В тяжелых случаях заболевания большие узлы сливаются в одно большое объединение гнойников, что чревато возникновением сепсиса



Причины

- Гипергидроз – повышенная потливость.
- Показатель pH пота в щелочной стороне.
- Сахарный диабет, дисфункции половых желез, заболевания щитовидной железы, гипофиза, поджелудочной железы.
- Ожирение.
- Заболевания кожи – экзема, дерматит, псориаз.
- Ссадины, царапины, случайные порезы ножом, порезы во время бритья под мышками и в зоне бикини).
- Слабая иммунная система.
- Отсутствие надлежащей гигиены кожи.
- Чрезмерное использование дезодорантов.
- Работа в грязных условиях.

Лечение

Гидраденит - это не только инфекционное заболевание, поэтому лечение должно быть комплексным:

- Антибактериальная терапия;
- Хирургическое лечение;
- Инъекции кортикостероидов в очаг поражения;

Артрит

Артрит - это воспалительное заболевание сустава.



Причины

- Раны;
- Травмы;
- Занос инфекции;



СИМПТОМЫ

- Сильная боль;
- Ограничение движений в суставе;
- Напряжение;
- Гиперемия кожных покровов;
- Изменение контура сустава;
- Повышение температуры;
- Озноб;
- Головная боль;
- В анализах крови гиперлейкоцитоз, увеличенное СОЭ

Лечение

- Главным в лечении артритом является иммобилизация конечности с помощью гипсовой повязки с окошком в области сустава для пункционного дренирования, постоянного промывания сустава растворами антисептиков и антибиотиков.
- Местное лечение всегда сочетают с внутривенной инфузионной терапией, физиотерапевтическими процедурами.



**Спасибо за
Внимание!**

Автор: Студентка 321 группы, Вагина Регина