ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПОЧКА

С. Боровой, 2011

Варианты диабетической почки

Сосудистые изменения

- артериолосклероз
- атеросклероз
- холестериновая эмболия
- тромбоз почечной вены

Инфекционные поражения

- бактериурия
- пиелонефрит
- карбункул
- некроз сосочка

Дегенеративные изменения

- диабетический гломерулосклероз (диабетическая нефропатия)

Сочетание с другими нефропатиями

- гломерулонефрит
- амилоидоз
- другие

Неврогенные поражения

- атония мочевых путей
- гидронефроз

Лекарственные нефропатии

- рентгеноконтрастная ОПН, НПВС

Удельный вес больных сахарным диабетом среди больных в терминальной стадии ХПН
(США, 1992)

35% в группе больных, начинающих лечение по программе ESRD-Medicare

40% среди ожидающих трансплантацию почки

25% (из 52000)
среди имеющих почечный трансплантат

Частота терминальной ХПН вследствие сахарного диабета у белого населения США (на 1 млн населения)

Расовые различия в частоте терминальной ХПН вследствие сахарного диабета и артериальной гипертензии среди населения США (на 1 млн популяции)

Клинические критерии диагностики диабетической нефропатии

- персистирующая протеинурия $> 0,5$ г/сут
- ретинопатия
- артериальная гипертензия
- прогрессирующее снижение функции почек
- отсутствие инфекции мочевых путей, сердечной недостаточности, других заболеваний почек

Кумулятивная частота диабетической нефропатии у больных сахарным диабетом, диагностированным в разные периоды прошлого века:

—●— 1933-1942 — 1943-1952 ●●● 1953-1962 — 1963-1972

(Kofoed-Envoldsen et al., 1987)

КЛИНИЧЕСКИЕ СТАДИИ ДИАБЕТИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗА

Стадии	Клин.-лаб. проявления	Функция почек	Методы диагностики	Время от начала болезни
I. СКРЫТАЯ (субклиническая) А. Гиперперфузия и гипертрофия почки Б. Начальные морфологические изменения клубочков	↑ почечного плазмотока, ↑ СКФ расширение мезангия утолщение ГБМ	повышение почечных клиренсов	Функциональные тесты Биопсия почки Морфометрия	недели-месяцы
				1 – 2 года
II. ЛАТЕНТНАЯ (начальных клинических проявлений)	нагрузочная протеинурия	микроальбуминурия		10 – 12 лет
III. РАЗВЕРНУТАЯ (выраженных клинических проявлений) А. Доазотемическая Б. Азотемическая	стабильная протеинурия нефротический с-м, высокая гипертензия	неселективная протеинурия	Клинико-лабораторное исследование	15 лет
		азотемия		
IV. УРЕМИЧЕСКАЯ А. Спонтанное течение Б. Пролонгированная диализом В. После трансплантации	Уремия, отягощенная диабетом и его осложнениями Временное устранение уремии	Резкое ↓ всех функций почки Функция трансплантата		> 20 лет

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ

Основные варианты

- диабетический гломерулосклероз с узелками Kimmelstiel-Wilson**
- диффузный мезангиальный гломерулосклероз**

Характерные признаки

Утолщение ГБМ; артериолярный гиалиноз; аневризматические капилляры; капсулярные капли; фибриновые шапочки; атрофия канальцев; инфильтрация, расширение и склероз интерстиция; линейные отложения иммуноглобулинов

Узелковый гломерулосклероз (болезнь Киммельстиля-Вильсона). Узелки pink гиалинового материала в области петель клубочковых капилляров – значительное уширение мезангиального матрикса в результате неэнзиматического гликозилирования протеинов.

Узелковый гломерулосклероз (болезнь Киммельстиля-Вильсона) у больного с длительным течением сахарного диабета. Выраженное утолщением артериолы – типичный гиалиновый артериолосклероз, наблюдаемый при сахарном диабете.

Electron microscopy

NORMAL

TYPE 1 DIABETES

Диабетическая микроангиопатия / утолщение базальной мембраны

1. Образование аневризм
2. Утолщение базальной мембраны
3. Leakсосуды и базальные мембраны

Патофизиология диабетической нефропатии: ранние функциональные изменения

□ Гломерулярная гиперфльтрация

- механизмы: увеличение почечного плазмотока, транскапиллярного гидравлического давления и коэффициента ультраfiltrации
- метаболические и гормональные медиаторы: гипергликемия (не более 14-16 ммоль/л), гормон роста, глюкагон, простагландины, ПНФ

□ Гипертрофия почек

□ Микроальбуминурия

Естественное течение диабетической нефропатии при ИЗСД

- **Скрытая (микроальбуминурическая) стадия**
 - клубочковая гиперфилтрация (↑ на 20-40%)
 - ↑ почечного плазмотока (на 9-14%)
 - гипертрофия почек (↑ массы на 20%)
 - микроальбуминурия (у 20% больных ранее 5 лет)

EURODIAB IDDM Complications Study

(3250 больных, протеинурия - 9%, микроальбуминурия - 21%)

—x— протеинурия —□— микроальбуминурия

(Stephenson & Fuller, 1994)

Выявление альбуминурии

(St Vincent Declaration Action Programme, 1995)

Естественное течение диабетической нефропатии при ИЗСД

□ Протеинурическая стадия

- постоянная протеинурия $> 0,5$ г/сут.
(альбуминурия > 20 мкг/мин
или > 300 мг/сут.)
- артериальная гипертензия
- снижение клубочковой фильтрации
($0,6-2,4$ мл/мин/мес.)
- ретинопатия

Летальность больных ИЗСД с протеинурией в возрасте 40 лет в 40 раз выше, чем у больных без протеинурии
(Borch-Johnsen et al., 1985)

Схемы традиционной (А) и интенсивной (Б) инсулинотерапии

(a)

(b)

Кумулятивная частота протеинурии (> 208 мкг/мин) и микроальбуминурии (28-208 мкг/мин) у нормоальбуминурических больных ИЗСД при традиционной или интенсивной инсулинотерапии

А. У больных без ретинопатии риск микроальбуминурии снижается на 34%

Б. У больных с ретинопатией риск протеинурии снижается на 56%

*(Diabetes Control and Complications Trial Research Group, 1993;
1441 больной с течением ИЗСД не менее 15 лет)*

Ингибиторы АПФ в лечении диабетической нефропатии

Сахарный диабет I типа

- Ингибиторы АПФ уменьшают протеинурию
- Ингибиторы АПФ замедляют снижение функции почек
- Ингибиторы АПФ корригируют артериальную гипертензию

Сахарный диабет II типа

- Достоверных данных об уменьшении протеинурии ингибиторами АПФ нет
- Основное направление замедления прогрессирования – коррекция артериальной гипертензии (АД < 130/80)

No. at risk	Baseline	6	12	18	24
Placebo:	44	41	33	29	26
Captopril:	44	41	38	37	30

Прогрессирование микроальбуминурии к протеинурии на фоне приема каптоприла или *placebo* (у больных ИЗСД с микроальбуминурией, без артериальной гипертензии (European Microalbuminuria Captopril Study Group trial) (Viberti et al., 1993)

Placebo	202	184	173	161	142	99	75	45	22
Captopril	207	199	190	180	167	120	82	50	24

(a)

Placebo	202	198	192	186	171	121	100	59	26
Captopril	207	207	204	201	195	140	103	64	37

(b)

Прием каптоприла в течение 3 лет у больных ИЗСД с персистирующей протеинурией и креатинином плазмы < 0,22 ммоль/л

А. Риск удвоения креатинина снижается на 43%

Б. Риск смерти (или перехода на заместительную почечную терапию) снижается на 50%

(Lewis et al., 1993 - Collaborative Study Group trial, 400 больных)

Urinary albumin excretion ($\mu\text{g}/\text{min}$)

Уровень микроальбуминурии и АД на фоне приема каптоприла 50 мг $\times$ 2 или плацебо (European Microalbuminuria Captopril Study Group trial)

(Viberti et al., 1993)

Mean arterial blood pressure (mmHg)

Темпы снижения функции почек у 19 больных ИЗСД на фоне обычной и малобелковой диеты (Walker et al., 1989)

В отличие от нифедипина ингибиторы АПФ и, в меньшей степени, диуретики +/-или бетаблокаторы снижают альбуминурию/протеинурию. Нифедипин увеличивает альбуминурию на 20%.

(Weidmann et al., 1993)

Symbol	Drug	N	r	p <
•	ACE-inhibitor	45	0.58	0.0001
×	Conventional	14	0.62	0.02
□	Calcium-antagonist	18	0.02	NS

Двойная блокада ренин-ангиотензиновой системы при диабетической нефропатии у больных диабетом I типа

- Добавление к неэффективной антигипертензивной терапии (иАПФ + диуретики) 300 мг ирбесартана уменьшило через 2 мес. протеинурию на 37%, АД_{сист} на 8 мм рт. ст., АД_{диаст.} на 5 мм рт. ст. при прежнем уровне СКФ

(Jacobsen et al., NDT, 2002, 17, 6, 1019 – Steno Diabetes Center).

- Диета

Лечение больных сахарных диабетом группы высокого риска диабетической нефропатии (первичная профилактика)

- **Идеальная (оптимальная) компенсация углеводного обмена – поддержание у больных диабетом 1 типа традиционной или интенсивной инсулинотерапией:**
 - **HbA1c на уровне 6,2 – 7,5% (N < 6,1%),**
 - **гликемия натощак 5,1 – 6,5 ммоль/л (90 – 120 мг%),**
 - **гликемия через 2 ч после еды 7,6 – 9,0 ммоль/л (136 – 160 мг%)**

- **Диета с умеренным ограничением животного белка (не > 1 г/кг/сут., не > 12–15% от общей суточной калорийности)**

- **Нормализация внутривисочечной гемодинамики при отсутствии функционального почечного резерва (ингибиторы АПФ)**

- **Коррекция гиперлипидемии (преимущественно при диабете 2 типа)**

Первичная профилактика диабетической нефропатии

- Первичная профилактика нефропатии может быть достигнута интенсивным метаболическим контролем гликемии (целевой уровень HbA1C $\leq 7,5\%$) как у больных диабетом I типа, так и при диабете II типа
- Доказан ренопротективный эффект длительного (от 3 до 6 лет) применения ингибиторов АПФ при диабете II типа
- Влияние коррекции дислипидемии, ограничения оксидативного стресса уменьшением пищевых жиров (особенно жирных кислот), увеличения физической нагрузки, отказа от курения, добавок витаминов С и Е, а также комбинированного применения антиагрегантов и статинов находится в стадии изучения

Лечебные мероприятия, замедляющие прогрессирование диабетической нефропатии в микроальбуминурической стадии

- ▣ Ренопротективный эффект ингибиторов АПФ имеется как при ИЗСД, так и при ИНЗСД, и не зависит от уровня АД. Ингибиторы АПФ уменьшают альбуминурию и СКФ, замедляют развитие развернутой стадии диабетической нефропатии.
- ▣ При диабете II типа интенсивный метаболический контроль не замедляет прогрессирование нефропатии к макроальбуминурической стадии (вероятно, из-за хронической гиперинсулинемии, ведущей к увеличению АД и массы тела).

Лечение больных диабетической нефропатией на стадии микроальбуминурии (вторичная профилактика)

- **Факторы риска прогрессирования ДН от микроальбуминурии к протеинурии**
 - **НbA1c > 7,0 – 7,5%**
 - **альбуминурия > 100 мг/сут**
 - **АД > 130/85 мм рт. ст.**
 - **холестерин крови > 6,5 ммоль/л**
- **Компенсация углеводного обмена – поддержание НbA1c на уровне <7% традиционной или интенсивной инсулинотерапией**
- **Нормализация АД и внутрипочечной гемодинамики (ингибиторы АПФ)**
- **Диета с умеренным ограничением животного белка (не более 1 г/кг/сут, не более 12–15% от общей суточной калорийности)**
- **Коррекция гиперлипидемии**

Ведение больного сахарным диабетом в стадии микроальбуминурии

- Установить наличие и уровень микроальбуминурии, исследовать мочу повторно через 3–6 мес.
- Лабораторные исследования: сахар крови, HbA_{1c}, креатинин (КФ), общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП
- Целевые уровни: HbA_{1c} <7,5%; АД <130/85 мм Hg; оптимальное АД у молодых 120/70-75 мм Hg, у пожилых 125-130/80-85 мм Hg; Х-ЛПНП <100 мг%; ТГ <180 мг%
- Мотивировать больного к отказу от курения, а при диабете 2 типа к снижению веса и ограничению пищевого Na
- Усилить антигипергликемическую терапию для достижения нормогликемии
- Назначить ингибиторы АПФ для уменьшения микроальбуминурии
- Корригировать артериальную гипертензию и нарушения липидного обмена, лечить и предупреждать диабетические осложнения и сопутствующие заболевания
- Оценивать эффект терапии по уровню микроальбуминурии и динамике других показателей

Лечение больных диабетической нефропатией на стадии протеинурии (третичная профилактика)

- Компенсация углеводного обмена – поддержание у больных диабетом 1 типа HbA1c на уровне < 8% методом интенсифицированной инсулинотерапии
- Оптимальные средства для больных диабетом 2 типа – глюренорм и диабетон
- Коррекция артериальной гипертензии – целевое АД – 120–130/75–85 мм рт.ст (ингибиторы АПФ и др. препараты)
- Коррекция дислипидемии – секвестранты желчных кислот, никотиновая кислота, фибраты, ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы (статины)
- Диета с ограничением животного белка (не > 0,8 г/кг/сут, не > 12–15% от общего суточного калоража)

Ведение больного сахарным диабетом в стадии диабетической нефропатии

- Лабораторные исследования каждые 3-6 мес.: сахар крови, HbA_{1c} , креатинин (КФ), общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, калий плазмы
- При гипергликемии и высоком уровне HbA_{1c}
 - снижение массы тела, диетические рекомендации
 - усиление пероральной антигипергликемической терапии
 - переход на лечение инсулином/ интенсификация лечения инсулином
- Целевые уровни: $HbA_{1c} \leq 7,5\%$; АД $<130/85$ мм Hg; Х-ЛПНП >100 мг%; ТГ >180 мг%
- Запретить курение, увеличить физическую активность
- Назначить ингибиторы АПФ для снижения протеинурии и коррекции артериальной гипертензии
- Корригировать нарушения липидного обмена, и сопутствующие заболевания
- Оценивать эффект терапии по уровню протеинурии, креатинина плазмы (КФ) и других показателей

Консервативное лечение больных диабетической нефропатией в азотемической стадии

- Компенсация углеводного обмена, своевременный перевод больных диабетом 2 типа на инсулинотерапию
- Коррекция артериальной гипертензии – целевое АД не более 130/85 мм рт.ст (ингибиторы АПФ, комбинированная антигипертензивная терапия)
- Лечение нефротического синдрома
- Коррекция дислипидемии (ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы)
- Диета с умеренным ограничением животного белка (0,6–0,8 г/кг/сут)
- Лечение почечной анемии (эритропоэтин, препараты железа)
- Коррекция гиперкалиемии и нарушений фосфорно-кальциевого обмена

(a)

(b)

(c)

Факторы, ускоряющие прогрессирование диабетической нефропатии

- **Гипергликемия**
- **Артериальная гипертензия**
- **Гиперлипидемия**
- **Высокий уровень альбуминурии**

Факторы риска диабетического гломерулосклероза

- **Короткий рост**

*Rossing et al., BrMedJ, 1995, 310:296 - диабет I типа;
Fava et al., NDT, 2001, 16:525 диабет II типа)*

- **Гиперлипидемия**

- **Высокий уровень альбуминурии**

Патофизиологические аспекты сахарного диабета 2 типа

- Основная форма фенотипически гетерогенного диабета 2 типа (*синдром!*) интимно связана с кластером коронарного риска – избыточный вес, дислипидемия, артериальная гипертензия.
- У этих больных снижен эффект инсулина на метаболизм глюкозы в скелетной мышце – то, что называют инсулинорезистентностью.
- При диагностике диабета более 50% больных страдают ожирением, гипертриглицеридемией и гипертензией, а 40% – коронарной болезнью.

Патофизиологические аспекты сахарного диабета 2 типа

- **Гипергликемия – поздний симптом предстоящей сердечно-сосудистой катастрофы.**
- **Сахарный диабет 2 типа – конечная стадия синдрома инсулинорезистентности.**

Артериальная гипертензия при сахарном диабете 2 типа

- В отличие больных ИЗСД, которые обычно нормотензивны до развития нефропатии, значительная часть больных ИНЗСД страдает артериальной гипертензией еще до начала диабета.
- ADA в 5 сообщении JNC (1993) определила уровень АД 140/90 мм рт.ст. как 1 стадию гипертензии. Изолированная систолическая гипертензия как серьезный фактор сердечно-сосудистого риска и также является предметом лечения.
- В целом примерно 80% больных ИНЗСД нуждаются в коррекции артериальной гипертензии.

Tarnow et al., Diabetes Care 1994; 17:1247

Антигипергликемическая терапия при сахарном диабете 2 типа

- **Цель:** устранение текущих симптомов болезни, предотвращение острых (гиперосмолярная и кетонемическая комы) и хронических (микро- и макроангиопатия) осложнений.
- При неэффективности диеты производные сульфонилмочевины и инсулина имеют сопоставимый эффект на гипергликемию, **ценой** которого является потеря веса и гипогликемия.
- **Основные ошибки:** производные сульфонилмочевины назначаются поздно и также поздно больные переводятся на инсулин.

Tarnow et al., Diabetes Care 1994; 17:1247

Антигипергликемическая терапия при сахарном диабете 2 типа

- Инсулин абсолютно показан больным с кетозом, выраженными гипергликемическими симптомами, развивающемся снижением массы тела.
- Сульфонилмочевина – классическим больным с ожирением, нечувствительным к инсулину
- Больные с плохим эффектом оральных гипогликемических препаратов, особенно при небольшом ожирении, сохранной *preserved*? функции β -клеток и относительно недавним диабетом – инсулин + сульфонилмочевина.

Альтернативные сульфонилмочевине – препараты для больных с ожирением

- **Метформин – увеличивает транспорт глюкозы в скелетной мышце, не влияет на секрецию инсулина, не вызывает гипогликемии, снижает уровень триглицеридов. Применяют только у больных с сохранной функцией почек.**
- **Ингибиторы альфа-глюкозидазы (акарбоза и др.) снижают постпрандиальное excursion глюкозы и улучшают контроль глюкозы. Могут быть полезны вместе с неинсулинотропными агентами.**
- **В перспективе – тиазолидиндионовые производные, улучшающие периферическую чувствительность к инсулину**

Диетические рекомендации для больных сахарным диабетом 2 типа

- ▣ **Рекомендации ADA – индивидуальный подход с учетом стиля жизни больного, likelihood of adherence, индивидуальных целей ведения диабета - определяется терапевтом, диетологом и самим больным**
- ▣ **Старые рекомендации – до 60% калорий – углеводы, 12 – 20% – белки, менее 30% – жиры.**

Современные диетические рекомендации для больных сахарным диабетом 2 типа

- ▣ Менее 10% калорий – насыщенные жиры, 10–20% калорий – белки.
- ▣ В дебюте нефропатии снижение белка (0,8 г/кг/сут, примерно 10% калорий)
- ▣ Леченные инсулином (и/или сульфонилмочевинной) должны быть способны определить общее содержание углеводов в пище
- ▣ Нелеченые инсулином (и/или сульфонилмочевинной) должны знать углевод-содержащие продукты.

Общие рекомендации для больных сахарным диабетом 2 типа

- Легкое/умеренное снижение веса может улучшить контроль глюкозы – умеренное ограничение калорий, уменьшение общего жира и spacing пищи.
- Изменение стиля жизни, регулярный аэробный спорт.

Заместительная почечная терапия у больных сахарным диабетом

□ Легкое/

Микроангиопатия
Инсульты

**Спектр поражений,
ассоциированных
с сахарным диабетом**

Артериальная гипертензия

Инфаркт
миокарда

Атеросклероз

Нефропатия

Автономная
нейропатия

ПОКАЗАНИЯ К ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ НЕФРОБИОПСИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

- **острый нефритический синдром**
- **наличие гематурии при отсутствии микроаневризм сосудов глазного дна**
- **уровень протеинурии, не соответствующий длительности заболевания**
- **предположение о наличии системных болезней (напр., васкулита)**
- **острая почечная недостаточность необъяснимой причины**

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ВСТРЕЧАЕТСЯ В 4 РАЗА ЧАЩЕ, ЧЕМ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

**Результаты нефробиопсии у 132 больных
(из общего числа 6000 больных) сахарным диабетом
(Parsons V., NDT, 1994, 9, 848; London)**

**В дополнение к диабетическому гломерулосклерозу,
гипертензивным и атеросклеротическим изменениям, или
пиелонефриту, гломерулопатия выявлена у 37 больных (27%)**

- 11 больных - IgA гломерулонефрит (преимущественно при ИЗСД)**
- 9 - пролиферативный ГН с полулуниями**
- 6 - амилоидоз или отложения легких цепей
(в основном у пожилых)**
- 4 - васкулит**
- 3 - мембранозная нефропатия**
- 2 - ФСГС**
- 1 - минимальный гломерулонефрит с лимфолейкемией**
- 1 - смешанная криоглобулинемия**

Nephrol Dial Transplant (1998) 13: 2547–2552

Original Article

**Nephrology
Dialysis
Transplantation**

Renal pathology patterns in type II diabetes mellitus: relationship with retinopathy

Melvin M. Schwartz¹, Edmund J. Lewis², Thomas Leonard-Martin³, Julia Breyer Lewis⁴,
Daniel Batlle⁵, and The Collaborative Study Group⁶

¹Department of Pathology and ²Section of Nephrology, Department of Medicine, Rush Medical College, Chicago, IL,
³Section of Nephrology and ⁴Section of Ophthalmology, Department of Medicine, Vanderbilt University School of Medicine,
Nashville, TN, and ⁵Division of Nephrology/Hypertension, Department of Medicine, Northwestern University Medical
School, Chicago, IL, USA

Improved survival in patients obtaining remission of nephrotic range albuminuria in diabetic nephropathy

PETER HOVIND, LISE TARNOW, PETER ROSSING, BENDIX CARSTENSEN, and HANS-HENRIK PARVING

Steno Diabetes Center, Gentofte, Denmark; and Faculty of Health Science, University of Aarhus, Aarhus, Denmark

Methods. At the Steno Diabetes Center, we performed a prospective cohort study of all type 1 diabetic patients with nephrotic range albuminuria ($N = 125$), who had annual measurement of GFR [51 chromium-ethylenediaminetetraacetic acid ($^{51}\text{Cr-EDTA}$) plasma clearance] carried out for at least 3 years. Patients were followed from onset of nephrotic range albuminuria until death or the end of year 2003. Nephrotic range albuminuria was defined as persistent albuminuria above 2.5 g/24 hours, remission of nephrotic range albuminuria was defined as sustained albuminuria <0.6 g/24 hours for at least 1 year.

Results. Nephrotic range albuminuria occurred in 90 men and 35 women, age [mean (SD)] 34 (8) years, duration of diabetes 22 (8) years, and follow-up time from onset of nephrotic range albuminuria [median (range)] 12.4 (3.0 to 24.9) years. Remission was induced in 32 patients (26%), 25 predominantly treated with angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, seven with non-ACE inhibitors. The remission lasted 5.5 (1.0 to 22.4) years. At the end of follow-up, 25% in the remission group and 74% in the no remission group had reached the composite end point of end-stage renal disease (ESRD) (dialysis, transplantation) or death. A Cox proportional hazard regression analysis with gender and age as fixed covariates and remission as time-dependent covariate revealed that obtaining remission was associated with a lower risk of dialysis, transplantation, or death, relative risk (95% CI) 0.28 (0.13 to 0.59), $P = 0.001$, whereas older age at onset of nephrotic range albuminuria (per 10-year

increase) was associated with higher risk of reaching the end point, 1.42 (1.08 to 1.87), $P = 0.01$.

Conclusion. Our prospective study suggests that remission of nephrotic range albuminuria in type 1 diabetic patients, induced by aggressive antihypertensive treatment with and without ACE inhibitors, is associated with a slower progression in diabetic nephropathy and a substantially improved survival.

**Ремиссия протеинурии
нефротического уровня
($>2,5$ г/сут $\rightarrow$ $<0,6$ г/сут)
улучшает выживаемость
больных с диабетической
нефропатией**