

Дизартрия



# Определение понятия дизартрия и ее признаки

- ▶ **Дизартрия** – нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы.
- ▶ **Признаки:**
- ▶ Нарушение тонуса мышц( мышцы либо напряжены, либо излишне расслаблены - тогда лицо ребенка амимично, а рот приоткрыт);
- ▶ Сильная назализация голоса(ребенок говорит сильно «в нос»);
- ▶ Повышенное слюноотделение;
- ▶ Невозможность выполнить многие простые движения губами, языком;
- ▶ Трудности жевания и глотания пищи( медленно жует, «сосет» еду)
- ▶ Часто не умеет сморкаться;
- ▶ Моторно неловок, дискоординирован в движениях;

# Классификация дизартрии

- ▶ **Бульбарная дизартрия** - связана с поражением ядер черепно-мозговых нервов /языкоглоточного, подъязычного, блуждающего, иногда - лицевого, тройничного/ в продолговатом мозге
- ▶ **Псевдобульбарная дизартрия** - связана с поражением корково-ядерных проводящих путей
- ▶ **Экстрапирамидная (подкорковая) дизартрия** - связана с поражением подкорковых ядер головного мозга
- ▶ **Мозжечковая дизартрия** - связана с поражением мозжечка и его проводящих путей
- ▶ **Корковая дизартрия** - связана с очаговыми поражениями коры головного мозга.

# Клинико-неврологическая классификация:



Классификация  
по степени  
понятности:

1 степень

2 степень

3 степень

4 степень

# Степени тяжести дизартрии

- ▶ **1 степень** (стертая дизартрия) - дефекты звукопроизношения могут быть выявлены только логопедом при специальном обследовании.
- ▶ **2 степень** - дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом речь остается понятной.
- ▶ **3 степень** - понимание речи пациента с дизартрией доступно только близкому окружению и частично посторонним людям.
- ▶ **4 степень** - речь отсутствует или непонятна даже самым близким людям (анартрия).

# Синдромы

Синдром артикуляционных расстройств

Синдром нарушений речевого дыхания

Синдром нарушения голоса и мелодико-интонационные расстройства

Синдром нарушения мышечного тонуса в речевой мускулатуре

# Трудности развернутого высказывания:

Моторные  
затруднения

Нарушения  
языковых  
операций - выбор  
нужного слова



# Причины дизартрии

Наиболее часто (в 65-85% случаев) дизартрия сопутствует детскому церебральному параличу и имеет те же причины возникновения.

Наиболее частыми перинатальными факторами дизартрии выступают:

- ▶ токсикозы беременности
- ▶ гипоксия плода
- ▶ резус-конфликт
- ▶ хронические соматические заболевания матери
- ▶ патологическое течение родов
- ▶ родовые травмы
- ▶ асфиксия при рождении
- ▶ ядерная желтуха новорожденных
- ▶ недоношенность

# Родовые травмы

- ▶ Родовая травма новорожденных -различные повреждения плода, возникающие в процессе родового акта.
- ▶ Среди родовых травм новорожденных встречаются повреждения мягких тканей (кожи, подкожной клетчатки, мышц), костной системы, внутренних органов, центральной и периферической нервной системы.

# Дизартрия при ДЦП

- ▶ Наиболее часто встречающиеся формы дизартрии при ДЦП:
- ▶ Спастическая;
- ▶ Спастика-паретическая (псевдобульбано-бульбарная);
- ▶ Спастика-ригидная (псевдобульбарно-подкорковая);
- ▶ Спастика-атактическая (псевдобульбарно-мозжечковая);
- ▶ Смешанная форма;

# Диагностика дизартрии

- ▶ Обследование и последующее ведение пациентов с дизартрией осуществляется неврологом (детским неврологом) и логопедом. Объем неврологического обследования зависит от предполагаемого клинического диагноза.
- ▶ Логопедическое обследование при дизартрии включает оценку речевых и неречевых нарушений.

# Коррекция дизартрии

- ▶ Логопедическая работа по преодолению дизартрии должна проводиться систематически, на фоне медикаментозной терапии и реабилитации (сегментарно-рефлекторного и точечного массажа, акупрессуры, ЛФК, лечебных ванн, физиотерапии, механотерапии, иглоукалывания, гирудотерапии), назначаемой неврологом. Хороший фон для коррекционно-педагогических занятий достигается применением нетрадиционных форм восстановительного лечения: дельфинотерапии, сенсорной терапии, изотерапии, пескотерапии и др.

# Профилактика дизартрии

- ▶ Только рано начатая, систематическая логопедическая работа по коррекции дизартрии может дать положительные результаты. Большую роль в успехе коррекционно-педагогического воздействия играет терапия основного заболевания, усердие самого пациента-дизартрика и его близкого окружения.