

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Психосоматика

**все болезни
из головы**



Выполнила
студентка гр. 361 У
Низамова Гузелия Ханифовна

Объект исследования: психологические факторы возникновения психосоматических заболеваний

Предмет исследования: взаимосвязь психологических факторов и психосоматических заболеваний.

Цель исследования: теоретически рассмотреть и эмпирически изучить взаимосвязь психологических факторов и психосоматических заболеваний.

Гипотеза: Пациенты с психосоматическими заболеваниями имеют уровень тревожности, акцентуации характера и уровень враждебности и агрессивности, отличные от соматически здоровых индивидов.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть теоретические аспекты взаимосвязи психологических факторов и психосоматических заболеваний.
2. Выявить эмпирическим путем взаимосвязь психологических факторов и психосоматических заболеваний.
3. Составить рекомендации по выявлению предрасположенности и профилактике психосоматических заболеваний.

База исследования:

ГАУЗ «Нижекамская Центральная Районная Многопрофильная Больница».

В исследовании приняли участие 4 группы по 20 человек в возрасте от 30 до 60 лет, 40 мужчин и 40 женщин; из них первая группа – соматически здоровые медицинские работники, вторая группа - пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания терапевтического отделения №2, третья группа – пациенты онкологического отделения и четвертая группа – пациенты с хроническими кардиологическими заболеваниями кардиологического отделения

Методы исследования:

1. Опросник враждебности Басса-Дарки (вар. Ениколопова);
2. тест на акцентуации личности по Леонгарду;
3. шкала проявлений тревоги Тейлор ТМАС (вар. Норакидзе)

Рис. 1. Распределение показателей враждебности и агрессивности по методике Басса – Дарки (показатели, превышающие нормальные значения)




Рис. 2. Распределение количества акцентуированных личностей (в % от количества исследуемых в группе)




Таблица 1. Показатели акцентуаций характера в исследуемых группах

	Демон страти в ность ость	Застр евани	Педан тичность	Возбу димост ь	Гиперт имность	Дисти мность	Трево жность	Экзал ьтиров анность	Эмоти вность	Цикло тимнос ть	Итого
Онкологи я	0	3	2	0	3	0	1	1	7	1	18
Кардиоло гия	1	4	3	1	1	0	4	2	13	5	34
Здоровы е	0	1	2	2	1	0	0	0	1	0	7
Пульмон ология	1	1	1	1	1	2	1	3	5	3	19

Рис. 3. Распределение уровня тревожности в исследуемых группах по шкале проявлений тревоги Тейлор ТМАС (вар. Норакидзе)




Рис.4. Корреляционная плеяда взаимосвязей психологических факторов в группе здоровых




Рис 5.
Корреляционная
плеяда
взаимосвязей
психологических
факторов в группе
пациентов с
онкологическими
заболеваниями




Рис. 6. Корреляционная плеяда взаимосвязей психологических факторов в группе пациентов с пульмонологическими заболеваниями





Рис.7.
 Корреляционная
 плеяда
 взаимосвязей
 психологических
 факторов в группе
 пациентов с
 кардиологическим
 и заболеваниями



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

