

# Бөртпө түрлөрү



Бөртпелер әр түрлі себептерден пайда болады.  
Олардың пайда болу себебіне байланысты 4 топқа бөледі:

- \*қан тамырлар жүйесі аурулары;
- \*жұқпалы аурулар;
- \*аллергиялық реакциялар;
- \*гигиенаның дұрыс сақталмауы.

Бөртпелердің біріншілік және екіншілік элементтері болады.

\*Біріншілік элементтер: дақ, төмпешік, түйін, көпіршікше, көпіршік, күлдіреуік, эритема, геморрагия, пустула, уртика, комедон.

\*Екіншілік элементтер: қабыршақ, эрозия, пигментация, тыртық, сыдырылу, қыртысша, тері жаралары, лихенификация.

**Дақ - эпидермис аумағында таза теріге қарағанда түсімен ерекшеленеді және таза терімен бір деңгейде орналасады.**

**Мөлшеріне байланысты:**

- \*Кіші дақ (1 см-ге дейін);**
- \*Үлкен дақ ( 1 см-ден көп)**

**Дақ түсіне байланысты:**

- \*Эритематозды;**
- \*Геморрагиялық;**
- \*Телеангиэктатикалық,**
- \*Дисхромиялық**



Қызылша. баланың температурасы алғашқы үш күн пайда жоғарылайды. Біріншіден, бөртпе бетті жабады, содан кейін денеге өтеді. Температура көтеріледі. Бес күн өткеннен кейін бөртпе жоғала бастайды, ал дақтар шырмала бастайды.



Қызамық. Тозуы 5 күнге созылады. Науқастар жөтел, тамағында жайсыздық шағымданған. Шағын қызыл элементтерді жарықта көруге болады. Көбінесе, дақтар аяғы мен қолдың кеңейтілген орындарында орналасқан, сонымен қатар бөкселерде пайда болады. Бет жағында іс жүзінде жоқ болуы мүмкін. Бөртпе 3 күнге созылады және жүкті әйел үшін қауіпті.



Скарлатина. Тонсилдер көбеюде, сондай-ақ қызарған қызғылт түске боялады. Бірінші дақтар мойынға пайда болады. Олардың жиі қышуымен жүреді. Дақтардың басым бөлігі қолғапта, іште және артында қалыптасады. инфекцияның соңында шырималай бастайды



- Жұқпалы эритема. 2 жастан 12 жасқа дейінгі науқас балалар. Әдетте, эпидемия бала бақшада немесе мектепте дамиды. Бөртпе пайда болғаннан кейін, бала жұқпалы болуды тоқтатады. Алғашқы күндері ОСР барлық белгілері пайда болады. Бөртпелер сүйектік бетіне шыға бастайды және бүкіл денені екі күн ішінде жабады. Бір аптадан соң дақтар іс жүзінде жоғалады.



- Roseola, кенеттен бөртпе. Бұл жас балалардың өткір инфекциясы. Ауру температураның күрт көтерілуімен, 40 градусқа дейін басталады. үш күн бойы жоғары температура сақталады. Бірақ бала жақсы көрінеді және белсенді. Тері деңгейінен сәл жоғары қарсыласу. Сирек жағдайларда бауыр ұлғаяды.

