

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Балалар аурулары 2 кафедрасы

Бөртпе синдромымен өтетін аурулар

Қарағанды 2016 ж

Бөртпе синдромымен өтетін аурулар

- Қызамық
- Қызылша
- Желшешек
- Скарлатина

Бөртпе түрлері

- Тамырлық бөртпе – беткей тамырларының кеңеуі нәтижесінде пайда болады.
 - Розеола 1мм-5мм (Іш сүзегі)
 - Макула 5мм-20мм (Қызамық, қызылша, аллергия)
 - Эритема 20мм-ден көп



Розеол
а




Макул
а



Эритем
а

- Геморрагиялық бөртпе
(Менингококкемия, пневмококкты сепсис)
 - Нүкте тәрізді петехия
 - Пурпура – 2мм-5мм
 - Экхимоз – 5мм-ден үлкен




Петехии



Пурпур






Экхимозда
р



Бөртпелердің қуысты элементтері

- Везикула – 1мм-5мм
 - мөлдір/қан аралас
 - кейін қабыршаққа айналады
 - эрозиялар пайда болуы мүмкін
 - тыртық болмайды
- Булла – 3-5см
 - серозды/қан аралас/ірінді сұйық
 - кейін қабыршақ пайда болады
 - эрозия болуы мүмкін
 - тұрақты емес дақ
 - Тілме, желшешек, ыстық күйю
- Пустула
 - ірінді сұйық,
 - айналасында қызарады
 - Желшешек



Бөртпелердің қуыссыз элементтері

- Папула – 1мм-20мм
 - күмбез тәрізді
 - соңында дақ қалады
- Уртика – 3 см-10см
 - сопақша/дөңгелек
 - ақшыл-қызғылт
 - тез пайда болады
 - тез жоғалады
 - Аллергиялық реакциялар



Қызылша - корь

- Этиология – қызылша вирусы, парамиксовирус
- Инкубация периоды 7-17 күн
- Жедел



Клиника

- Катаральді период кезінде (3-5 күн)
 - Лихорадка
 - Интоксикация
 - Психомоторлы қозғыштық
 - Тұмау(насморк)
 - Үрме жөтел
 - Конъюктивит
 - Лифма түйіннің ісінуі
 - Жарықтан қорқу
 - Энантема
 - БФК дақ
 - Ішінің ауырсынуы



Энантема



БФК дак

- Бөрту периоды 4-5 күн
 - 3-4 күннен бастап пайда болады
 - Жоғарыдан – төмен
 - Папула
 - 4 күннен бастап жұқпалы емес болып есептеледі

- Реконвалесценция периоды 7-10 күн
 - Кір дақтар
 - Папуладан соң қоңыр дақтар қалады
 - Қабыршақтану
 - Жалпы жағдайының жақсаруы

Диагностика

- ЖҚА
 - Лейкопения
 - Эозинопения
 - Лимфоцитопения
 - СОЭ жоғары
- ИФА
- ЖЗА
- Р-зерттеу

Емі

- Қызуды басатын препарат
 - Нурофен 100 мг – 5мл
 - 5-10 мг/кг/3-4 рет
 - 5 күннен артық қолдануға болмайды!!!
- Көзін сүрту
 - Гидрокарбонат натрия 2 %
 - Ретинол ацетат
 - 1-2 тамшыдан 3-4 рет
- Антибиотиктер
 - Азитромицин

Профилактика

- Иммуноглобулин 3 мл
- Тірі қызылша вакцинасы 0,5 мл А. А. Спородинцев бойынша
- Изоляция 4 күн, бөртпе басталғаннан бастап

Қызамық - краснуха

- Этиология – рубивирус
- Инкубационды период – 11-24 күн
- Жедел



Клиника

- Инкубация периоды кезінде
 - Субфебрильді температура
 - Интоксикация
 - Тұмау
 - Қызыл көз
 - Л. түйіндер ұлғаюы

- Өршу периоды

- Бөртпе

- Жоғарыдан төмен
 - 5-7мм
 - Басқан кезде ол жоғалады, кейін қайтадан пайда болады
 - 2-3 күн бойы

- Құрғақ жөтел

- Тұмау

- Энантема

- Конъюнктивит

- Филатов Коплик – теріс

- **Лимфаденопатия**

Туа біткен қызамық

- Берілу жол – вертикальді
- Симптомдар
 - ВПС
 - ВПГ - хориоретинит (көз торының қабынуы), туа біткен катаракта, микрофтальмия
 - Микроцефалия
 - Саңыраулық
- Асқыныстар
 - Тромбоцитопениялық пурпура
 - Гепатоспленомегалия
 - Пневмония
 - Миокардит
 - ҚД
 - Энцефалит

Диагностика

- ЖҚА
 - лейкоцитопения
 - лимфоцитоз
- Антидене
 - анализді 2 рет өткізеді, арасында 10-14 күн
- Ұрықтың УЗД
- ИФА
- РПГА

Профилактика

- Вакцина
 - Рудивакс
 - Приорикс
- Алғашқы доза 12 айда
- Екінші доза 6 жаста

Желшешек

- Этиология – герпес вирусы 3 тип
- Инкубациялық период 10-21 күн



- Продормальді период
 - Бас ауруы
 - Тәбет жоғалуы
 - Бұлшықет ауырсынуы
- Бөрту кезеңі
 - **Бөртпе**
 - Розеола-папула-везикула-пустула(кейде)
 - Төменнен жоғарыға
 - **Лихорадка**
 - қабыршақтанады
 - Интоксикация
 - Құсу
- Реконвалесценция



Желшешек кезіндегі бөртпелер

Асқыныстар

- Желшешектік пневмония
 - Интоксикация
 - Лихорадка фебрильді
 - Бозару
 - Құрғақ жөтел
 - Ентігу
- Менингит
- Энцефалит
 - Кома
- Миокардит
- Эндокардит
- Гепатит
- Нефрит

Емі

- Жеңіл және орташа қалпында – үйде
- Ауыр түрі – бокста
- Антивирусты терапия
 - Ацикловир 20мг/кг/4 рет ішке
- Егер иммунитеті төмен болса
 - Ацикловир 10 мг/кг/3 рет 7 күн бойы
- Қызбаға қарсы
 - Парацетамол
- !!!Аспирин мүлдем болмайды – геморрагиялық синдромға әкеледі!!!
- Антигистаминді препарат
 - Кларитин
 - 2 жастан 12 жасқа дейін 1 қасық сироп 1 рет
- Зеленка

Назарларыңызға рахмет!!!