

Внематочная беременность

Выполнила: Тохтобина А.Г.

Студентка 420гр леч.

План:

- 1) Определение
- 2) Классификация, причины
- 3) Симптомы
- 4) Диагностика
- 5) Стадия перитонеального шока
- 6) Дифференциальный диагноз
- 7) Лечение

ЭКТОПИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ - беременность, при которой оплодотворенная яйцеклетка развивается вне полости матки.

• **КЛАССИФИКАЦИЯ:**

1. трубная (ампулярная, интерстициальная, истмическая);
 2. яичниковая;
 3. брюшная;
 4. в рудиментарном роге матки.
-

• **ПРИЧИНЫ:**

1. перенесенные ранее аднексит, эндометрит;
2. аборты в анамнезе;
3. ВМС;
4. нарушение гормональной функции яичников;
5. генитальный инфантилизм;
6. эндометриоз;
7. - перенесенные операции на внутренних половых органах (односторонняя тубэктомия, сальпингостоматопластика и др.);
- 8 - лечение по поводу бесплодия





Локализация плодного яйца в ампулярном отделе маточной трубы. Лапароскопия



Локализация плодного яйца в фимбриальном отделе маточной трубы. Лапароскопия.



Локализация плодного яйца в
интерстициальном (интрамуральном)
отделе маточной трубы. Лапароскопия



Локализация плодного яйца в
истмическом отделе маточной
трубы. Лапароскопия.

СИМПТОМЫ.

- Ведущий симптом - боли в нижних отделах живота,
 - которые могут иррадиировать в задний проход, лопатку, ключицу;
 - - аменорея 6 - 8 нед.;
-
1. наличие субъективных признаков беременности;
 2. цианоз или бледность экзоцервикса;
 3. матка грушевидной формы размягчена;
 4. величина матки меньше предполагаемого срока беременности;
 5. односторонний аднекстумор;
 6. боли при смещение шейки матки;
 7. мажущие кровянистые выделения;
 8. общие нарушения (ухудшение общего состояния, тошнота, жидкий стул, метеоризм).

Прервавшаяся эктопическая беременность.

- *Симптомы:* (зависят от характера прерывания эктопической беременности – по типу разрыва трубы или по типу трубного аборта):
- Приступообразные или острые боли в нижних отделах живота с иррадиацией в прямую кишку, ключицу («френикус-симптом»), лопатку;
- Предшествующая задержка очередной менструации с последующим появлением кровянистых выделений из половых путей (от скудных до умеренных);
- Наличие сомнительных признаков беременности;
- Признаки анемизации;
- При наличии массивного внутрибрюшного кровотечения – клиника, геморрагического шока, положительные перитонеальные симптомы;
- Незначительное увеличение и размягчение тела матки, не соответствующее сроку задержки менструации; пастозность и увеличение придатков матки на стороне поражения, сглаживание или напряжение заднего свода, резко болезненное при пальпации – «крик Дугласа».

Стадия перитонеального шока (*разрыв трубы*)

- внезапные интенсивные боли в нижних отделах живота;
 - иррадиация болей в эпигастральную область;
 - давления на прямую кишку;
 - тошнота, рвота;
 - френикус-симптом;
 - частый слабый пульс, падение артериального давления;
- перитонеальные симптомы в нижних отделах живота.

Диагностика:

- данные анамнеза (наличие хронического воспалительного процесса внутренних гениталий, генитального инфантилизма, ЗППП, бесплодие в анамнезе и др.), клиника;
- бимануальное исследование;
- развернутый анализ крови;
- определение содержания ХГ в крови и в моче
- УЗИ гениталий;
- эхографическое исследование органов малого таза с использованием трансвагинальных ультразвуковых преобразователей и цветового доплерообрушной полости через задний свод влагалища;
- Лапароскопия.
- кульдоцентез

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ:

- *1. Генитальные:*

1. нарушенная маточная беременность;
2. воспалительные заболевания органов малого таза;
3. перекрут ножки опухоли яичника;
4. нарушение питания субсерозной миомы матки;
5. эндометриоз.

-

- *2. Экстрагенитальные:*

1. острый аппендицит;
2. мочекаменная болезнь;
3. острый пиелонефрит;
4. колит;
5. холецистит;
6. прободная язва желудка и др.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

1. все больные с подозрением на внематочную беременность подлежат госпитализации в стационар;
2. при установлении диагноза - хирургическое вмешательство (лапароскопия, тубэктомия или пластическая операция на беременной трубе);
3. -терапия геморрагического шока при массивной кровопотере.

Консервативно-пластические операции

- Выдавливание плодного яйца, локализованного в фимбриальном отделе
- сальпинготомия
- Резекция сегмента маточной трубы или резекция яичника
- радикальные операции — тубэктомия.



Сальпинготомия. Лапароскопия.



Резекция сегмента маточной трубы. Лапароскопия.





Резекция сегмента маточной трубы.
яичника
Лапароскопия.

Спасибо за внимание!