

Греция

Департамент образования и науки Брянской области  
ГБОУ СПО «Дятьковский индустриальный техникум»


Индия

Аравия

Европа

Россия

# История тригонометрии



$$\frac{5 \times 98436}{10784} = 2.719372$$

Презентацию подготовила:

Студентка группы П-25

Бирюкова Елена



Преподаватель математики:

Манихина Т.А..


# Древняя

**Тригонометрия** – от греч. «измерение треугольников». Возникновение тригонометрии связано с землемерением, астрономией и строительным делом.

- Потребность в решении треугольников раньше всего возникла в астрономии: и в течении долгого времени тригонометрия развивалась изучалась как один из отделов астрономии. Несколько известно: способы решения треугольников (сферических) первые были письменно изложены греческим астрономом **Гиппархом** в середине 2 века до н.э. Наивысшими достижениями греческая тригонометрия обязана астроному **Птолемею** (2 век н.э.), создателю геоцентрической системы мира, господствовавшей до Коперника.



*Греческие астрономы не знали синусов, косинусов и тангенсов. Вместо таблиц этих величин они употребляли таблицы: позволяющие отыскать хорду окружности по стягиваемой дуге. Дуги измерялись в градусах и минутах; хорды тоже измерялись градусами (один градус составлял шестидесятую часть радиуса), минутами и секундами. Это шестидесятеричное подразделение греки заимствовали у вавилонян.*




# Индия


Значительные высоты достигла тригонометрия и у индийских средневековых астрономов.

**Главным достижением индийских астрономов стала :**

- Замена хорд синусами, что позволило вводить различные функции, связанные со сторонами и углами прямоугольного треугольника.

Таким образом в Индии было положено начало тригонометрии как учению о тригонометрических величинах. Индийские ученые пользовались различными тригонометрическими соотношениями, в том числе и теми, которые используются в современной науке.





## Индийцы также знали:

- Формулы для кратких углов  $\sin na$ ,  $\cos na$ , где  $n=2,3,4,5$ .
- Первая таблица синусов «Сурья-сиддханте» у Ариабхаты. Она приведена через 3,45.
- Позднее ученые составили более подробные таблицы: например Бхаскара приводит таблицу синусов через 1 .
- Южноиндийские математики в 16 веке добились больших успехов в области суммирования бесконечных числовых рядов. По-видимому, они занимались этими исследованиями, когда искали способы вычисления более точных значений числа **П. Нилаканта** словесно приводит правила разложения арктангенса в бесконечный степенной ряд. А в анонимном трактате «Каранападдхати» («Техника вычислений») даны правила разложения синуса и косинуса в бесконечные степенные ряды. Нужно сказать, что в Европе к подобным результатам подошли лишь в 17-18 веках.

# Аравия

- Значительный вклад в развитие тригонометрии внесли арабские ученые **аль-Батани** (850-929) и **Абу-ль-Вефа Мухамед-бен Мухамед** (940-998), который составил таблицы синусов и тангенсов через  $10'$  с точностью до  $1/60^4$ .



Аль-Батани



Насир аддин Туси

Теорему синусов уже знали индийский ученый **Бхаскара** (р. 1114, год смерти неизвестен) и азербайджанский астроном и математик **Насир аддин Туси Мухамед** (1201-1274). Кроме того, **Насир аддин Туси** в своей работе «Трактат о полном четырехстороннике» изложил плоскую и сферическую тригонометрию как самостоятельную дисциплину.




Бхаскара Ачарья

# ЕВРОПА


## Основные

- ### достижения:
- 1) Ряды для синусов и косинусов были найдены И.Ньютона в 1666 г.
  - 2) Ряд арктангенса найден Дж.Грегори в 1671 г. и Г.В. Лейбницем в 1673 г.
  - 3) Теорему тангенсов доказал Региомонтан

(латинизированное имя немецкого астронома и математика Иоганна Мюллера (1436-1476)). Региомонтан составил также подробные тригонометрические таблицы;




□ Дальнейшее развитие тригонометрия получила в трудах выдающихся астрономов Николая Коперника (1473-1543) – творца гелиоцентрической системы мира, Тихо Браге (1546-1601) и Иогана Кеплера (1571-1630), а также в работах математика Франсуа Виета (1540-1603), который полностью решил задачу об определениях всех элементов плоского или сферического треугольника по трем данным.



# История

- Современные обозначения синуса и косинуса знаками  $\sin x$  и  $\cos x$  были впервые введены в 1739 году И. Бернулли в письме к Петербургскому математику Л. Эйлеру. Последний пришел к выводу, что эти обозначения весьма удобны, и стал употреблять их в своих математических работах.
- Кроме того, Эйлер вводит следующие сокращенные обозначения тригонометрических функций угла  $x$ :  $\operatorname{tang} x$ ,  $\operatorname{cot} x$ ,  $\sec x$ ,  $\operatorname{cosec} x$ .
- Далее Эйлер установил связь тригонометрических функций с показательными и дал правило для определения знаков функций в различных четвертях круга.



Леонард Эйлер




Даниил Бернулли

# *Из истории синуса*

*В IV-V веках появился уже специальный термин в трудах по астрономии великого индийского учёного Ариабхаты, именем которого назван первый индийский спутник Земли. Отрезок АМ (рис. 1) он назвал *ардхаджива* (ардха – половина, джива – тетива лука, которую напоминает хорда).*


*Позднее появилось более краткое название джива.*



*Арабскими математиками в IX веке это слово было заменено на арабское слово джайб (выпуклость). При переводе арабских математических текстов в веке оно было заменено латинским синус (sinus – изгиб, кривизна).*

# Из истории косинуса

- ❖ Слово **косинус** намного моложе.
- ❖ **Косинус** – это сокращение латинского выражения *completely sinus*, т. е. “дополнительный синус”  
(или иначе “синус дополнительной дуги”;  $\cos a = \sin(90^\circ - a)$ ).





# Тангенс



от латинского *tanger* (касаться), появилось в 1583 г.

*Tangens* переводится как «касающийся» (линия тангенсов – касательная к единичной окружности)

✓ Тангенс (а также котангенс) введен в X веке арабским математиком Абу-ль-Вафой, который составил и первые таблицы для нахождения тангенсов и котангенсов.

✓ Однако эти открытия долгое время оставались неизвестными европейским ученым, и тангенсы были заново открыты лишь в XIV веке немецким математиком, астрономом Региомонтаном (1467 г.).

Он доказал теорему тангенсов. Региомонтан составил также подробные тригонометрические таблицы; благодаря его трудам плоская и сферическая тригонометрия стала самостоятельной дисциплиной и в Европе.

# Викторина!




# Вопрос № 1

**Какой из русских пословиц наиболее соответствует график функции  $y = \sin x$  и почему?**

Чем дальше в лес,  
тем больше дров.

Выше меры конь не скачет.

Дальше кумы, меньше греха.



Верно!



Следующий  
вопрос!

Неверно! Попробуйте еще раз!

[Вернуться к вопросу!](#)



# Вопрос № 2

**Кто ввел названия тригонометрических функций:**

**A) Тангенса?**

Региомонтан


Исаак Ньютон

Аль-Хорезми



# Правильно!

**Следующий вопрос!**



# Неправильно!

*Вернуться к вопросу!*

# Вопрос № 3

**Кто ввел названия тригонометрических функций:**

**Б) Синуса?**

Римские ученые

Арабские ученые

Европейцы




# Умница!

*Следующий вопрос!*



Неверно! Попробуйте еще раз!

*Вернуться к вопросу!*



# Вопрос № 4

***Что означает слово «тригонометрия»?***

*«учение о синусах»*

*«измерение косинусов»*

*«измерение треугольников»*



# Верно! Поздравляю!



**Завершить  
тест**

# *Не торопитесь!*

*Вернуться к вопросу!*

Спасибо за внимание!

