



Тема: «Свербіж шкіри, як прояв патології внутрішніх органів. Дерматозоозози»



Актуальність теми:

Дерматозоозози (паразитарні хвороби шкіри) – розвиваються як відповідна реакція на дію тваринних паразитів: простіших, кишечнопорожнинних, червів, членистоногих і молюсків. Серед паразитарних дерматозів людини найбільш часто зустрічається короста, вшивість, демодекоз. Враховуючи важливість своєчасного розпізнавання і проведення лікувально-профілактичних заходів, з метою попередження можливості поширення цих заразних захворювань шкіри є актуальним вивчення клінічного перебігу та їх діагностики.



План:

- 1.** Уявлення про свербіж людини, класифікація.
- 2.** Кропивниця, локалізація, клініка.
- 3.** Особливості клінічного перебігу нейродерміту.
- 4.** Гострий набряк Квінке, основні діагностичні клінічні ознаки.
- 5.** Дитяча сверблячка, локалізація, клініка
- 6.** Дерматозоозози(короста, педикульоз) клінічні особливості, класифікація і лікування.



Свербіж

Загальний
(універсальний)

Місцевий
(локалізований)



Загальний свербіж при:

злоякісних
захворюваннях

Хронічних
захворюваннях
ШКТ

Вагітності

Захворюваннях
печінки (цироз,
гепатит)

Ендокринних
патологіях
(цукровий діабет



Загальний свербіж

Старечий (у чоловіків **60-70** років) нічні приступи свербежу.

При: атеросклерозі, склерозі нирок, гіпертрофії простати

Сезонний (у пацієнтів з вегетосудинною дистонією)



Місцевий свербіж

Свербіж
статевих
органів у
жінок;

Свербіж
заднього
проходу у
чоловіків;



**Запальні
захворювання
статевих органів**

**Сексуальні
неврози,
неохайність**

Клімакс

**Причини
свербежу
статевих
органів у
жінок**

Гельмінтози

**Трихомоніаз,
молочниця**



**Неохай-
ність**

**Простат
ит**

**Причини
свербежу
заднього
проходу у
чоловіків**

Проктит

**Гельмінт
о-зи**



Кропивниця - алергічна
реакція на хімічні речовини
побутового характеру, їжу чи
медикаменти.



Локалізація:

шкіра всього тіла

Клінічні прояви:

- 1.** На фоні гіперемії і набряку утворюються волдирі .
- 2.** Волдирі зливаються між собою, утворюючи уртикарні бляшки.
- 3.** Легкий свербіж шкіри.





Лікування:

1. Антигістамінні Тавегіл, Супрастин, Діазолін, Цетрин, Лоратадин, Едем, Кларитин





2. Сорбенти

- Біле і чорне вугілля
- Сорбекс
- Ентеросгель





3. Дезінтоксикаційна терапія

- 0,9% Натрій Хлор
- 5% Глюкоза
- Реосорбілакт



Місцево:

гормональні мазі :

- 1) Дермовейт
- 2) Целестодерм
- 3) Преднізолон
- 4) Синафлан
- 5) Бетасалік



АПТЕКА 9-1-1





Нейродерміт

1) Обмежений

2) Дифузний

Локалізація:

- 1. Задня і бокова поверхня шиї;**
- 2. На згинальній поверхні ліктювих і колінних суглобів.**



Обмежений нейродерміт

Клінічні прояви:

Вузлики зливаються між собою і утворюють явище ліхенізації.





Дифузний нейродерміт

Клінічні прояви:

на фоні ерітеми

Ліхенізація





Гострий набряк Квінке

ускладнена алергічна реакція, на укуси бджіл, комах чи дію медикаментів.



Локалізація і клініка :

1. Набряк повік, щік, носа, губ.

2. Шкіра туго-еластична, кольору

білого мрамору, неможливо взяти в складку.

3. Якщо не надати допомогу виникне асфіксія.





Невідкладна допомога



0,1% Адреналін;

2. Сечогінні (Лазікс) .

3. Антигістамінні (Тавегіл)

4. Кальцію Глюконат **10%, 10** мл

5. Гормони (Преднізолон, Гідрокортизон, Дексаметазон)





Дитяча сверблячка

Локалізація :

Розгинальні поверхні ліктювих і колінних суглобів.

Клініка:

Пухир – вузлик – пухирець

- ерозія – кірка- пігментація рожевого кольору



Дерматозоозози

Короста (**scabies**)

Скарги :

вечірній і нічний свербіж.

Цикл розвитку:

- 1.Самець після запліднення гине;
- 2.самка щодня відкладає по **50** яєць і через стадію личинки виходить нове покоління кліщів.
3. Інкубаційний період **7 – 10** днів, до одного місяця.





Клініка:



- 1. Парні вузлики і поодинокі пухирці;**
- 2. Коростяні ходи;**
- 3. Екскоріації;**



Лікування:



- 1. Бензилбензоат (мазь, крем, бовтанка)**
- 2. Аерозоль «Спрегаль»;**
- 3. Перметринова мазь.**
- 4. Сірчана мазь;**
- 5. Екстренне повідомлення в санепідемстанцію і до дерматолога.**



Педикульоз (вшивість)

3 види вошей :

- Головна;
- Одежна;
- Лобкова;



Локалізація головної воші :

- Скронева і потилична ділянка;

Цикл розвитку :

Самка кожен день відкладає по **4** яйця – гниди, які сіро-білого кольору. З них через місяць через стадію личинки виходить нове покоління вошей. Живе вона **38** днів. Гниди приклеюються до нижньої частини стержня волосся хітином.



Лікування:

- 38 наказ;
- Пара-плюс;
- Паранікс;
- Нітіфор;
- Опофос;
- Антіпі.



Надія ніколи, навіть
у найскладніших
життєвих
ситуаціях, не
залишає людину...

і якщо є **віра** в краще
і любов до життя,
то все неодмінно
налагодиться !

