


Контагиозный моллюск

Раднаев Б.Д.

448гр

Этиология

Вирусная инфекция, вызываемая одним из вирусов группы оспы, которая поражает кожу и иногда слизистые оболочки. Наиболее часто инфекция возникает у детей в возрасте от одного до десяти лет. Инфекция передается при непосредственном контакте с больным или через загрязненные предметы



Возбудитель

Вирус поражает только человека, не переносится животными и близок к вирусам оспы. Существует 4 типа вируса контагиозного моллюска (MSV-1, MSV-2, MSV-3, MSV-4). Из них наиболее распространён MSV-1, а MSV-2 обычно проявляется у взрослых и часто передается половым путем. Также может передаваться через воду (например, бассейн). Внутри образования находится жидкость, через которую он переносится и размножается.

Патогенез

Контагиозный моллюск это доброкачественное новообразование кожи; синтез ДНК-вируса происходит в кератиноцитах эпидермиса, после размножения вируса в клетках хозяина блокируется активность Т-лимфоцитов, а потому иммунные клетки при поражении отсутствуют, что и объясняет иммунную толерантность, которая благоприятствует возбудителю при инфицировании.

Клиника

Инкубационный период длится от 2 недель до нескольких месяцев. Вначале на коже возникают мелкие, плоские узелки (1-2 мм) беловато-жёлтого цвета с перламутровым оттенком, которые быстро становятся крупными (5-7 мм) и принимают полушаровидную форму с центральным пупкообразным вдавлением. При надавливании на узелок выходит творожистая белая масса, при микроскопических исследованиях которой выявляются дегенеративные овальные эпителиальные клетки с крупными протоплазматическими включениями (моллюсковые тельца Липшютца). Элементы расположены изолированно, но могут сливаться, образуя крупные бляшки размерами до 1-2 см (гигантская форма), или располагаться на тонкой ножке (педиккулярная форма). Количество узелков чаще варьируется от 1-2 до 10. Описаны случаи генерализованного контагиозного моллюска, когда количество элементов достигает нескольких десятков. При этом элементы бывают мелких размеров (милиарная форма)

Сегодня различается три основные формы развития такого заболевания, как контагиозный моллюск:

-первая стадия – стадия типичного развития, которая характеризуется проявлением ярко выраженных признаков заболевания (сравнительно небольшое количество новообразований, которые начинают занимать определенный участок кожи, при этом располагаются они максимально близко друг к другу)

Начальная стадия



Вторая стадия

– это стадия генерализованного развития, которая проявляется значительным увеличением уже существующих новообразований, при этом они поражают участки кожного покрова, расположенные довольно далеко друг от друга;



третья стадия

– это стадия осложненного развития, при наличии которой начинает наблюдаться появление болезнетворных микроорганизмов, которые сопровождают заболевание. Главной отличительной чертой симптомов заболевания, которое проявляется на данной стадии – это начало возникновения покраснения кожного покрова (воспаления), вокруг новообразований, из которых может выделяться гной. В результате этого явления гнойнички начинают вызывать довольно неприятные





Профилактика

-заняться повышением
сопротивляемости собственного
организма разнообразным
инфекциям

-строгое соблюдение правил
личной гигиены. В обязательном
порядке надо будет обратиться к
дерматологу в том случае, если
на поверхности кожи появляется
какое-то непривычное
высыпание, шелушение,
покраснение либо чувство зуда.

В зоне риска находятся именно
маленькие дети.

Следовательно, родителям
необходимо регулярно и очень
внимательно осматривать кожу
ребенка – данное заболевание
обладает способностью
передаваться очень быстро в
детском коллективе от больного
ребенка к здоровому.

Лечение

- удаление образовавшихся узелков механическим путем, после чего поверхность кожи обрабатывается спиртовым раствором йода 5%
- прижигание либо диатермокоагуляция;
- обработка поврежденных участков кожи иммуномодуляторами и специальными современными противовирусными мазями;
- в том случае, если на поверхности кожи больного, локализуется очень большое количество узелков, тогда врач может назначить прием антибиотиков, относящихся к

Определить стадию















Конец