

ЕЖЕГОДНАЯ ВНУТРИВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКУШЕРСТВО И




По определению ВОЗ, аборт – это прерывание беременности (самопроизвольное изгнание или извлечение эмбриона/плода) в период до 22 нед. беременности или до достижения плодом массы тела, равной 500 г. (в нашей стране до 28 недель)



Двенадцатая неделя беременности




28 недель



САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ




ЭТИОЛОГИЯ



Воспаленная
эндометрия




Нормальный
эндометрий




Медицинский справочник
• симптомы, причины и лечение •

Факторы риска:



Паритет





Курение



Выбери будущее своего ребенка!

НПВС






ЭКО






Выделяют следующие стадии самопроизвольного аборта:


- угрожающий аборт;
 - начавшийся аборт;
 - аборт в ходу (полный и неполный);
- 



Угрожающий аборт



Начавшийся аборт



Неполный аборт





Томасов, 1989

Лечение



Искусственный

аборт – преднамеренное прерывание беременности в сроки до 28 недель:

- медицинский
- криминальный

Медицинский искусственный аборт





Методы проведения искусственного медицинского аборта:

- на хирургические, или
инструментальные;



- медикаментозные.

Медикаментозный аборт




Хирургические методы аборта




Вакуумная аспирация


Мини Аборт



Дилатация и кюретаж



Дилатация и эвакуация



Интересно знать!

Селективный аборт



Селективная редукция при многоплодии



Криминальный аборт – прерывание беременности самой женщиной или другим лицом, произведенное вне лечебного учреждения.



Общее воздействие на организм. К этому варианту криминальных абортот относятся все те методы, которые не имеют прямого воздействия на беременную матку.





Непосредственное воздействие на матку

К этому варианту незаконных абортов относится введение в полость матки различных твердых предметов: шариковые ручки, карандаши, вязальные спицы, птичьи перья, катетеры.

в истории человечества для прерывания беременности использовались различные растения: пижма, мята болотная, жеруха.




Иногда выкидыш пытаются
вызвать при помощи
самостоятельного
употребления медицинских
препаратов





Осложнения при искусственном прерывании беременности

ия матки



Заболевания локализованные в малом тазу

Пельвиоперитонит




Перитонит



trvoylechebnik.ru

Сепсис





Осложнения, возникающие при последующих беременностях и родах:

1. Привычное невынашивание
 2. Угроза выкидыша
 3. Преждевременные роды
 4. Слабость родовой деятельности
 5. Неправильное прикрепление плаценты
 7. Плацентарная недостаточность
- 

Внематочная беременность



Варианты аномалий прикрепления плаценты



КРАЕВОЕ



БОКОВОЕ




ПОЛНОЕ

Отслойка плаценты




Нормальная плацента



Кровь

Отслойка плаценты

Неправильное положение плода в полости матки



The End





Научный руководитель

к.м.н., доцент кафедры
«хирургических болезней с
курсом топографической
анатомии и оперативной
хирургии



**Хачирова Золухан
Хызыровна**

Работу выполнили ЛД 122/2:









РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ВЫПИСКА НОВОРОЖДЕННЫХ

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ





Абасов Руслан Шахбанович
Боташева Аминат Султановна
Борлакова Зухра Ахматовна
Дибиралиев Ахмед Эльдарович
Магомедкамилов Шамиль
Магомедкамилович
Нартикова Нателла Хасановна
Хубиева Земфира Добаевна
Чотчаева Асият Умар-Алиевна
Чичханчиева Мадина Владимировна
Хабова Мадина Казбековна