

***ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ПОЛОСТНЫЕ  
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ***

**Презентацию сделала  
студентка группы  
02-2ПЭ Каткова Анна**

# ПЕРВИЧНЫЕ ПОЛОСТНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- Пузырёк (Vesicula)
- Экзема



- Пузырь (Bulla)
- Герпес



□ Гнойничок (Pustula)

□ Акне



## ВТОРИЧНЫЕ ПОЛОСТНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- Гиперпигментация (Hyperpigmentatio)
- Цветной лишай



□ Депигментация (Нуропигментatio)

□ Альбинизм



□ Чешуйка (Squama)

□ Ихтиоз



- Эрозия (Erosio)
- Синдром Лайелла





## □ Ссадина (Excoriatio)



□ Язва (Ulcer)

□ Меланома



- Трещина (Fissura)
- Контактный дерматит



- Корка (Crusta)
- Импетиго



- Рубец (Cicatrix)
- Опоясывающий лишай



- Атрофия
- Склеродермия



- Лихенификация (Lichenisatio)
- Псориаз



□ Вегетация (Vegetatio)

□ Акантоз

