


ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ  
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА  
УНИВЕРСИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК  
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.  
АСФЕНДИЯРОВА

## *Дерматологияда қолданылатын жергілікті препараттар*



Орындаған: Мадияр Р. К.

Топ: 712-1к

Факультет: ЖТД

Қабылдаған: Кенжебекова Б.У.

# Жоспары:

- Антибактериальды препараттарға жалпы сипаттама.
  - Классификация
- Антибиотиктердің топикалық түрі және сипаттамалары.
  - Қосарланған антибиотиктер



## *Жергілікті антибактериалді препараттар*

Сыртқа қолданылатын антибактериальді заттар (топикалық антибиотиктер) – жергілікті қолданылатын заттардың үлкен тобы. Олар импетиго, фурункул, карбункул, бактериалді фолликулит, акне басқа да бактериалды этиологиялы аурулардың емінде қолданылады.




❖ Нозологияда, ауырлық дәрежесі, жайылуы және патологиялық процесстің орналасуына байланысты топикалық антибактериалды препараттар әр түрлі дәрілік формада және жүйелі антибиотиктермен бірігеді.



Әр жергілікті антибактериальді препараттардың әсері патологиялық өзгерістерді тудыратын бактериялардың сезімталдығымен анықталады.

Әсер етеін заттар	Шығарылу Формасы, концентрация	Тауарлық атауы
<b>Топикалық антибиотиктер</b>		
Амикацин	гель 5%	"Ликацин"
Гентамицина сульфат	мазь 0,1%	"Гарамицин"
Тетрациклина гидрохлорид	мазь 3%	"Тетрациклиновая мазь"
Клиндамицин	гель 1%	"Далацин", "Клиндовит"
Хлорамфеникол	линимент 1%, 5%, 10%	"Линимент синтомицина"
Эритромицин	мазь 1%, раствор 4%	"Эритромицин", "Зинерит"
Мупироцин	крем, мазь 2%	"Бактробан", "Супироцин"
<b>Сыртқы антибактериальді препараттар</b>		
Бензоила пероксид	гель 5%	"Базирон АС"
Фузидиевая кислота	крем, мазь, гель 2%	"Фуцидин"
Метронидазол	крем, гель 1%	"Розамет"
Сульфатиазол серебра	крем 2%	"Аргосульфан"
Поливидона йодид	мазь	"Бетадин"
<b>Антибиотикпен қосарланған препараттар</b>		
Левомецетин / Метилурацил	мазь	"Левомеколь"
Неомицин/ Бацитрацин	мазь	"Банеоцин"
Эритромицин/ Бензоила пероксид	гель	"Бензамицин"
Эритромицин / Цинка ацетат	раствор	"Зинерит"
Левомецетин / Метилурацил/ Сульфодиметоксин/ Тримекаин	мазь	"Левосин"
Хлорамфеникол/ Клостридопептидаза	мазь	"Ируксол"

# Амикацин



Антибактериальді, туберкулезге қарсы әсер етеді. грам (+) және грам (-) микроорганизмдерге активті (синегнойная и кишечная палочки, клебсиеллы, серрации, провиденсии, энтеробактер, сальмонеллы, шигеллы, стафилококки).

**Фармакологиялық әсері**

Бактериемия и септицемия (нәрестелер сепсисін қоса), зәр шығару жүйесі инфекциясында, тері мен жұмсақ тіндердің, тыныс жолдары, сүйек, буын, менингит, инфицирленген күйік.

**Қолдануға көрсеткіштер**

5 % гель сыртқа қолдануға арналған

**Шығару формасы**

Қарсы  
көрсеткіштер

Сезімталдықтың жоғарылауы

Жанама әсері

- Есту бұзылысы, бүйрек,  
ОЖЖ бұзылысы

Қолданылуы,  
дозасы

Сыртқа. Гель. 3-5 см  
ұзындықта жағылады, оңай  
сүртіледі, зақымданған  
аймақта тәулігіне 1 рет

# ГЕНТАМИЦИН СУЛЬФАТЫ



## Фармакодинамика

- Гентамицин кең спектрлі антимиқробты әсері бар препарат. Грам (+) және грам (-) микроорганизмдерге активті : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus spp. . Препарат анаэробты бактерия, вирустар, саңырауқұлақтарға әсер етпейді. Бактерицидті әсер көрсетеді. Бактерияның клеткалық мембранасына еніп, 30 S бактериалды рибосомамен байланысып, белок синтезін

## Фармакокинетика

- Мазды зақымданған жерге жаққаннан кейін оңай сіңеді, жүйелі абсорбция жоғарылайды.
- 1 рет жаққаннан кейін әсер ету ұзақтығы 8-12 сағ. Ол бүйрек арқылы шығатын

## Қолдану әдісі және дозасы

- Мазь құрғақ теріге жағылады.
- Препарат зақымданған аймаққа іріңді және некротикалық масса алынып тасталғаннан кейін жағылады. Жұқаланып күніне 2-3 рет , күйік кезінде 2-3 рет аптасына жағылады. Көлемді күйік кезінде тәуліктік доза 200 г аспауы керек. Ұзақтығы аурудың формасына және ауырлығына байланысты 7-14 күн.
- Дерматологиялық ауру кезінде жұқалап 2-3 рет күніне жағу керек, немесе марлевая повязка қою керек. Емдеу ұзақтығы — 7-14 дней.



# Қолдануға көрсеткіш

Терінің  
біріншілік  
инфекциясы



импетиго, беткей  
фолликулит,  
фурункулез,  
инфицированное  
акне.



Терінің  
екіншілік  
инфекциясы



инфекциялы экзематозды  
дерматит, инфицирлі  
себорейлі дерматит,  
инфицирлі жырылулар,  
бактериальді суперинфекция  
саңырауқұлақ және вирус  
кезінде

## Жанама әсері:



- Жергілікті тітіркену белгілері: қызару, қышу, күйдіру.
- Аллергиялық реакциялар (бөртпелер, қышыну, есекжем, қызба,, ангионевротикалық ісіну, эозинофилия). Аллергия реакциясы пайда болған кезде препарат алынып тасталынады да, десенсибилизирующую терапия жүргізіледі.
- Гентамицинді сыртқа ұзақ уақыт қабылдағанда резорбтивті әсерін бақылау керек, әсіресе созылмалы бүйрек жетіспеушілігі кезінде. Жергілікті қолданғаннан кейін ототоксикалық, вестибулярлы, ангионевротикалық әсер етеді

## Қарсы көрсеткіштер



- Жоғарылаған сезімталдық
- Аминогликозидтермен бірге енгізу
- Бүйректік жетіспеушілік
- 3 жасқа дейінгі балалар, жүктілік (1 триместр).
  - Шырышты қабатқа әсіресе көздің шырышты қабатына жағуға болмайды.

# Тетрациклин мазь



## •Фармакологиялық қасиеттері

Аэробты грамон (Staphylococcus spp., сонымен бірге пенициллиназа өндіретін штаммдар, Streptococcus spp.) және грамтеріс (Neisseria gonorrhoeae, Bordotella pertussis, Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp.) Бактериялар жасушаларындағы ақуыздар синтезін бәсеңдету есебінен бактериостатикалық әсер етеді.

•Қолданылуы жұмсақ тіндердің іріндерінің жұқпасында фурункулезде, жұқтырылған экземада бөртпе, безеу бөртпесінде, фолликулитте

## •Қолдану тәсілі және дозасы

Сыртқа. Жақпа майды зақымдану ошағына тікелей тәулігіне 1—2 рет немесе 12—24 сағатқа қойылатын таңғыш ретінде қолданады. Емдеу препараттың тиімділігі және оны наукастардың көтера алушылықтарына қарай 3 аптаға дейін жалғастырады.

Жағымсыз әсерлер сирек аллергиялық реакциялар

## Клиндамицина фосфат

Фармакологиялық әсері	Линкозамид тобының антибиотиктері . Клиндамицина фосфат in vitro активті емес, бірақ теріге жаққаннан кейін тез фосфатазамен гидролизденеді, клиндамицин түзеді, антибактериалді қасиетке ие. <i>Propionibacterium acnes</i> штаммына сезімтал екені анықталған. Теріге жаққаннан кейін тері бетіндегі бос май қышқылыны азаяды 14% дан 2%.
Қолдануға көрсеткіштер	Вульгарлы безеу
Шығару формасы	◇ Гель для наружного применения 1% в виде прозрачной, бесцветной, вязкой массы.
Қарсы көрсеткіштер:	антибиотик-ассоциированный колит в анамнезе; — возраст до 12 лет (данные по безопасности и эффективности отсутствуют); — повышенная чувствительность к клиндамицину или <a href="#">линкомицину</a> в анамнезе.
Дозировка	Сыртқа. Жұқалап зақымданған аймаққа, таза құрғақ теріге 2 рет тәул. 6-8 аптаға дейін қолданады, 6 айға дейін ұзартуға болады.
Жағымсыз әсері	фолликулит. Көздегі ауру сезімі. боль в глазах. Ас қорыту бұзылысы, іштегі ауру сезімі, псевдомембранозды колит. Жиі тері құрғауы, есекжем, себорея, контактный дерматит.

# Хлорамфеникол 5 % Линимент

## Фармакотерапиялық тобы

- Тері ауруларын емдеуге арналған бактерияларға қарсы және микробтарға қарсы

## Фармакодинамикасы

- Синтомициннің ең бастапқы әсер етушісі микробтарға қарсы белсенділікке ие левомецетин (хлорамфеникол) болып табылады.
- Микробтарға қарсы әсер ету механизмі микроорганизмдер ақуыздары синтезінің бұзылуымен байланысты.
- Көптеген грамаң және грамтеріс бактериялар, риккетсиялар, спирохет, трахома, пситтакоз, шаптық лимфогранулематоз қоздырғыштарына қатысты тиімді. Пенициллинге, стрептомицинге, сульфаниламидке төзімді бактериялар штаммдарына әсер етеді. Қышқылға-төзімді бактерияларға, көкіріңді таяқшаларға, кластридияларға және қарапайымдыларға белсенділігі әлсіздеу

## Қолданылуы

- - сезімтал микроорганизмдерден туындаған терінің іріңді-қабынбалы зақымдануларында, жара үдерісінің II фазасында (ірің, некроздалған тіндер болмаған кезде)
- - трофикалық ойық жараларда
- - II-III дәрежелі күйіктерде

## Жағымсыз әсерлері

- тері бөртпесі, есекжем, ангионевротикалық ісіну
- тромбоцитопения, эритропения, гранулоцитоз, апластикалық анемия, лейкопения, агранулоцитоз.

## Қолдану тәсілі мен дозалары

- Линиментті алдын ала асептикалық дайындықтан өткен зақымданған аймаққа жағады.
- Препаратпен өңделген бетке дәке таңғышты немесе препарат сіңірілген дәке тампонын қояды.
- Қайта таңу әдетте 1-3 күннен соң, кейде 4-5 күннен кейін жүргізіледі.
- Таңу жиілігін емдеуші дәрігер тағайындайды.

## Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препарат компоненттеріне жекелей жоғары сезімталдық
- сүйек кеміктік қан түзілудің бәсеңдеуі
- жедел алма-кезекті порфирия
- глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа тапшылығы
- бауыр және/немесе бүйрек жеткіліксіздігі
- тері аурулары (псориаз, экзема, зеңдік зақымданулар)
- жүктілік және лактация кезеңі
- жаңа туылған кезең (4 аптаға дейін)

# Эритромицин

**Фармакологиялық қасиеттері:**  
Безеулерді емдеу үшін сыртқа қолдануға арналған микробтарға қарсы препараттар.

## **Фармакодинамикасы**

Макролидтер тобының бактериостатикалық антибиотигі. Әсер ету ауқымына грам оң (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bacillus anthracis*, *Corinebacterium diphtheriae*) және грам теріс (*Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus influenzae*, *Bordetella pertussis*, *Brucella* spp., *Legionella* spp.)

**Қолданылу:**  
Жұмсақ тіндердің іріңді жұқпалары: - іріңді ауруларда, жасөспірімдік безеулерде, жұқтырылған жараларда, ойылуларда, II және III дәрежелі күйлерде, трофикалық ойық жараларда.

**Қолданылу тәсілі және дозалары:**  
Сыртқа. Жақпа майды терінің зақымданған жерлеріне күніне 2-3 рет жағады, күйлерде - аптасына 2-3 рет. Емдеу курсы - 1-2 ай.



# Бензоила пероксид

Фармакологиялық тобы

- Безеу бөртпесін емдеуге арналған препараттар. Бензоилдің асқын тотығы.

фармакокинетика

- Бензоил пероксиді тері арқылы сіңіріледі. Оның негізгі бөлігі бензой қышқылына айналады, ол сіңгеннен кейін жүйелі қан ағымына түседі және бүйрекпен тез шығарылады. Тіндерде жинақталуы болмайды. *Propionibacterium acnes* және *Staphylococcus epidermidis* қатысты микробқа қарсы белсенділік танытады.

Қолданылуы

- жеңіл және орташа дәрежедегі безеу бөртпесінде

Емдеу тәсілі

- Гельді саусақтың ұшымен жеңіл массаждық қимылмен тәулігіне 1-2 рет (таңертең және кешке) құрғақ таза теріге жағу керек. Емдік әсері 4 апта емдегеннен кейін дамиды, 3 ай емдегеннен кейін тұрақты жақсарады.

Жағымсыз әсерлері

- жергілікті тітіркену (қызару, қабыршақтану, терінің құрғауы, күйдіру сезімі)
- - аллергиялық жанаспалы дерматит



# Левомеколь

<b>Фармакологиялық әсері</b>	<p>Тері ауруларын емдеуге арналған бактерияға қарсы препараттар және микробтарға қарсы препараттар.</p> <p>Жергілікті қолдануға арналған біріктірілген препарат, микробтарға қарсы, қабынуға қарсы (сусыздандыратын) әсер етеді, грамоң және грамтеріс микроорганизмдер – стафилококктарға, көк іріңді және ішек таяқшаларына қатысты белсенді.</p>
<b>Қолдануға көрсеткіштер</b>	<p>аралас микрофлорамен (стафилококктарды, көк іріңді және ішек таяқшаларын қосқанда) жұқтырылған іріңді жараларды жаралану үдерісінің алғашқы (іріңді-некроздық) сатысында жергілікті емдеу.</p>
<b>Қарсы көрсеткіштер:</b>	<p>препарат компоненттеріне аса жоғары сезімталдық</p> <p>1 жасқа дейінгі балалар</p>
<b>Дозировка</b>	<p>Жергілікті. Жақпамайды стерильді дәке салфеткаға сіңіреді, онымен жараны стандартты хирургиялық өңдеуден (некроздалған тіндерді механикалық жолмен жойғаннан, сутегінің асқын тотығымен шайғаннан) кейін қопсытып толтырады.</p>
<b>Жағымсыз әсері</b>	<p>аллергиялық реакциялар (тері бөртулері)</p>

# Эритромицин + бензоил асқын тотығы.

## Фармакотерапиялық тобы

- Сыртқа әсер ететін қосарланған препарат. Антибиотик + макролид Тері ауруларын емдеуге арналған бактерияларға қарсы және микробтарға қарсы препараттар.

## Фармакодинамикасы

- Эритромицин обладает бактериостатическим действием на микроорганизмы *Propionibacteria acne* и *Streptococcus epidermidis*, которые вызывают угревую сыть, а цинк уменьшает выработку секрета сальных желез.

## Қолданылуы

- препарат предназначен для наружного применения. 2 раза в сутки: Длительность курса составляет 10-12 недель. Первое улучшение может наблюдаться спустя 2 недели от начала лечения.

**Жанама әсері:** Күйдіру, тітіркендіру, терінің құрғауы

# Левосин.

## Фармакологиялық әсері

• микробқа қарсы, қабынуға қарсы, ауыруды басатын және некротикалық әсер ететін біріктірілген препарат. Препарат грамоң және грамтеріс микроорганизмдерге, сондай-ақ анаэробтарға қатысты белсенділікке ие.

## Қолдануға көрсеткіштер

• жара үдерісінің бірінші (ірінді-некротикалық) фазасындағы ірінді жараларда (соның ішінде аралас микрофлорамен жұқпаланған: күйіктер, жазылуы қиын жаралар).

## Қолдану формасы

• Сыртқа. Жараны кеуекті толтырып тұратын стерильді дәке сүрткілерге жақпамайды сіндіреді. Препаратты ірінді қуыстарға еккіштің көмегімен катетер арқылы (дренажды түтік) енгізуге болады. Бұл жағдайда жақпамайды алдын-ала 35-36 °C-ге дейін жылытады. Таңуды күн сайын, жараны ірінді-некротикалық жараларды ірінді массалардан толық тазартқанша жүргізеді.

## Қарсы көрсеткіштер

- Сезімталдықтың жоғарылауы

## Жанама әсері

- тері бөртпелері түріндегі аллергиялық реакциялар, олар пайда болса препаратты қолдануды тоқтату қажет.