



**Лимфатико-
гиопластический
диатез**

Лимфатико-гипопластический

диатез (ЛГД) - аномалия конституции, характеризующаяся генерализованной гиперплазией центральных и периферических лимфатических органов, (тимуса, лимфатических узлов, селезенки), гипоплазией ряда внутренних органов (сердца, почек), гипофункцией эндокринных желез (надпочечников, половых желез, щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарной системы), лабильностью водно-электролитного обмена, нарушением метаболизма липидов и углеводов в сочетании с иммунологическими



Классификация ЛДГ

Различают две клинические формы:

- Макросомальная
- Микросомальная



Клиника

Специфический фенотип:

- « мягкие » черты лица;
- Бледность без анемии;
- « мраморность » кожи;
- Пастозность подкожной клетчатки;
- Мышечная гипотония;
- Снижение возбудимости ЦНС;

Клиника

Особенности физического развития:

- Большая масса и рост при рождении;
- Увеличение головы и живота;
- Длинные конечности, стопы и кисти;
- Короткая шея.

Гиперплазия лимфоидной ткани вне связи с инфекцией:

- Периферические лимфоузлы;
- Увеличение миндалин, аденоидов;
- Увеличение селезенки.

Лимфатико-гипопластический диатез




Лечение

Организация рационального питания:

- Увеличение числа кормлений с уменьшением разового объема пищи;
- Уменьшение в рационе легкоусвояемых углеводов и жиров;



Ограничить аллергические продукты!



Фитотерапия

НАСТОЙКА ЭЛЕУТЕРОКОККА;
НАСТОЙКА ЖЕНЬ-ШЕНЯ;
НАСТОЙКА ЛЕВЗЕИ;
НАСТОЙКА КИТАЙСКОГО
ЛИМОННИКА;
НАСТОЙКА КАЛЕНДУЛЫ 1-2
КАПЛИ НА ГОД ЖИЗНИ.

Сестринский уход при лимфатико-гипопластическом диатезе

- Правильное питание. Ограничение употребления в пищу жирной и соленой пищи;
- Осуществлять профилактику ОРЗ;
- Проводить гигиенические и лечебные ванны, ввести физкультуру и курс массажа;
- Ежедневные прогулки на свежем воздухе.





Спасибо за
внимание!!!