

КРАСНАЯ КНИГА




ПТИЦЫ РОССИИ

КРАСНЫЙ КОРШУН, МАНДАРИНКА,
СТЕРХ, РОЗОВЫЙ ПЕЛИКАН,
БАКЛАН МАЛЫЙ, ДЯТЕЛ СРЕДНИЙ,
ДАУРСКИЙ ЖУРАВЛЬ,
РЕЛИКТОВАЯ ЧАЙКА

«КРАСНОКНИЖН
ЫЕ
ПТИЦЫ»

ЧЕРНЫЙ АИСТ

- Чёрный аист (*Ciconia nigra*) — редкая птица, относящаяся к семейству Аистовые и отряду Аистообразные.
- В настоящее время черные аисты занесены в Красную книгу на таких территориях, как Россия и Беларусь, Болгария, Таджикистан и Узбекистан, Украина и Казахстан. Птицу можно увидеть на страницах Красной книги Мордовии, а также Волгоградской, Саратовской и Ивановской областей.



ОПИСАНИЕ ЧЕРНОГО АИСТА

Для верхней части туловища характерно наличие черных перьев с зеленоватым и насыщенным красным переливами.

В нижней части тела окрас перьев представлен белым цветом.


Взрослая птица отличается довольно крупными внушительными размерами.

Средняя высота черного аиста составляет 1,0-1,1 м

при массе тела в 2,8-3,0 кг.

Размах крыльев у пернатого может варьировать

в пределах 1,50-1,55 м.



Стройная и красивая птица отличается стройными ногами, изящной шеей и длинным клювом. Клюв и ноги птицы имеют красный цвет. В области груди располагаются густые и взлохмаченные перышки, отдалённо напоминающие меховой воротник. Украшением глаз являются очертания красного цвета.

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРНОГО АИСТА



- Самки от самцов своим внешним видом практически не отличаются. Особенностью молодой птицы является серовато-зеленое очертание области вокруг глаз, а также блеклое оперение. Взрослые черные аисты имеют оперение с лоском и пестротой. Линька происходит ежегодно, начинаясь в феврале и заканчиваясь с наступлением мая-июня.
- Это достаточно скрытная и осторожная птица. В природных условиях, в соответствии с данными кольцевания, черный аист способен доживать до восемнадцати лет. В условиях неволи, зафиксированный

МЕСТА ОБИТАНИЯ ЧЕРНОГО АИСТА



Черные аисты обитают в лесных местностях стран Евразии. В нашей стране этих птиц можно встретить на территории от Дальнего Востока до Балтийского моря. Некоторые популяции черного аиста населяют южную часть России, лесистые районы Дагестана и Ставропольский край. *Очень незначительная численность наблюдается в Приморском крае.* Зимний период времени года птицы проводят в южной части Азии. Оседлая популяция чёрного аиста населяет Южную Африку. В настоящее время наибольшая популяция черных аистов проживает на территории Беларуси, но с наступлением зимы она переселяется в Африку. При выборе места обитания, предпочтение отдаётся труднодоступным районам, представленным глухими и старыми лесами с болотистыми зонами и равнинами, предгорьями вблизи водоемов, лесными озерами, реками или болотами. Черные аисты никогда не селятся в непосредственной близости к человеческому жилью.

РАЦИОН ЧЕРНОГО АИСТА



Взрослый черный аист питается, как правило, рыбой, а также использует в пищу мелких водных позвоночных и беспозвоночных животных. Кормится птица на мелководье и заливных лугах, а также в местностях вблизи водоёмов. В период зимовки, помимо перечисленных кормов, черный аист способен питаться мелкими грызунами и достаточно крупными насекомыми. Известны случаи, когда

РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОТОМСТВО



Чёрные аисты - моногамные пернатые, а период вступления в фазу активного размножения наступает в три года. Гнездятся 1 раз в год, используя вершину кроны старых и высоких деревьев или скальные уступы. Иногда гнёзда таких пернатых можно встретить в горах, на высоте в 2000-2200 м над уровнем моря. Гнездо массивное, из толстых ветвей и сучьев деревьев, которые скреплены дёрном, землей и глиной. Часто используется несколькими поколениями и птицы. На место гнездования аисты слетаются в конце марта или в самом начале апреля. Самцы приглашают самок на гнездо, распуская своё белое подхвостье, издавая сильные свисты. В кладке, насиживаемой двумя родителями бывает 4-7 достаточно крупных яиц. Насиживание занимает около месяца, а появление птенцов на свет продолжается в течение нескольких дней. Птенец имеет белый или сероватый окрас, с оранжевым цветом у основания клюва. Кончик клюва отличен зеленовато-жёлтым окрашиванием. Первые 10 дней птенцы лежат внутри гнезда, потом начинают постепенно

ПОПУЛЯЦИЯ ЧЕРНОГО АИСТА

У черного аиста практически полностью отсутствуют угрожающие виду пернатые враги, но серая ворона и некоторые другие хищные птицы способны похищать яйца из гнёзда. Птенцов, которые слишком рано покидают гнездовье, иногда уничтожают четвероногие хищники, включая лисицу и волка, барсука и енотовидную собаку, а также куницу. Достаточно



Численность данного вида напрямую зависит от сохранности и состояния гнездовых биотопов. Снижению общей численности популяции черного аиста способствует значительно сокращение кормовой базы, а также вырубка лесных зон, которые пригодны для обитания таких пернатых. Кроме всего прочего, в Калининградской области и странах Прибалтики, с целью охраны мест обитания черного аиста, приняты очень строгие меры.

ФИЛИН

■ **Филин – род птиц из семейства совиных.**

- **Некоторые виды в наше время находятся под угрозой вымирания, иные и вовсе исчезли из некоторых регионов.**
- **В дикой природе их продолжительность жизни составляет в среднем около 14-16 лет, максимальная 25 лет, в неволе некоторые особи доживают до 50 лет. Известны случаи, когда прирученные филины жили 70 лет.**
- **В России многие виды филинов являются редкими из-за бесконтрольного уничтожения птиц в двадцатом веке на территории бывшего СССР, и занесены в Красную книгу. Занесен во многие мировые соглашения о защите птиц, охраняется по всему миру в заповедниках и заказниках.**



ОПИСАНИЕ ФИЛИНА

Размеры филинов могут колебаться от 39 см до 71 см, а вес отдельных особей иногда достигает 4,6 кг. Средний же вес птиц находится в пределах 2-3 кг. Считается, что птицы южных зон меньше и легче, чем их пернатые собратья северных ареалов. Кроме того, у филинов очень выражен половой диморфизм – самки всегда крупнее самцов.

Размах крыльев иногда достигает 2х и более метров. Острые, как ножи, когти легко впиваются в плоть жертвы, задевая и разрушая крупные сосуды. Оперение цевки и пальцев или его отсутствие является одним из ключевых видовых признаков. Оперение достаточно густое, вместе с тем рыхлое, что обеспечивает бесшумность передвижений. Окрас оперения во многом зависит от места обитания и является покровительственным – маскировка для филинов является



Общий тон оперения коричневый с желтоватыми оттенками, либо же ржавчато-желтый, в северных районах пепельно-дымчатый, с различными видовыми рисунками бурого и черного цвета. На голове имеются заметные удлинённые пучки перьев, имеющие вертикальную подвижность в зависимости от настроения птицы.

МЕСТА ОБИТАНИЯ ФИЛИНА



Филины являются одними из самых распространенных хищных птиц – их можно встретить в большинстве стран Евразии, Африки, Америки. На территории России обитают по всей территории. Биотопами, в которых живут птицы, являются пустыни, горы, леса, берега озер и рек.

Филины — одиночные птицы, ведущие оседлый образ жизни на одной территории. Перелетает в другие места крайне неохотно и только тогда, когда на насиженных местах становится невозможно прокормиться. Перелетными являются северные виды, зимой улетающие на юг в поисках корма. Пара устраивает гнездо на одном и том же месте в течение многих лет, иногда и всей жизни. Птицы ревностно оберегают свою территорию, которая может достигать 80 км².

Примечательно то, что филина в определенной степени можно назвать вершиной пищевой цепочки – у него почти нет естественных врагов. В наше время уничтожаются их места обитания, и филинов все реже можно встретить на лесной прогулке. Деятельность человека отображается на птицах и в том плане, что после дератизации некоторые отравленные грызуны могут попасть в лапы к хищникам, которых не подозревают в предосторожности.

РАЗМНОЖЕНИЕ ФИЛИНА



Брачные игры наступают в конце зимы – начале весны. Половозрелые особи второго года жизни устраивают песнопения и брачные танцы – так, виргинийские филины раскланиваются друг перед другом, распуская оперение. Среди брачных ритуалов у рыбных филинов присутствует ритуальное кормление. Большая часть филинов не вьет гнездо – яйца откладываются в небольшие ямки под деревьями, среди камней, в расщелинах скал. Иные используют гнезда других птиц. В кладках бывает 3-5 яиц, их самки откладывают с интервалом в 2-4 дня. Самки высиживают яйца сами, не покидая гнездо, в течение месяца. В это время самец кормит самку, принося ей добычу. Если самка покидает гнездо от голода, его чаще всего разоряют. Яйца у крупных особей составляют около 5-7 см в длину, покрыты шершавой скорлупой, которая становится более гладкой к моменту вылупления птенцов. Вес яиц до 72 граммов, а диаметр – 4-5 см. Новорожденные филины весят 60 грамм, покрыты густым беловатым пухом, их глаза около недели остаются закрытыми. Птенцы прожорливы – первые дни их кормит только самка принесенной самцом пищей, разрывая ее на кусочки. Примерно через три недели на охоту вылетают уже оба родителя. Особенностью филинов является птенцовый каннибализм – более сильный и крупный