

ПИОДЕРМИИ



Стафилококковый сикоз

- Это хроническое воспаление фолликулов волос с рецидивирующим течением. Развивается, как правило, у мужчин, локализуется преимущественно в области бороды и усов. Возникает на фоне хронических очагов инфекции, патологии со стороны внутренних органов, нервной и эндокринной системы, гиповитаминозов.





- **Стафилококковый сикоз** начинается с развития фолликулитов, количество которых увеличивается, они сливаются между собой и образуют инфильтрированные очаги ярко-красного цвета, усеянные пустулами и корками с множественными эрозиями.



- **Заболевание сопровождается ощущением зуда, жжение, боли. Стафилококковый сикоз длится годами, рецидивирует и устойчив к терапии.**





ФУРУНКУЛ

- Это острое гнойное - некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающей его соединительной ткани.



- **Фурункул может располагаться на любом участке тела, за исключением ладоней и подошв, на которых фурункулы не могут развиваться из-за отсутствия волосяных фолликулов.**





**Фурункулы могут
быть одиночными
или
множественные.**







ГИДРАДЕНИТ

Острое гнойное воспаление апокриновых потовых желёз, локализующееся преимущественно в подмышечных впадинах. Болеют чаще у женщины. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры тела и недомоганием. У лиц ослабленных и истощенных гидраденит может принять хроническое течение.




**В глубине подкожной основы
возникают единичные или
множественные болезненные
величиной с горошину узлы,
постепенно увеличивающиеся
в размерах.**





**Кожа над узлами становится
вначале отечной, красной,
затем синюшно-красной.**

**Вследствие гнойного
расплавления узлы быстро
размягчаются, появляется
флюктуация, и вскрываются.
В конечном итоге образуется
рубец.**







СТРЕПТОКОККОВОЕ ИМПЕТИГО

**Заболевание отличается
контагиозностью.**

**Возбудитель передается в
основном через предметы
быта (одежду, бельё,
полотенца).**





**Стрептококковое импетиго
начинается с небольшого
гиперемического пятна, на
котором очень быстро
образуется фликтена.
Содержимое фликтены
сыхается и очаги поражения
оказываются покрытые коркой
бурого цвета.**





ЩЕЛЕВИДНОЕ ИМПЕТИГО

- Это стрептококковое импетиго в углах рта. Вначале в этой области появляется фликтена, затем образуется эрозия, имеющая линейное расположение.





Кожа углов рта отечна и гиперемирована, в глубине складки щелевидная эрозия с нависающим белесоватым венчиком отслоившегося дермиса. На поверхности эрозии формируется корка.





ИНТЕРТРИГИНОЗНАЯ СТРЕПТОДЕРМИЯ

Является разновидностью стрептококкового импетиго. Она развивается в крупных кожных складках (межъягодичной, подмышечной, за ушными раковинами, пахово-бедренных)



ИНТЕРТРИГИНОЗНАЯ СТРЕПТОДЕРМИЯ

**Характеризуется
образованием в кожных
складках сплошной эрозивной
мокнущей поверхности ярко-
розового цвета, резко
ограниченной от окружающей
здоровой кожи.**

A decorative border of stylized, light-colored flowers and leaves runs along the right and bottom edges of the slide, set against a dark background.





Эктима



Фурункул



Карбункул



Фолликулиты




Стрептококковая импетиго



Стрептококковое импетиго



Поверхностная стрепто-стафилодермия



Сикоз



Хроническая язвенная пиодермия



Гидраденит