

Безрецептурные препараты TEVA

Презентация для фармацевтов

Хилак-Форте

Препарат с уникальным составом, нормализующий собственную микрофлору кишечника

- Содержит активные метаболиты бактерий
- Способствует росту собственных полезных бактерий
- Подавляет патогенную флору
- Способствует естественному синтезу витаминов В6, В12 и К
- Не инактивируется в кислой среде желудка

[фото
упаковки]

Хилак-Форте. Показания

ПРОБЛЕМА

- Кишечные инфекции
- Кожные аллергические реакции
- Запоры

РЕШЕНИЕ ОТ ХИЛАК- ФОРТЕ

Угнетает рост патогенных бактерий, уменьшает выраженность симптомов

Восстанавливает микрофлору и помогает лечению кожных проявлений аллергии

Нормализует моторику кишечника
Восстанавливает микрофлору и устраняет симптомы

Хилак-Форте. Показания

ПРОБЛЕМА

- Прием антибиотиков
- Диарея
- Диарея путешественника (аптечка в дорогу)

РЕШЕНИЕ ОТ ХИЛАК-ФОРТЕ

- С 1-го дня поддерживает микрофлору кишечника, препятствует развитию ААД
- Нормализует моторику кишечника Восстанавливает микрофлору и устраняет симптомы
- Поддерживает микрофлору в период адаптации к новым условиям

Хилак-Форте. Дозировка

Дети до 2-х лет	Дети 2-12 лет	Старше 12 лет и взрослые
5-10 капель на 1 кг. веса	20-40 капель 3 раза в день	40-60 капель 3 раза в день

[фото
младенца]

[фото детей]

[фото семьи с детьми-
подростками]

Хилак-Форте. Преимущества

- Устраняет дисбактериоз и его симптомы
- Безопасен при беременности и лактации
- Устойчив к антибиотикам
- Легко давать ребенку, добавляя в напитки, соки и чай
- Не влияет на способность управления транспортным средством или потенциально опасными механизмами
- Стоимость на 60% выгоднее аналогов

[иллюстрация иконок к
каждому пункту]

Хилак-Форте. Противопоказания и побочные эффекты

- Индивидуальная непереносимость препарата
- Непереносимость лактозы, дефицит лактазы Лаппа, мальабсорбция глюкозы-галактозы
- Изредка вызывает реакции гиперчувствительности кожи и слизистых оболочек
- В единичных случаях - слабо выраженные желудочно-кишечные расстройства

Гепабене

**Желчегонный и гепатопротекторный препарат для
лечения и профилактики заболевания печени и
желчного пузыря**

- Экстракт плодов
расторопши
- Экстракт дымянки
лекарственной

[фото упаковки,
дымянки и
расторопши]

Гепабене. Показания

ПРОБЛЕМА

- Несбалансированное питание
- Алкоголь
- Ожирение
- Сахарный диабет
- Чрезмерное применение лекарств

[иллюстрация к
каждому пункту]

Гепабене. Действие

- Способствует восстановлению клеток печени и нормализует ее функцию
- Нейтрализует свободные радикалы
- Защищает гепатоциты от воздействия вредных факторов (токсины, алкоголь и др.)
- Снимает спазм желчного пузыря и снижает тонус сфинктера Одди
- Улучшает поступление желчи в кишечник
- Нормализует количество секретиции желчи
- Уменьшает литогенные свойства желчи

[имиджевые фото счастливых людей]

Гепабене. Дозировка

Гепабене назначается людям старше 6 лет.

Принимается по 1 капсуле 3 раза в день.

При болевых синдромах ночью, можно выпить еще одну капсулу.

Максимальная суточная доза – 6 капсул на 3-4 приема.

Продолжительность терапии – 3 месяца и более.

[фото капсулы,
лежащей в ладони]

Гепабене. Противопоказания и побочные эффекты

- Заболевания печени и желчных протоков в острой форме
- Гиперчувствительность к ингредиентам препарата
- Препарат может вызвать послабляющий эффект, аллергию в виде сыпи или усилить мочевыделение.

[фото капсулы, на которой
написано «ОПАСНО»]

Гастал. Показания

Три проблемы с желудком – одно эффективное решение

ПРОБЛЕМА

- Изжога
- Тяжесть в желудке
- Боли в желудке

[фото
упаковки]

РЕШЕНИЕ ОТ ГАСТАЛ

- Быстрое действие сразу после приема
- Продолжительный эффект (2 часа)
- Нет необходимости запивать

Гастал. Дозировка

- Принимают по 1-2 таблетки 4-6 раз в день (через 1 ч после еды).
Таблетки следует проглатывать, не разжевывая.
- Допускается прием для детей от 6 лет, взрослым и пожилым людям.

[фото ребенка 6-7 лет,
рядом зеленая
галочка]

Гастал. Противопоказания и побочные эффекты

- Не рекомендуется пациентам с выраженными нарушениями функции почек
- При длительном применении в высоких дозах (более 200 мл в сутки) возможно развитие гипофосфатемии (понижение содержания фосфора в крови), гиперкальциурии (повышение содержания кальция в моче), остеомалации (размягчение костей) и болей в костях

[фото таблетки, на которой прописан стоп-знак]

Амбробене. Показания

Отхаркивающее муколитическое средство при влажном кашле

ПРОБЛЕМА

- Острые хронические бронхиты, пневмония
- Бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты
- Бронхоэктатическая болезнь

РЕШЕНИЕ ОТ АМБРОБЕНЕ

- Действие наступает через 30 минут
- Снижает вязкость мокроты
- Повышает местный иммунитет
- Обладает противовоспалительным действием
- Нормализует секрецию и выведение мокроты на третьи сутки
- Способствует проникновению антибиотиков в слизистую оболочку
- Сокращает длительность

Амбробене. Таблетки

Таблетки представлены двумя видами – 30 мг и 60 мг.

	30 мг	60 мг
Дети от 6 до 12 лет	Полтаблетки 3 раза в день	Четверть таблетки 3 раза в день
Взрослые	1 таблетка 3 раза в день	Полтаблетки 3 раза в день

[фото упаковки
таблеток Амбробене]

Амбробене. Сироп

Сироп не содержит консервантов, загустителей, красителей и сахара. Обладает малиновым вкусом.

Дозировка	
Дети от 2 до 5 лет	2,5 мл 3 раза в день
Дети от 6 до 12 лет	5 мл 3 раза в день
Взрослые	10 мл 3 раза в день

[фото сиропа
Амбробене]

Амбробене. Раствор

Раствор не содержит консервантов и загустителей. Можно применять в виде ингаляции. В этом случае, препарат поступает в ткань слизистой оболочки бронхов и начинает действовать немедленно.

Дозировка	
Дети от 2 до 5 лет	1 мл 3 раза в день
Дети от 6 до 12 лет	2 мл 3 раза в день
Взрослые	4 мл 3 раза в день

Дозировка при ингаляции	
Дети от 2 до 5 лет	1 мл 1-2 ингаляции в день
Дети от 6 до 12 лет	2-3 мл 1-2 ингаляции в день
Взрослые	

[иконка человеческой иконки и респиратора]

[фото раствора Амбробене]

Амбробене. Капсулы ретард

Дозировка	
Взрослые и дети от 12 лет	1 капсула в день

[фото капсул
Амбробене]

Амброксол. Общие

противопоказания

- Повышенная чувствительность к амброксолу и/или другим компонентам препарата
- Тяжелая почечная недостаточность
- Тяжелая печеночная недостаточность
- I триместр беременности
- Редкая наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа, синдром мальабсорбции глюкозы, галактозы

[знак стоп]

Туссамаг

Растительный, отхаркивающий препарат, содержащий экстракт тимьяна для устранения симптомов простуды и кашля. Представлен в трех

видах
[фото трех упаковок]

Активным веществом препарата является растительный компонент - экстракт тимьяна. Вспомогательное вещество - сорбит некристаллизующийся.

[фото тимьяна с краю]

Туссамаг. Показания

ПРОБЛЕМА

Простудные заболевания верхних дыхательных путей с вязкой слизью и затруднением отхождения мокроты (бронхит, трахеит, трахеобронхит)

РЕШЕНИЕ ОТ ТУССАМАГ

- Содержит экстракт тимьяна
- Оказывает отхаркивающее действие
- Разжижает мокроту
- Уменьшает вязкость мокроты, способствуя ее лучшей эвакуации
- уменьшает отек и воспаление слизистой оболочки бронхов

[фото тимьяна из стоков,
ниже – фото семьи на

Туссамаг. Дозировка

	Дети до 12 лет	Дети 12-18 лет	Взрослые
Сироп (200 г) Сироп без сахара (175 г)	Половина чайной ложки 3 раза в день	Половина чайной ложки 4 раза в день	Чайная ложка 3 раза в день
Капли (20 г)			Чайная ложка 3 раза в день

[рестайлинг таблицы с чайными ложками]

Туссамаг. Противопоказания

- Повышенная чувствительность к тимьяну или другим губоцветным, березе, полыни, сельдерее
- Декомпенсация сердечной деятельности
- Алкоголизм, эпилепсия, заболевания печени
- Беременность и период лактации
- Непереносимость фруктозы, глюкозы-галактозы, дефицит сахаразы-изомальтазы
- Детский возраст до 1 года
- Детский и подростковый возраст до 18 лет (капли)

[перечеркнутые иконки
к каждому пункту]

Стоптуссин

Растительный, отхаркивающий препарат для устранения симптомов простуды и сухого кашля

Активным веществом препарата являются три растительных компонента - экстракты тимьяна, чабреца и подорожника. Вспомогательные компоненты – очищенный мёд и сахароза.

[упаковка]

[фото тимьяна] + [фото чабреца] + [фото подорожника]

Стоптуссин. Показания

ПРОБЛЕМА

Острые и хронические воспалительные заболевания дыхательных путей

РЕШЕНИЕ ОТ СТОПТУССИН

- Экстракт тимьяна оказывает противокашлевое и антисептическое действие
- Жидкий экстракт чабреца оказывает противокашлевое и секретолитическое действие
- Жидкий экстракт подорожника обладает противовоспалительным и противомикробным действием

Стоптуссин. Дозировка

Дети 1-5 лет	Дети 5-10 лет	Дети 10-15 лет	Дети от 15 лет и взрослые
Половина или целая чайная ложка 3 раза в день после еды	1-2 чайные ложки 3 раза в день после еды	2-3 чайные ложки 3 раза в день после еды	1 столовая ложка 3-5 раз в день.

Стоптуссин. Противопоказания и побочные действия

- Повышенная чувствительность к действующим веществам или к одному из вспомогательных веществ
- Алкоголизм
- Врожденная непереносимость фруктозы
- Нарушение усвоения глюкозы и галактозы
- Недостаток энзима, расщепляющего сахарозу и изомальтозу
- Детский возраст до 1 года

[перечеркнутые иконки к каждому пункту]

Йокс

Антисептический препарат для лечения заболеваний
горла

Препарат представлен в двух видах

[фото упаковок спрей и раствор]

Йокс. Показания

ПРОБЛЕМА

- Ангины, фарингиты, тонзилофарингиты, тонзиллиты, глоссит, афтозный стоматит
- При подготовке пациента к хирургическому вмешательству и в послеоперационном периоде на дыхательные пути и полости рта
- Для лечения оральных инфекций возникающих при химиотерапии
- При гриппозных состояниях в период prodromы

РЕШЕНИЕ ОТ ЙОКС

- Содержащийся в препарате органический йод обладает широким спектром противомикробного действия в отношении бактерий, грибов, вирусов, простейших
- Содержащийся в препарате аллантоин оказывает противовоспалительное действие

Йокс. Дозировка

Применение спрея

Дети от 8 лет и взрослые

1-3 впрыска 2-4 раза в день

[иллюстрация применения]

Применение раствора

Дети от 6 лет и взрослые

$\frac{1}{2}$ или 1 чайная ложка раствора на 100 мл воды.

2-4 полосканий в день

[иллюстрация применения]

Йокс. Противопоказания

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к йоду или другим компонентам препарата
- Гиперфункция щитовидной железы
- Декомпенсированная сердечная недостаточность
- Беременность и период кормления грудью
- Одновременное применение радиоактивного йода
- Герпетический дерматит Дюринга
- Дети до 6 лет (раствор)
- Дети до 8 лет (спрей)

Побочные действия

- Реакции повышенной чувствительности к препарату
- Аллергическая реакция на йод (зуд, гиперемия, крапивница)
- Редко: ощущение жжения или чувство сухости в полости рта
- Явление йодизма (при длительном применении): металлический вкус, повышенное слюноотделение, отек глаз или гортани, отек легких, кожная сыпь и желудочно-кишечные расстройства

Декатилен

Швейцарский препарат, лечащий воспаление горла и устраняющий боль

[фото упаковки]

- Не содержит сахара
- Не вызывает раздражения или аллергическую реакцию
- Широкий спектр действия

Декатилен. Показания

ПРОБЛЕМА

- Катаральная ангина
- Лакунарная ангина (как вспомогательное средство)
- Язвенно-пленчатая ангина Симановского-Плаута-Венсана (в качестве вспомогательного средства)
- Фарингит, ларингит, тонзиллит
- Афтозно-язвенный стоматит, гингивит
- Кандидомикоз полости рта и глотки (в качестве вспомогательного средства)
- Состояние после тонзиллэктомии, экстракции зубов

РЕШЕНИЕ ОТ ДЕКАТИЛЕН

- Оказывает антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, противогрибковое анестезирующее и болеутоляющее действие
- Не всасывается в кровь и снижает вероятность возникновения побочных эффектов
- Без сахара. Можно использовать при сахарном диабете
- можно применять до 10-12 таблеток в сутки в острый период

Декатилен. Дозировка

Детям от 4-х лет	Дети от 12 лет и взрослые
1 таблетка для рассасывания каждые 3 часа	1 таблетка для рассасывания каждые 2 часа

После стихания воспалительных процессов – по 1 таблетке под язык каждые 4-6 часов

Декатилен. Противопоказания

- Повышенная чувствительность к активным веществам препарата
- Во время беременности и кормления грудью необходима консультация врача
- Дети до 4 лет
- Иногда: местные реакции гиперчувствительность (зуд, сыпь)

[перечеркнутые иконки к каждому пункту]

Ново-пассит

Растительный препарат, помогающий снять эмоциональное напряжение, стресс, тревогу и страх

[фото упаковки]

7 лекарственных растений:
Гвайфенезин, Валерияна,
Хмель, Мелисса,
Пассифлора, Бузина,
Боярышник, Зверобой

[показать как круговорот с
фотографиями]

Ново-пассит. Показания

ПРОБЛЕМА

- Усталость и раздражение
- Тревога и страх
- Стресс, неврастения
- Мигрени
- Легкая форма бессоницы
- "Синдром менеджера" (состояние постоянного психического напряжения)
- Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта (диспептический синдром, синдром "раздраженного кишечника»)
- Зудящие дерматозы (экзема атопическая и себорейная, крапивница), обусловленные психологической нагрузкой

РЕШЕНИЕ ОТ НОВО-ПАССИТ

- Успокаивающее и противотревожное действие
- Начинает действовать с первого применения
- Не токсичен и не вызывает привыкания

Ново-пассит. Дозировка

Детям с 12 лет и взрослым - 5 мл 3 раза в день до еды

В случае появления тошноты препарат следует принимать во время еды.

[фото умиротворенных
людей]

Ново-пассит. Противопоказания и побочные эффекты

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в особенности к гвайфенезину
- Миастения
- Дети до 12 лет

[фото беспокойного человека]

Побочные эффекты

В редких случаях могут появиться аллергические реакции, экзантема, головокружение, усталость, сонливость, легкая мышечная слабость, расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, спазмы, изжога, диарея, запор), снижение концентрации внимания

Долобене

Боль, ушибы, растяжения? Долобене – вот решение!

[фото упаковки]

Уникальный состав с тройным действием!

- Против воспалений
- Снимает отеки
- Снимает болевые ощущения

Долобене. Показания

ПРОБЛЕМА

- Гематомы
- Воспаления мягких тканей
- Отёки при травмах, ушибах и воспалениях
- Спортивные травмы – растяжения мышц, вывихи

РЕШЕНИЕ ОТ ДОЛБЕНЕ

- Противовоспалительный эффект
- Обезболивающий эффект
- Противотромботический эффект
- Противоотёчный эффект

Долобене. Дозировка

Детям с 5 лет и взрослым – 2-4 раза в день

[фото играющих в футбол детей,
взрослые в тренажерном зале]

Долобене. Противопоказания и побочные эффекты

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата
 - Тяжелые нарушения функции печени
 - Тяжелые нарушения функции почек
 - Бронхиальная астма
 - Выраженные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
 - Открытые раны в месте нанесения
 - Беременность и период лактации
 - Детям до 5 лет
-
- Возможны кожные реакции (покраснение, зуд, чувство жжения в месте нанесения геля), которые обычно исчезают во время дальнейшего лечения
 - Аллергические реакции: иногда - кожные проявления, в т.ч. крапивница; в единичных случаях - отек Квинке
 - В редких случаях - запах чеснока изо рта (вызван диметилсульфидом, являющимся продуктом метаболизма диметилсульфоксида), возможно изменение вкусовых ощущений (исчезают через несколько минут после нанесения геля); при нанесении препарата на обширные участки тела крайне редко - тошнота, диарея, затруднение дыхания, головная боль, озноб

Диклофенак

Один из самых мощных нестероидных противовоспалительных средств по доступной цене!

[фото упаковки]

Диклофенак. Показания

ПРОБЛЕМА

- ревматоидный артрит
- псориатический, ювенильный хронический артрит
- анкилозирующий спондилит
- ревматические поражения мягких тканей
- подагрический артрит
- травматически обусловленные воспаления сухожилий, связок, мышц и суставов (в результате растяжений, при нагрузке и ушибах)

РЕШЕНИЕ ОТ ДИКЛОФЕНАК

- Оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие
- Воздействует на метаболизм арахидоновой кислоты, уменьшает количество простагландинов в очаге воспаления
[девушка занимается йогой]

Диклофенак. Дозировка

Детям от 12 лет и взрослым – 3-4 раза в сутки, слегка втирая в кожу

[иллюстрация]

2-4 г препарата размером с вишню

[иллюстрация]

Нанести и втирать в кожу

[иллюстрация]

Вымыть руки после применения

Диклофенак. Противопоказания

- Повышенная чувствительность к диклофенаку или другим компонентам препарата ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП
- Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух, и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВП (в анамнезе)
- Нарушение целостности кожных покровов
- Беременность (III триместр) и период лактации

[фото
восклицательного
знака]