


**Болезни,
передаваемые
половым путем**

Положение с болезнями, передающимися половым путем, в настоящее время

- возросла среди взрослого населения в 16 раз
- в молодежной среде — в 28 раз.
(болеть стали даже дети 12—14 лет, причем заражаясь самостоятельно, а не от больных родителей).

Сифилис

Первый признак заболевания сифилисом — появление маленькой ссадинки, или **язвочки**, которую называют твердым шанкром («шанкр» по-французски — язвочка, а твердый, потому что дно язвочки действительно плотное). Где же возникает твердый шанкр? Французские врачи говорят об этом с юмором: **«он возникает на том месте, которым грешил»**.



По его течению сифилис делят на три периода.

Первичный период, или первичный сифилис начинается с появления твердого шанкра и длится 1,5—2 месяца. Через неделю после появления шанкра, увеличиваются лимфатические железы вблизи язвочки. Если она появилась на половых органах, то увеличиваются паховые лимфатические узлы, а если на губах — подчелюстные


Вторичный период, или вторичный сифилис



Третичный период



Проявления на теле человека



Иммунитет **не вырабатывается.**

После излечения человек опять **может заразиться** сифилисом.

Успешность лечения должна быть подтверждена анализами. Первый анализ сдают сразу же после окончания лечения, а затем через



3, 6 и 12 месяцев. Без такого контроля нельзя быть уверенным в излечении.

Гонорея

Гонорея — самое **распространенное** венерическое заболевание, которое раньше давало яркую картину болезни, а теперь почти у всех протекает **бессимптомно**. Это делает болезнь еще более опасной, так как нелеченная гонорея переходит в хроническую форму, вызывая стойкое **бесплодие**, **воспаление** мочеполовых **органов** у мужчин и воспаление придатков у женщин.

Иммунитет после перенесенного заболевания **не вырабатывается**, поэтому возможно повторное заражение.

ГОНОКОКК



Стадии болезни и проявление

Заболевание проявляется через **3-7** суток после заражения;

протекает остро или хронически. Острая гонорея характеризуется выделением **слизи, гноя**, ощущением **щекотания, жжения** и **боли** в уретральном канале, частыми позывами к мочеиспусканию, очень болезненному.

Приблизительно у половины зараженных людей не наблюдается никаких симптомов, особенно в начале заболевания. Наиболее склонны к малосимптомному/бессимптомному течению заболевания женщины.

Проявления гонореи



Хламидиоз

- Хламидиоз — инфекционное заболевание, передающееся половым путём. Возбудителем болезни служит очень мелкая бактерия, хламидия. Последствиями заболевания могут быть бесплодие, внематочная беременность, гнойное воспаление органов малого таза и даже воспаление суставов.
- Диагностика хламидиоза затруднена, дорогостояща и не всегда результативна.

Хламидия



проявление

Выделения слизистые или слизисто-гнойные. От нормальных выделений они могут отличаться неприятным запахом или желтоватым оттенком. Могут появиться несильные боли в области наружных и внутренних половых органов, зуд и жжение (в том числе, при мочеиспускании). Боли: у женщин боли внизу живота — в области малого таза, усиление болей перед менструацией, межменструальные кровотечения; у мужчин боли в мочеиспускательном канале, в мошонке, в пояснице, в яичках.

Также у женщины может наблюдаться общая слабость и легкая температура — симптомы интоксикации.

Проявление хламидиоза



Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)



*Наиболее важные правила,
которые нужно соблюдать для
профилактики СПИДа:*

**НИКОГДА НЕ
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОБЩИМИ
ИГЛАМИ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
И ДРУГИМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ,
ПОВРЕЖДАЮЩИМИ
КОЖУ;**

**пользуйтесь
презервативами,
даже если в этом
нет необходимости
для предотвращения
зачатия;**

**прежде чем
вступить в
интимные
отношения,
хорошо узнайте
человека;**

- **избегайте сексуальных контактов с людьми, которые имеют много половых партнеров и которых вы можете подозревать в злоупотреблении внутривенными инъекциями;**

при необходимости
использовать
донорскую кровь или
препараты,
приготовленные на ее
основе, убедитесь в
том, что они проверены
на присутствие вируса

**Уголовная
ответственность за
заражение венерической
болезнью (*Статья 121 УК
РФ*)**

штраф в размере от 200 до 500
минимальных размеров оплаты
труда

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией

- ограничением свободы на срок до трех лет
- лишением свободы на срок до пяти лет.
- лишением свободы на срок до восьми лет.
- лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Профилактика ИППП

- ◎ **Воздержаться** от «случайных» связей.
- ◎ Никто не даст гарантии, что даже самые «приличные» мужчины и женщины – здоровы.
- ◎ Ни внешний вид человека, ни уровень его образования, ни социальный статус и семейное положение – **НИЧТО** не может говорить о наличии или отсутствии у него венерических заболеваний. При этом сам человек может быть полностью уверен, что здоров, и абсолютно не подозревать о том, что болен. Большинство же **венерических болезней** часто протекают **бессимптомно**.

- Использовать презерватив. классическое средство профилактики ЗППП. Однако эффективность его как средства профилактики венерических инфекций – не 100%.
- Совсем не редкость случаи соскальзывания презерватива. Поэтому перед использованием обязательно прочтите инструкцию.

Будьте здоровы!



Берегите себя и близких!