

1 стадия

1. общей слабости и утомляемости, эмоциональной лабильности, нарушений сна, снижения памяти и внимания, головных болей.
2. анизорефлексией (состояние, при котором интенсивность сухожильных и (или) кожных рефлексов с левой и правой половин тела неодинакова),
3. дискоординацией (нарушение координации движений, невозможность выполнения точных движений.),
4. симптомами орального автоматизма (автоматические непроизвольные движения, осуществляемые посредством круговой мышцей рта, губ или жевательными мышцами в ответ на механическое или иное раздражение определённых участков кожи).
5. Нарушения памяти,
6. праксиса (способность к выполнению целенаправленных двигательных актов.) и
7. гнозиса (это способность узнавать предметы по чувственным восприятиям.) удастся выявить, как правило, только при проведении специальных тестов.

II стадии

обычно доминирует какой-то один неврологический синдром.

- При становится больше субъективных жалоб, а неврологическая симптоматика уже может быть разделена на отчетливые синдромы
- пирамидный (сочетание центральных параличей (парезов) конечностей с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, а также с патологическими рефлексами, обусловленное поражением пирамидных путей сочетание центральных параличей (парезов) конечностей с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, а также с патологическими рефлексами, обусловленное поражением пирамидных путей)
- дискоординаторный,
- амиостатический (сочетание двигательных нарушений, проявляющихся бедностью, маловыразительностью и замедленностью движений, диффузным повышением мышечного тонуса, нередко в сочетании с мелкокоразмашистым дрожанием),
- дисмнестический (расстройство памяти)),

Профессиональная и социальная адаптация больных снижается.

При III стадии

нарастает неврологическая симптоматика, появляются отчетливый

- псевдобульбарный синдром (дизартрия псевдобульбарный синдром (дизартрия - нарушение произношения, дисфония псевдобульбарный синдром (дизартрия - нарушение произношения, дисфония — потеря звучности голоса псевдобульбарный синдром (дизартрия - нарушение произношения, дисфония — потеря звучности голоса, дисфагия псевдобульбарный синдром (дизартрия - нарушение произношения, дисфония — потеря звучности голоса, дисфагия - расстройство акта глотания), иногда пароксизмальные состояния (в том числе эпилептические припадки),
- выраженные когнитивные нарушения (это снижение памяти, умственной работоспособности) приводят к