

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ШЛУ

Больные с ШЛУ ТБ подлежат обязательной госпитализации в соответствующее отделение стационара.

*Общий курс лечения ШЛУ ТБ составляет более 27 месяцев.
Длительность интенсивной фазы (ИФ) составляет 9-15
месяцев, поддерживающей фазы (ПФ) – 18 - 21 месяц.*

ПЕРЕВОД НА ПФ ЛЕЧЕНИЯ ШЛУ ТБ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЕВОВ МОКРОТЫ, ВЗЯТЫХ С МЕСЯЧНЫМ ИНТЕРВАЛОМ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ.

21-24 МЕСЯЦА И БОЛЕЕ

Интенсивная фаза - 6 мес. и более

- Госпитальная, более интенсивный мониторинг
- 5-6 препаратов, к которым микробактерии чувствительны
ZEPtK/CapFq[Cs][Pas] (6мес)

Фаза продолжения - 15-18 мес. и более

- Амбулаторная, более редкий мониторинг
- Минимум 3-4 препарата, к которым микробактерии чувствительны
EPtFq[Cs][Pas] (12мес)