

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ  
ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
СЕРТИФИКАЦИОННОГО  
ЭКЗАМЕНА**

*КАФЕДРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
(СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ) ФПДО*

# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА

- ТОЛЬКО 1 ОТВЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫМ;
- ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НЕОБХОДИМО ЗАЧЕРКНУТЬ, НАПРИМЕР:

№ ВОПРОСА	<i>а</i>	<i>б</i>	<i>в</i>	<i>г</i>	<i>д</i>
1	а	<del>б</del>	в	г	д
2	а	б	в	<del>г</del>	д

# ВОПРОС 1

**Показанием к проведению коронарной ангиографии является:**

- а) стенокардия напряжения I-II функциональ-ного класса после инфаркта миокарда
- б) стенокардия напряжения III функциональ-ного класса при отсутствии эффекта от лекарственного лечения
- в) тяжелые желудочковые аритмии
- г) все перечисленное

## ВОПРОС 2

**Кардиогенный шок при инфаркте миокарда, как правило, развивается при поражении миокарда площадью более:**

- а) 20%
- б) 10%
- в) 30%
- г) 40%

# ВОПРОС 3

**Указать наиболее типичную характеристику пульса на лучевой артерии при выраженном стенозе устья аорты:**

- а) неизменный
- б) медленный, малый, низкий
- в) частый, большой, высокий

## ВОПРОС 4

По поводу изолированной систолической гипертензии с максимумом АД 200/90 мм рт. ст. пациент 22 лет был обследован в поликлинике: пульсация артерий стоп снижена, АД на ногах не измерялось. На рентгенограмме грудной клетки изменения, напоминающие узурацию нижней поверхности ребер. Указать возможную причину гипертензии:

- а) гипертоническая болезнь
- б) стеноз сонной артерии
- в) облитерирующий тромбоангиит
- г) коарктация аорты

## ВОПРОС 5

**При каких заболеваниях сердца развитие сердечной недостаточности является следствием нарушения диастолической функции миокарда?**

- а) инфаркт миокарда
- б) гипертрофическая кардиомиопатия
- в) дилатационная кардиомиопатия
- г) миокардит

## ВОПРОС 6

**Симптом электрической альтернации на ЭКГ характерен для:**

- а) сухого перикардита
- б) выпотного перикардита
- г) констриктивного перикардита



# ВОПРОС 7

**Для проведения тромболитической терапии при ТЭЛА применяют:**

- а) гепарин
- б) фраксипарин
- в) стрептокиназу

# ВОПРОС 8

**В остром периоде подагрического артрита не назначают:**

- а) диклофенак натрия
- б) преднизолон
- в) индометацин
- г) аллопуринол

# ВОПРОС 9

**К патогенетическим механизмам прогрессирования остеоартроза относится все, кроме:**

- а) нарушение функции хондроцитов
  - б) уменьшение содержания протеогликанов, разрывы коллагеновых волокон в матриксе суставного хряща
  - в) повышение содержания лизосомальных ферментов в суставном хряще, развитие реактивного синовита
  - г) выявление антигена гистосовместимости В35
- (9)

# ВОПРОС 10

**Рентгенологические изменения при ревматоидном артрите ранее всего обнаруживаются в суставах:**

- а) локтевых
- б) проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых
- в) голеностопных
- г) первом плюсне-фаланговом

# ВОПРОС 11

**К диагностическим критериям ревматоидного артрита относятся:**

- 1) артрит суставов кистей
- 2) утренняя скованность более 1 часа
- 3) повышение уровня СОЭ
- 4) повышение уровня ревматоидного фактора
- 5) субфебрилитет
- 6) ревматические узелки

**Правильный ответ:**

- а) верно 1,2,4
- б) верно 1,2,3,4
- в) верно 1,2,5,6

# ВОПРОС 12

**Противопоказанием к введению глюкокортикостероидов в сустав является:**

- а) явления синовита
- б) подозрение на инфекционный процесс в суставе
- в) высокая степень активности ревматоидного артрита
- г) острый приступ подагры

# ВОПРОС 13

**Показанием к назначению цитостатиков при СКВ не является:**

- а) активный волчаночный нефрит
- б) высокая степень активности
- в) выраженный синдром Рейно
- г) резистентность к глюкокортикостероидам

# ВОПРОС 14

**Критерием степени тяжести нефротического синдрома является:**

- а) величина протеинурии
- б) степень гипоальбуминемии
- в) выраженность отеков
- г) наличие анемии
- д) выраженность натрийурии



# ВОПРОС 15

**Симптомами нефротического криза являются:**

- 1) абдоминальные боли
- 2) рвота
- 3) лихорадка
- 4) повышение АД
- 5) эритема на коже живота, туловища, бёдер

**Правильный ответ:**

- а) все верно
- б) 1,2,3,4
- в) 1,2,3,5

# ВОПРОС 16

**Назвать нормальные размеры почек по УЗИ:**

- а) 70 × 45 мм
- б) 105 × 50 мм
- в) 80 × 30 мм
- г) 150 × 70 мм

# ВОПРОС 17

**Препарат выбора из группы бронходилататоров для лечения хронической обструктивной болезни легких:**

- а) эфедрин
- б) аминофиллин
- в) ипратропия бромид
- г) астмопент
- д) флунизолид

# ВОПРОС 18

**Указать признаки, характерные для транссудата:**

- 1) относительная плотность 1005
- 2) содержание белка 25 г/л
- 3) положительная реакция Ривольта
- 4) отношение ЛДГ в плевре к ЛДГ сыворотки крови 0,3

**Правильные ответы:**

- а) 1, 2, 4
- б) 1, 3, 4
- в) 1, 2, 3, 4 (18)

# ВОПРОС 19

**Для какого заболевания характерен  
хилез-ный экссудат:**

- а) лимфогранулематоз
- б) саркоидоз
- в) гепатит
- г) нефротический синдром

## ВОПРОС 20

Пациент 48 лет, житель села, работает на птице-ферме. Болен в течение 7 дней, предъявляет жалобы на малопродуктивный кашель, лихорадку, головную боль, миалгии, артралгии, боли в животе, диарею. При осмотре: жёсткое дыхание, сухие хрипы, увеличение печени и селезёнки, шейных, подмышечных, над- и подключичных лимфоузлов. На рентгенограмме – негомогенная по ходу лёгочного рисунка тень в базальных отделах правого лёгкого. Указать наиболее вероятную этиологию заболевания:

- а) стрептококк пневмонии
- б) клебсиелла пневмонии
- в) синегнойная палочка
- г) хламидии пситтакоза

# ВОПРОС 21

**Какой препарат оказывает влияние на *Helicobacter pylori*?**

- а) висмута трикалия дицитрат
- б) сукральфат
- в) алгедрат+магния гидроксид
- г) даларгин

# ВОПРОС 22

**Истинный постхолецистэктомический синдром обусловлен только:**

- а) рубцовым стенозом холедоха
- б) не найденным во время операции камнем холедоха
- в) стенозом большого дуоденального соска
- г) дуоденостазом
- д) снижением тонуса сфинктера Одди и расширением холедоха после холецистэктомии



## ВОПРОС 23

**Больной 58 лет наблюдается по поводу неспецифического язвенного колита, получает 3 препарата в течение 2 месяцев. 7 дней назад у больного появились тошнота, рвота, выявлен агранулоцитоз и невралгии верхних конечностей. Какой из лекарственных препаратов ответственен за побочные эффекты?**

- а) преднизолон
- б) сульфасалазин
- в) омез
- г) все вышеперечисленные

## ВОПРОС 24

**Что является «эталонным» лабораторным маркером алкогольного гепатита:**

- а) повышение трансаминаз
- б) сочетанное повышение трансаминаз и гамма - глютаминтранспептидазы
- в) повышение гамма –глютаминтранс-пептидазы
- г) все перечисленное
- д) ничего из вышеперечисленного

# ВОПРОС 25

**Назвать факторы, увеличивающие СОЭ:**

- 1) повышение уровня фибриногена
- 2) диспротеинемия
- 3) гипербилирубинемия
- 4) алкалоз

**Правильные ответы:**

- а) 1, 2, 3
- б) 2, 3, 4
- в) 1, 2, 4

## ВОПРОС 26

**Гиперсегментация ядер нейтрофилов  
характерна для:**

- а) железодефицитной анемии
- б) В-12 фолиевой дефицитной анемии
- в) гемолитической анемии

# ВОПРОС 27

**Анизоцитоз –это:**

- а) изменение величины эритроцитов
- б) изменение формы эритроцитов
- в) изменение окраски эритроцитов

# ВОПРОС 28

**Назвать синонимы витамина В-12:**

- 1) внешний фактор Касла
- 2) внутренний фактор Касла
- 3) цианокобаламин
- 4) метил-малоновая кислота

**Правильные ответы:**

- а) 1, 2, 3
- б) 1, 3
- в) 2, 3, 4

## ВОПРОС 29

**Наибольшее количество витамина В-12 (мг на 100 г продукта) содержится**

**в:**

- а) говяжьей печени
- б) свиной печени
- в) телячьих почках
- г) устрицах
- д) злаках

# ВОПРОС 30

**Дисбактериоз кишечника не  
вызывают:**

- а) полусинтетические пенициллины
- б) тетрациклины
- в) фторхинолоны
- г) оральные цефалоспорины
- д) макролиды



# ВОПРОС 31

**Наиболее вероятно развитие толерантности при применении:**

- а) тринитролонга
- б) сустака
- в) сублингвального нитроглицерина
- г) изосорбита-5-мононитрата
- д) нитронга

## ВОПРОС 32

**Укажите основной терапевтический эффект нитросорбида у больных с сердечной недостаточностью:**

- а) расширение преимущественно артериол и снижение постнагрузки
- б) расширение преимущественно венул и снижение преднагрузки
- в) прямое положительное инотропное действие
- г) повышение диуреза и снижение преднагрузки

## ВОПРОС 33

**Больная 40 лет жалуется на зябкость, сонли-вость, запоры. При объективном исследовании обнаружено увеличение щитовидной железы и заподозрен первичный гипотиреоз. Для подтверждения данного диагноза наиболее информативно:**

- а) проведение сцинтиграфии щитовидной железы
- б) определение уровня ТТГ
- в) определение уровня  $Ca^{2+}$  в крови
- г) определение Т3
- д) определение Т4

# ВОПРОС 34

**Ожирение диагностируется при избыточной массе тела:**

- а) 14,9 кг/м<sup>2</sup> и более
- б) 18,1 кг/м<sup>2</sup> и более
- в) 25,9 кг/м<sup>2</sup> и более
- г) 30,1 кг/м<sup>2</sup> и более
- д) 40,0 кг/м<sup>2</sup> и более

# ВОПРОС 35

**Холодный узел в щитовидной железе – это:**

- а) узел, который в повышенном количестве поглощает радиоактивный изотоп  $^{99m}\text{Tc}$
- б) узел, который поглощает  $^{99m}\text{Tc}$  после стимуляции тиреотропным гормоном
- в) узел, который поглощает  $^{99m}\text{Tc}$  так же, как и окружающая ткань
- г) эктопированная ткань щитовидной железы
- д) узел, который не поглощает изотоп

# ВОПРОС 36

**Выбрать правильное в отношении паратгормона утверждение:**

- а) стимулирует реабсорбцию кальция в дисталь-ных канальцах почек
- б) стимулирует реабсорбцию кальция в прокси-мальных канальцах почек
- в) уменьшает всасывание кальция в тонком кишечнике
- г) усиливает канальцевую реабсорбцию фосфора
- д) все перечисленное верно (36)

# ВОПРОС 37

**Тест базальной температуры основан:**

- а) на воздействии эстрогенов на гипоталамус
- б) на влиянии простагландинов на гипоталамус
- в) на влиянии прогестерона на терморегулирующий центр гипоталамуса
- г) ни на чем из перечисленного
- д) на всем перечисленном

# ВОПРОС 38

**Максимальное растяжение матки происходит при сроке беременности:**

- а) 20-26 недель
- б) 27-30 недель
- в) 31-36 недель
- г) 37-39 недель
- д) 40 недель



# ВОПРОС 39

**При позднем гестозе повышается количество:**

- а) тромбоксана
- б) простагландина E
- в) и того, и другого
- г) ни того, ни другого

# ВОПРОС 40

**Аменорея - это отсутствие менструации в течение:**

- а) 12 месяцев
- б) 4 месяцев
- в) 3 месяцев
- г) 5 месяцев
- д) 6 месяцев

# ВОПРОС 41

**Истинная конъюгата - это расстояние между:**

- а) серединой верхнего края лона и мыса
- б) наиболее выступающими внутрь точками симфиза и мысом
- в) нижним краем симфиза и выступающей точкой мыса
- г) гребнями подвздошной кости
- д) между пупком и мечевидным отростком

# ВОПРОС 42

**Для себорейного дерматита не характерно:**

- а) выраженный зуд
- б) эритематозно-сквамозные очаги поражения
- в) четкие границы очагов
- г) нечеткие границы очагов
- д) локализация высыпания в «себорейных местах»

# ВОПРОС 43

**Мочка ушной раковины наиболее часто поражается при:**

- а) псориазе
- б) себорейном дерматите
- в) микотической экземе
- г) стрептодермии
- д) контактном дерматите

# ВОПРОС 44

**Облигатными раздражителями являются:**

- а) концентрированные растворы минеральных кислот и щелочей
- б) газообразные и парообразные вещества (сероводород и др.)
- в) боевые отравляющие вещества кожно-нарывного действия
- г) концентрированные растворы солей тяжелых и щелочных металлов
- д) все перечисленные

# ВОПРОС 45

**Назвать метод быстрой диагностики гриппа:**

а) РСК

б) РНГА

в) обнаружение вируса гриппа с помощью флюоресцирующих антител

г) вирусологическое исследование

д) все вышеперечисленное

## ВОПРОС 46

**Укажите тип экзантемы,  
характерный для краснухи:**

- а) везикулезная сыпь
- б) крупно-пятнистая сыпь
- в) мелко-пятнистая сыпь
- г) геморрагическая сыпь
- д) папулезная сыпь



## ВОПРОС 47

**Для геморрагической лихорадки с почечным синдромом не характерно:**

- а) лихорадка
- б) поражение почек
- в) гепатит
- г) выраженная интоксикация
- д) тромбогеморрагический синдром

## ВОПРОС 48

**Укажите симптом, характерный для брюшного тифа:**

- а) острое начало болезни;
- б) боли в глазных яблоках;
- в) саднение за грудиной;
- г) розеолезная сыпь на теле с 8-10 дня болезни
- д) потливость.

## ВОПРОС 49

**Не является характерным признаком раневого столбняка:**

- а) гиперсаливация
- б) опистотонус
- в) тризм жевательных мышц
- г) тонические сокращения дыхательных мышц
- д) фибрилляция мышц в области входных ворот инфекции

# ВОПРОС 50

**Свидетельствовать о гемиплегии у больного в коматозном состоянии может:**

- а) симптом «паруса»
- б) поднятая рука на стороне паралича падает как «плеть»
- в) ротация парализованной стопы кнаружи
- г) опущение угла рта
- д) все вышеперечисленное

# ВОПРОС 51

**Тип припадков, наиболее часто встречающийся у взрослых:**

- а) сложный парциальный
- б) генерализованный тонико-клонический
- в) абсанс
- г) простой парциальный
- д) джексоновский

# ВОПРОС 52

**Назвать наиболее частую причину слабоумия:**

- а) эпилепсия
- б) сосудистые заболевания
- в) болезнь Альцгеймера
- г) болезнь Паркинсона
- д) травмы головы

# ВОПРОС 53

**Наличие энуреза встречается у детей старше:**

а) 2 лет

б) 4 лет

в) 6 лет

г) 8 лет

д) 10 лет

# ВОПРОС 54

**Диссоциированные нарушения чувствительности по сегментарному типу при сирингомиелии характеризуются:**

- а) выпадением глубокой при сохранности болевой
- б) выпадением болевой при сохранности температурной
- в) выпадением только болевой при сохранности глубокой
- г) сохранностью болевой при выпадении температурной
- д) сохранностью глубокой при выпадении болевой и температурной



# ВОПРОС 55

**Главной причиной церебральной ишемии при остром инфаркте миокарда с нарушением ритма является:**

- а) повышение вязкости крови
- б) повышение активности свертывающей системы
- в) ухудшение реологических свойств крови
- г) снижение системного перфузионного давления
- д) повышение агрегации форменных элементов крови

# ВОПРОС 56

**При кровоизлиянии в ствол мозга не является обязательным:**

- а) поражение черепно-мозговых нервов
- б) менингеальный синдром
- в) зрачковые расстройства
- г) двусторонние пирамидные симптомы

## ВОПРОС 57

**Для дегидратирующей терапии гипертонического кровоизлияния в мозг при артериальном давлении 230/130 мм рт. ст. и осмолярности крови выше 300 мосм/л следует выбрать:**

- а) мочевины
- б) стероиды
- в) маннитол
- г) лазикс

# ВОПРОС 58

**Характерный признак бактериального конъюнктивита:**

- а) слизисто-гнойное отделяемое, а также наличие фолликулов и отека переходной складки
- б) серозное отделяемое, а также наличие фолликулов и отека переходной складки
- в) наличие фолликулов
- г) отек переходной складки
- д) наличие фолликулов и отека переходной складки, геморрагическое отделяемое

# ВОПРОС 59

**Больной 67 лет жалуется на постоянное снижение зрения в обоих глазах, больше в правом, в течение последнего года.**

**Объективно: Vis OD = 0,02 н/к, T = 19 мм рт. ст., OS = 0,1, sph +2,0 = 0,7, T=19 мм рт. ст. Справа – роговица прозрачная, сферичная, передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Радужка в цвете и рисунке не изменена, хрусталик с сероватым оттенком. После расширения зрачка просматривается диффузное помутнение центрального и нижнего отделов хрусталика, на остальной периферии рефлекс хорошо виден. Видимая часть глазного дна без патологии. Слева глаз – без патологических изменений.**

**Укажите диагноз:**

- а) незрелая катаракта**
- б) отслойка сетчатки**
- в) старческая макулодистрофия**

# ВОПРОС 60

**Основными методами исследования роговицы являются:**

- а) исследование в проходящем свете и метод бокового освещения
- б) метод бокового освещения и биомикроскопия
- в) биомикроскопия и офтальмоскопия

# ВОПРОС 61

**Основными клиническими симптомами ползучей язвы роговицы являются:**

а) обильное гнойное отделяемое со дна язвы, грубое рубцевание с выраженным нарушением сферичности роговицы;

б) глубокое и обширное изъязвление роговицы, выраженная васкуляризация, раннее рубцевание;

в) наличие прогрессивной зоны язвы (активный край), ранний иридоциклит с гипопионом

# ВОПРОС 62

**Барабанная перепонка имеет высоту:**

1) до 10 мм

2) до 12 мм

**и ширину**

3) до 9 мм

4) до 12 мм

**Правильный ответ:**

а) 1, 3

б) 1, 4

в) 2, 3

г) 2, 4



# ВОПРОС 63

**Кровотечение из уха является следствием:**

- а) перелома свода черепа
- б) поперечного перелома височной кости
- в) травмы наружного слухового прохода или продольного перелома височной кости
- г) отогематомы

# ВОПРОС 64

**При возникновении одонтогенного гайморита необходимо:**

- а) закончить лечение гайморита, а затем удалить причинный кариозный зуб
- б) удалить кариозный зуб без лечения гайморита
- в) назначить физиотерапевтическое лечение
- г) консервативное лечение кариозного зуба
- д) удалить причинный кариозный зуб, а затем начать лечение гайморита

## ВОПРОС 65

**Среди злокачественных образований ЛОР-органов наиболее часто встречается:**

- а) рак гортани
- б) опухоли носа
- в) злокачественные опухоли глотки
- г) злокачественные опухоли околоносовых пазух
- д) рак уха

## ВОПРОС 66

**Больной с тяжелой формой лакунарной ангины в случае необходимости должен быть госпитализирован:**

а) в терапевтическое отделение

б) в хирургическое отделение

в) в инфекционное отделение

г) в оториноларингологическое отделение

д) в пульмонологическое отделение

# ВОПРОС 67

**Назвать виды нистагма:**

- 1) вестибулярный
- 2) мозжечковый
- 3) зрительный
- 4) невротический
- 5) отогенный

**Правильный ответ:**

- а) 1, 3, 4
- б) 2, 3, 4
- в) 2, 3, 5
- г) 1, 2, 3

# ВОПРОС 68

**Развитие язвенно-некротического гингивита характерно для:**

- а) острого лейкоза
- б) кори
- в) герпетического стоматита
- г) гриппа
- д) гингивита беременных

# ВОПРОС 69

**Понятие «пародонт» использует термины:**

- а) десна, периодонт, костная ткань
- б) десна, периодонт, круговая связка
- в) костная ткань альвеолы, пульпа, цемент
- г) десна, круговая связка, периодонт

# ВОПРОС 70

**Лечение острого остеомиелита  
заключается в:**

- а) назначении антибиотиков, мазевых повязок
- б) созданию оттока экссудата из периодонта
- в) назначении антибиотикотерапии
- г) удалении «причинных» зубов, назначении антибиотиков



# ВОПРОС 71

**Назвать меры первой помощи при травмах челюстей:**

- а) наложить круговую повязку, остановить кровотечение
- б) очистить полость рта, остановить кровотечение, совместить отломки челюстей, наложить повязку
- в) ввести обезболивающее, наложить повязку, остановить кровотечение
- г) остановить кровотечение, наложить круговую повязку

# ВОПРОС 72

**Очищающее действие зубных паст обеспечивают компоненты:**

- а) связующие
- б) абразивные
- в) пенообразующие
- г) ароматизирующие
- д) лечебные

## ВОПРОС 73

**Для начала образования кислоты бактериальной бляшкой после употребления сладкой пищи необходимо:**

- а) несколько секунд
- б) 10 минут
- в) 15 минут
- г) 20 минут
- д) 1 час (73)

## ВОПРОС 74

**Укажите характерные изменения в анализе мочи при туберкулезе почек:**

- а) щелочная реакция мочи, эритроцитурия
- б) кислая реакция мочи, эритроцитурия, лейкоцитурия
- в) цилиндрурия, эритроцитурия
- г) массивная протеинурия, эритроцитурия

# ВОПРОС 75

**Назвать основную цель массовой туберкулино-диагностики:**

- а) выявление детей больных туберкулезом
- б) выделение групп повышенного риска для дообследования в противотуберкулезном диспансере
- в) отбор контингентов для вакцинации и ревакцинации БЦЖ
- г) отбор контингента для стационарного лечения
- д) определение показателя инфицированности и ежегодного риска инфицирования

# ВОПРОС 76

**Наиболее защищенными в настоящее время от туберкулеза в силу естественной резистентности, а также благодаря профилактическим мероприятиям, оказались:**

- а) дети и подростки
- б) дети и лица среднего возраста (40-59 лет)
- в) дети и молодые люди (20-39 лет)
- г) дети и пожилые люди (60 лет и старше)

# ВОПРОС 77

**Наиболее эффективен и достоверен в выявлении микобактерий метод исследования:**

- а) люминесцентная микроскопия
- б) культуральный посев
- в) бактериоскопия
- г) биохимическое исследование
- д) все перечисленное

# ВОПРОС 78

**В состав первичного туберкулезного комплекса входят:**

а) легочный очаг и туберкулез регионарных лимфатических узлов

б) легочный очаг, специфический лимфангит и туберкулез регионарных лимфатических узлов

в) специфический эндобронхит, легочный очаг и туберкулез регионарных лимфатических узлов (78)



# ВОПРОС 79

**Вилочковая железа поставляет в периферическую кровь:**

- 1) В-лимфоциты
- 2) Т-лимфоциты
- 3) моноциты
- 4) тимические гуморальные факторы
- 5) тканевые макрофаги

**Правильный ответ:**

- а) 1, 2 и 3
- б) 1 и 3
- в) 2 и 4
- г) 4
- д) все ответы правильные

# ВОПРОС 80

**Иммуноглобулин М 1 выполняет функцию:**

- а) участвует в немедленных аллергических реакциях
- б) участвует в патогенезе замедленной гиперчувствительности
- в) участвует в иммунокомплексных аллергических реакциях
- г) участвует в цитотоксических аллергических реакциях
- д) не играет роли в формировании аллергических реакций

# ВОПРОС 81

**Какие медиаторы высвобождаются при дегрануляции тучных клеток:**

а) брадикинин

б) хемотаксический фактор эозинофилов

в) гистамин

г) хемотаксический фактор эозинофилов и медленно реагирующее вещество анафилаксии

д) брадикинин, хемотаксический фактор эозинофилов, гистамин и медленно реагирующее вещество анафилаксии

# ВОПРОС 82

**Какие смеси целесообразно использовать при непереносимости белков коровьего молока у детей?**

- 1) Фитолакт
- 2) Детолакт
- 3) Биолакт
- 4) Семилак

**Правильный ответ:**

- а) 1 и 2
- б) 1 и 3
- в) 2 и 4
- г) 3 и 4

## ВОПРОС 83

**Отек Квинке у больного возник при контакте с сухим кормом для рыбок (дафнией). Какой вариант перекрестной пищевой аллергии можно ожидать у данного больного:**

- а) на мясо
- б) на вареную рыбу
- в) на сушеную рыбу
- г) на раков и крабов
- д) на препараты йода

## ВОПРОС 84

**При выраженном дермографизме  
кожи кожные пробы целесообразно  
делать:**

а) на руке

б) на спине

в) на животе

г) на фоне приема антигистаминных  
препаратов

# ВОПРОС 85

**Вариант депрессивного синдрома, при котором возможно двигательное возбуждение (ажитация):**

- а) слезливый
- б) тревожный
- в) астенический
- г) адинамический
- д) анестетический

# ВОПРОС 86

**Метод компьютерной томографии применяется для диагностики всех следующих видов мозговой патологии, кроме:**

- а) менингиты
- б) опухоли мозга
- в) дегенеративные изменения мозговой ткани
- г) инфаркты мозга
- д) кровоизлияния в вещество мозга



# ВОПРОС 87

**Появление на ЭЭГ у детей школьного и подросткового возраста билатерально-симметричных вспышек медленных волн тета-диапазона в центрально-передних зонах является указанием на повышенную раздражимость:**

- а) диэнцефальных структур
- б) стволовых структур
- в) диэнцефально-стволовых структур

# ВОПРОС 88

**Толерантность на начальных этапах алкоголизма превышает изначальную**

**В:**

- а) 2-3 раза
- б) 3-4 раза
- в) 4-5 раз
- г) более чем в 5 раз

# ВОПРОС 89

**Взрывчатость, недержание эмоций характерно для психопатии:**

- а) возбудимой
- б) паранойяльной
- в) психастенической
- г) истерической
- д) шизоидной

# ВОПРОС 90

**Для II стадии алкоголизма наиболее характерна форма злоупотребления алкоголем по типу:**

- а) перемежающегося пьянства
- б) псевдозапоев
- в) постоянного пьянства на фоне высокой толерантности
- г) истинных запоев
- д) постоянного пьянства на фоне низкой толерантности

# ВОПРОС 91

**Соматические нарушения в III стадии алкоголизма характеризуются всем, кроме:**

- а) системности
- б) формирования так называемого "висцераль-ного" алкоголизма
- в) возможности полной редукции при условии длительной ремиссии
- г) формирования синдромов сочетанного поражения (гепатопанкреатического и др.)

## ВОПРОС 92

**При острой интоксикации смерть наступает более вероятно при концентрации алкоголя в крови:**

- а) 200 - 300 мг %
- б) 300 - 400 мг %
- в) 400 - 500 мг %
- г) 500 - 600 мг %
- д) 600 - 700 мг %

# ВОПРОС 93

**Состояние передозировки каннабиноидами (встречаются в растениях семейства коноплевых) проявляется:**

- 1) гипертензией и тахикардией;
- 2) паническими реакциями;
- 3) спутанностью сознания;
- 4) галлюцинаторными расстройствами, обилием парестезии и сенестопатий;
- 5) резко выраженным чувством голода.

**Правильный ответ:**

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно 4
- д) верно все перечисленное

# ВОПРОС 94

**Все лица с выявленными профессиональ-ными заболеваниями должны находиться на диспансерном наблюдении у:**

- а) участкового терапевта или врача общей практики (семейного врача)
- б) врача-специалиста по профилю заболевания
- в) врача-профпатолога



# ВОПРОС 95

**Основопологающим документом о проведении периодического медицинского осмотра является:**

- а) приказ по предприятию
- б) приказ по ЛПУ
- в) приказ по ТУ Роспотребнадзора
- 4) приказ по медицинской страховой компании
- 5) приказ по профсоюзной организации

# ВОПРОС 96

**Острый гемолиз вызывает:**

- а) хлорбензол
- б) фенилгидрозин
- в) хлорорганические пестициды
- г) свинец
- д) хром

# ВОПРОС 97

**Назовите угол альфа при  $R_1 = S_1$ :**

а) + 120

б) + 90

в) +60

г) – 90

д) +30

# ВОПРОС 98

**Ширина комплекса QRS при гипертрофии левого желудочка обычно равна:**

- а) 0,06 – 0,08 с
- б) 0,08 - 0,09 с
- в) 0,10 - 0,11 с
- г) 0,12 - 0,14 с
- д) более 0,14 с

# ВОПРОС 99

**Назвать признаки экстрасистолы из правого желудочка:**

- 1) комплекс QRS экстрасистолы напоминает комплекс, характерный для блокады правой ножки п. Гиса в отведениях V1-V6
- 2) комплекс QRS экстрасистолы напоминает комплекс, характерный для блокады левой ножки п. Гиса в отведениях V1-V6
- 3) наличие полной компенсаторной паузы
- 4) наличие неполной компенсаторной паузы

**Правильные ответы:**

- а) 1, 3
- б) 1, 4
- в) 2, 3
- г) 3, 4

# ВОПРОС 100

**Указать ЭКГ признак предсердной тахикардии:**

- а) тахикардия с нормальной ширины желудочковыми комплексами и А-В блокадой II степени
- б) тахикардия с нормальной ширины желудочковыми комплексами и отсутствием зубца Р
- в) тахикардия с нормальной ширины желудочковыми комплексами и зубцами Р, отличающимися от синусовых, перед желудочковыми комплексами
- г) тахикардия с нормальной ширины желудочковыми комплексами и зубцами Р в области сегмента СТ