

Общая психопатология

часть 2

Нарушения мышления

Сферы психической деятельности человека

1. Чувственное познание (ощущение и восприятие)

2. Мышление

3. Память и внимание

4. Интеллект

5. Эмоции

6. Воля и психомоторная сфера

7. Влечения

8. Сознание

МЫШЛЕНИЕ

– опосредованное, отвлеченное, обобщенное
отражение внутренних связей и отношений между
явлениями реального мира.

*В норме в онтогенезе последовательно
сменяются 3 вида мышления:*

1. Наглядно-действенное
2. Наглядно-образное
3. Абстрактно-логическое

ПАТОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ

•ПО ФОРМЕ

- (формальные р-ва мышления)

ПО

СОДЕРЖАНИЮ

- 1.Нарушение темпа
- 2.Нарушение
стройности
- 3.Нарушение
целенаправленности

1. Бредовые идеи
2. Сверхценные
идеи
3. Навязчивые идеи

Нарушение темпа мышления.

- **Болезненно ускоренное мышление**
(характерно для маниакального синдрома)
- **Болезненно замедленное мышление**
(характерно для депрессивного синдрома)

Формальные расстройства мышления, характерные для шизофрении

- **Резонерское мышление** (резонерство, бесплодное мудрствование, рассудительство) - мышление с преобладанием пространных, отвлеченных, расплывчатых, малосодержательных рассуждений
- **Аутистическое мышление** — мышление, опирающиеся не на факты реальной жизни, а на переживания, обусловленные внутренним миром больного.
- **Символическое мышление** – мышление, при котором обычным, общеупотребляемым словам придается особый, отвлеченный, понятный лишь самому больному, смысл.
- Больные могут придумывать новые слова – «**неологизмы**»
- **Шперрунг** – «закупорка» мысли, внезапный обрыв мысли
- **Разорванное мышление** – соединение в одной фразе речи может сохраняться; максимально выраженное разорванное мышление характеризуется обрывками мысли, соединенными общим смыслом фразы («о

Формальные расстройства мышления, характерные для органических заболеваний

- **Патологическая обшлвяотеллвзсать**

(детализированность, вязкость, тугоподвижность, торпидность мышления) – склонность к детализации, застревание на частных обстоятельствах (“топтание на месте”), неспособность отделить главное от

- второстепенного

Персеверация мышления - повторение одних и тех же слов, фраз, в связи с выраженным затруднением мыслительного процесса, доминированием («застреванием») какой-либо одной мысли.

Инкогерентное мышление - отсутствие не только логических, но и грамматических связей между словами.

Речь больных **бессвязная**, беспорядочный набор

Патопсихологическая основа нарушений мышления по форме

Органические Шизофрения заболевания Г.М.

Снижение уровня обобщения

в мышлении преобладают **конкретные** суждения, затруднено выделение общих (абстрактных) признаков предметов, отделение главного от второстепенного

Тест классификация предметов: больной не может объединить стол и стул в одну группу (мебель), "т.к. на столе едят, а на стуле сидят".

Интерпретация пословиц: Не в свои сани не садись – «Не садилась я в чужие сани, я вообще в сани не

садилась»

Искажение процесса обобщения

«отлёт» от конкретных значений, **преобладание абстрактных**, чрезмерно общих понятий, часто отражающих лишь случайную сторону явлений, неадекватность реальной (конкретной) ситуации

Тест классификация предметов: больной объединяет в одну группу шкаф и кастрюлю т.к. «у обоих предметов есть отверстие»; автомобиль и ложку – «общее - движение»; вилку, стол, лопату – «общее – твердость»; самолет и дерево – «это небо и земля» и т.д.

Бредовые идеи

1. ложные, ошибочные суждения
2. возникающие на патологической основе
3. овладевают всем сознанием больного
4. не поддаются логической коррекции, несмотря на явное противоречие с действительностью.

Классификация бредовых идей:

- по содержанию (фабуле бреда)

- **Бредовые идеи ПРЕСЛЕДОВАНИЯ**

(преследования, воздействия, инсценировки, сутяжничества, отравления, ущерба, ревности)

- **Бредовые идеи ВЕЛИЧИЯ** (реформаторства, богатства, любовного очарования, высокого происхождения, изобретательства)

- **Бредовых идеи САМОУНИЧИЖЕНИЯ**

(виновности, обнищания, греховности, дисморфомания, ипохондрический бред)

Классификация бредовых

идейнизму бредообразования:

- **Первичный** (интерпретативный, систематизированный, бред толкования) – нарушение абстрактного познания, «кривая логика», ложные интерпретации
- **Вторичный** (образный, чувственный) – нарушение чувственного познания; бред возникает при наличии других психических расстройств — галлюцинаций, психических автоматизмов,
- помраченного сознания, измененного настроения,
- **Индукцированный** (внушённый)

Бредовые синдромы

- **Паранойяльный синдром**
- **Параноидный синдром**
- **Галлюцинаторно-параноидный, синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо**
- **Парафренный синдром**

Паранояльный синдром

- систематизированный интерпретативный (первичный) бред
- нет галлюцинаций или расстройств настроения
- часто монотематический (например, реформаторства, изобретательства, ревности, кверулянства и пр.)

Параноидный синдром

- Представлен **вторичным чувственным бредом**
Бред возникает на фоне аффекта тревоги, страха, депрессии, галлюцинаций, психических автоматизмов, кататонических расстройств.
 - Поэтому в зависимости от преобладающих в клинической картине расстройств, говорят о:
 - Параноидном синдроме;
 - Галлюцинаторно-параноидном;
 - синдроме аффективно-бредовом;
 - синдроме психических автоматизмов
- Кандинского-Клерамбо (см. след. слайд)

Синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо

1. Бред преследования и воздействия
2. Слуховые и зрительные псевдогаллюцинации
3. Психические автоматизмы – *чувство утраты контроля над собственными психическими и физиологическими процессами с бредовой интерпретацией существования этих процессов как вызванных внешним воздействием:*
 - Идеаторные (симптом открытости мыслей, с-м звучания мыслей, вкладывания мыслей, ментизм, обрыв мысли - шперрунг)
 - Сенсорные (обонятельные и тактильные псевдогаллюцинации, сенестопатии)
 - Аффективный (убежденность больных в том, что их настроение меняется под воздействием внешней силы)
 - Моторный (убежденность больных в том, что совершаемые ими движения или поступки происходят под воздействием внешней силы, т.е. движениями кто-то управляет).

Парафренный синдром

1. Мегаломанический бред
(фантастический бред величия)
 2. Бред воздействия
 3. Слуховые и зрительные псевдогаллюцинации
 4. Явления психического автоматизм
- (все кроме п.1 - как при с-ме Кандинского-Клерамбо)

Сверхценные идеи

- Возникают под влиянием действительных обстоятельств
- Благодаря сильной аффективной окраске, получают в сознании не соответствующее их реальному значению преобладающее (доминирующее) положение

По содержанию: *Изобретательства, ревности, кверулянтства, ипохондрические и пр.*

**Ошибочные
суждения**

**Сверх-
ценные
идеи**

**Бредовые
идеи**

*Ложные,
ошибочные
суждения*

+

-

+

*Преобладают
в сознании
больного*

-

+

+

*Не поддаются
логической
коррекции*

-

+/-

+

Навязчивые явления

- непроизвольно возникающие
непреодолимые мысли,
представления, сомнения,
воспоминания, влечения, страхи и
действия при сознании их
болезненности, сохранности
критического к ним отношения и
попыткой борьбы с
ними .

Навязчивые явления

- **Навязчивые мысли (обсессии)** – «умственная жвачка», навязчивый счет, хульные мысли
- **Навязчивые сомнения** - отсутствие уверенности в правильности и законченности выполненных (совершенных) действий
- **Навязчивые воспоминания** — возникновение неотвязных, нередко образных мыслей, относящихся к какому-либо бывшему в действительности неприятному, порочащему или мучительному событию
- **Навязчивые влечения** — желание совершить бессмысленное, опасное или непристойное действие, сопровождается тревогой и страхом. Никогда не совершаются!
- **Навязчивые страхи (фобии)** – см. след. слайд
- **Навязчивые действия (компульсии)** - сочетающиеся с фобиями («ритуалы» : на некоторое время позволяют избавиться от страха), не сочетающиеся с фобиями («простые»: вынуждены совершать привычное, зафиксированное в прошлом действие: поправлять волосы, отбрасывать назад голову и пр.)

Навязчивые страхи (фобии)

- **Агорафобия** – страх открытых пространств, скопления людей, страх остаться без помощи. Приводит к избегающему поведению. Часто сопровождается *паническими атаками*.
- **Социофобии** – страх совершать какие-либо действия в присутствии других людей (выступать, покраснеть, привлечь внимание). Приводит к избегающему поведению.
- **Нозофобии** – страх заболеть тяжелой болезнью (кардиофобия, танатофобия, канцерофобия, СПИДОфобия, лиссофобия, мизофобия и пр.)
- **Простые** (изолированные) фобии – все

Дисморфомания и дисморфофобия

Дисморфо фобия –

навязчивые идеи своего физического несовершенства; обычно сочетаются с социофобиями и сниженным настроением

Дисморфо мания –

бредовые или сверхценные идеи своего физического несовершенства; часто сочетаются с социофобиями и бредовыми идеями отношения

Ипохондрия -

– необоснованные или преувеличенные опасения за свое здоровье; поиск или уверенность в наличии какого-либо заболевания при отсутствии объективных признаков последнего

Ипохондрические идеи м.б.:

- навязчивые
- сверхценные
- бредовые

Т.е. ипохондрия определяет только содержание переживаний, а не их структуру (просто ипохондрического синдрома нет)