

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік
Медицина Университеті

**Тақырып: «Тонзилор» аппаратын қолдану созылмалы тонзилит емі
кезінде тиімділігін анықтау .**

**Қабылдаған: Қошмағанбетова Г.К
Орындаған: Мусакулов Ибадулла
Резидент-оториноларинголог**

Ақтобе 2017год

Сұрақ:

7-15 жас аралығындағы созылмалы тонзиллитпен ауыратын балаларда соңғы бай ішінде «тонзилор» аппаратын қолдану, тек қана антибактериальді терапияны қолданатын балалармен салыстырғанда тиімді ме ?

- **Мақсаты:**

7-15 жас аралығындағы балаларда
созылмалы тонзиллит ауруының
жиілігін азайту

- **P**-7-15 жас аралығындағы созылмалы тонзиллиттің жиі асқынуы кездесетін балалар .
- **I**- “Тонзиллор” аппаратын қолдану .
- **C**- тек қана антибактериальді терапия қолдану.
- **O**- созылмалы тонзиллит асқыну жиілігінің томендеуі .
- **T**- 6 ай.

Тапсырма:

- 7-15 жас аралығындағы созылмалы тонзиллит асқынуымен ауыратын науқастар тобын алу
- Тек қана антибактериальді терапия алған науқастармен салыстыру(цефтриаксон 100мг/кг).
- Бадамша безінен жуғынды алу.
- бай бойы алынған топты бақылау.
- 6 айдан соң асқыну жиілігін бақылау үшін аналарын сурастыру.

- Азжиілікті ультрадыбысты тонзиллор аппараты созылмалы тонзиллиттің интенсивті терапиясында қолданылады. Оның негізгі қызметі қысқа толқындар арқылы бадамша безіне препарат сіңімділігін арттыру (0.1 % сутегі ерітіндісі) .

Таңдау:

- Таңдау критерийлері:
- 1-Енгізу критерийі :
- 7-15жасаралығындағы созылмалы тонзиллитпен жиі асқынатын балалар;
- 2-критерии исключения:
- Туберкулезбен ауырған балалар,
- Жедел инфекциялық аурулармен ауыратын балалар,
- Және де баска да созылмалы ауыратын балалар (созылмалы бронхит,трахеит, и.т.д.)
- Таңдау әдісі: Ыңғайлы.
- Генеральная совокупность: 7-15 жас аралығындағы созылмалы тонзиллиттің жиі оршуімен ауыратын 80 науқас алынды. г.Актобе. ҚДП №4. 80 бала.
- 80 бала 2 топқа бөлінді.

Дизайн:

- РБЗ. Экспериментальді, .

ЭТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР:

Ата-анасынан рұқсат алынуы
Этикалық комитетпен рұқсат етілді.
Зерттеу жүргізуге ақпараттық келісім
алынды,
Кез-келген уақытта зерттеуден бас
тартуға құқылы;
Науқастардың қызығушылығымен болған
әрекет, мәжбүрлеудің болмауы.
Науқастарға қауіп төндірмеу.

- **Celecoxib Versus Placebo in Tonsillectomy: A Prospective, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Trial.**
- [Van Daele DJ](#)¹, [Bodeker KL](#)², [Trask DK](#)³.
- [Author information](#)
- **Abstract**
- **OBJECTIVES:**
- Celecoxib is a cyclooxygenase-2-specific inhibitor indicated to treat acute pain and pain secondary to osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Surgical models of acute pain have demonstrated superior pain relief to placebo. The objective of this study was to test the safety and efficacy of celecoxib for pain relief after tonsillectomy compared to placebo.
- **METHODS:**
- Adult subjects were randomized to 200 mg celecoxib versus placebo with a loading dose the night before surgery then twice daily for 10 days. Subjects were instructed to supplement the study drug with hydrocodone/acetaminophen liquid or acetaminophen for pain as needed. Subjects completed a daily diary regarding their pain, nausea, vomiting, diet, and activity.
- **RESULTS:**
- Seventeen subjects enrolled. Intraoperative blood loss was similar between groups, and no subject had postoperative bleeding. Three patients returned to the emergency department for treatment, and 2 patients could not complete the diaries, all in the placebo group. Subjects in the placebo group required statistically significant ($P < .05$) higher doses of narcotic and acetaminophen to control pain. Pain and diet rating scores were slightly better in the celecoxib group compared to placebo.
- **CONCLUSIONS:**
- In this small cohort, celecoxib reduced postoperative narcotic and acetaminophen requirements compared to placebo without complications.

- **Сұрақ :** Тонзилоэктомия операциясынан кейін целекоксибті қолдану плацебомен қарағанда операциядан кейінгі ауырсынуды басуға көмектеседі ме?
- **Р-** Тонзилоэктомия операциясынан кейінгі науқастар.
І- целекоксибті қолдану
С- плацебо
О- ауырсынудың азаюы

РБЗ, бақыланған топ, екі жақты жасырын

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

- <http://simptomer.ru/bolezni/otolaringologiya/187-tonzillit-simptomu>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27357971>
- Википедия

назар аударганыңызға рахмет!!!