

ЖИВОТНЫЕ!!!



Королевский попугай



- Длина тела 40 см, хвоста 21 см. Спина и крылья зелёные, нижняя часть тела, горло, шея и голова — ярко-красные. На крыльях имеется белая полоса, шея и надхвостье — тёмно-синего цвета. Хвост в верхней части чёрный, в нижней — тёмно-голубой, с красными краями. Клюв у самцов оранжевый. Окраска самки зелёная, поясница и нижняя часть спины у неё голубая, с зелёным окаймлением. Брюшко красное, грудь и горло зелёного цвета с красноватым оттенком. Клюв у самок чёрно-коричневый, молодые попугаи приобретают этот роскошный перьевой наряд только на втором году жизни.

Бигль



- Бигль (англ. *Beagle* — гончая) — порода собак. Среднего размера, внешне сходна с фоксхаундом, но мельче, с более короткими ногами и более длинными и мягкими ушами (по стандарту породы уши должны доходить до кончика носа). Ш. Рост от 13 до 14 дюймов (33-38 см) в холке, вес между 18 и 35 фунтами (8 и 16 кг), суки мельче кобелей. Бигли обладают хорошим обонянием и используются прежде всего для охоты на кроликов и зайцев, очень часто используются на таможне для поиска взрывчатых веществ. Бигли очень активные и шаловливые. Обучение и воспитание биглей сложное, они требуют постоянных тренировок

Померанский щпиц



- Название произошло от названия исторической области в Германии — Померании. В Америке и в России долгое время этих шпицев называли иначе — цверг-шпицами или просто карликовыми. Это самый маленький представитель шпицев.
- Во времена правления королевы Виктории, в 1870 году, шпицы из Померании попадают в Англию, где начинается работа по созданию карликовой формы, улучшению «одежки» померанца и приданию ему общей изысканности. Красота лучших представителей английских и американских шпицев оказывает большое влияние на заводчиков всего мира, и постепенно шпицы в других странах видоизменяются, подтягиваясь к эталонному померанскому шпицу. Сама королева так любила своего шпица Марко, что была с ним всегда и везде.

Хомяк



- К семейству хомяков относятся небольшие, плотно сложенные грызуны с короткими конечностями, маленькими ушами и короткими хвостами. Длина тела варьируется от 5 до 34 см, хвоста от 0,7 до 10 см. Самки у некоторых видов крупнее самцов. Окраска густого меха на спине от пепельно- или буровато-серой до тёмной коричнево-охристой; на животе — чёрная, белая или серая. Иногда вдоль спины проходит чёрная полоса. Имеются очень развитые щёчные мешки.

Шиншилла



- Шинши́лла^[1] (лат. *Chinchilla lanigera*) — вид грызунов семейства шиншилловых. Этот вид очень редкий в дикой природе. Встречается только на высокогорьях Анд в Чили. Это активный грызун с пушистым хвостом, длинными усами (вибриссы), помогающими ориентироваться в темноте и искать пищу, красивыми выразительными глазами и длинным густым мехом (до 4 см длиной, с каждой волосяной луковицы выходит 60 — 70 пушинок), который предохраняет зверьков от резких колебаний температуры.

Крыса



- Длина тела 8—30 см, длина хвоста равна длине тела или больше её^[1], масса от 37—39 граммов (*Rattus exulans*) до 400—420 граммов (некоторые экземпляры серой крысы могут достигать 500 граммов)^[2]. В окраске тела преобладают тёмно-серые или серо-бурые тона, однако встречаются жёлтые, красные и оранжевые оттенки^[2]. Пальцы на лапах подвижные — это компенсирует недостаточное развитие мозолей, необходимых для лазания^[1].
- Широко распространены два синантропных вида — серая и чёрная крысы. Остальные виды распространены в Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Австралии, на островах Малайского архипелага. Ещё один синантропный вид *Rattus exulans* завезён на многие острова Океании и Гавайи^[2].
- Несинантропные виды крыс обитают преимущественно в тропических лесах, в том числе горных. В Австралии крысы встречаются в саваннах и на пастбищах^[2].
- В ископаемом состоянии род *Rattus* известен со среднего плейстоцена^[3].

Кошка




- **Кошка**, или **домашняя кошка** (лат. *Felis silvestris catus*) — домашнее животное, одно из наиболее популярных^[1] (наряду с собакой) «животных-компаньонов»^{[2][3][4]}.
- С зоологической точки зрения домашняя кошка — млекопитающее семейства котоподобных отряда хищных. Ранее домашнюю кошку нередко рассматривали как отдельный биологический вид. С точки зрения современной биологической систематики домашняя кошка (*Felis silvestris catus*) является подвидом лесной кошки (*Felis silvestris*)^[5].
- Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное^[6], использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела^[7].
- В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек^[8], выведено около 200 пород, от длинношёрстных (персидская кошка) до лишённых шерсти (сфинксы), признанных и зарегистрированных различными фелинологическими организациями.
- На протяжении 10 000 лет кошки ценятся человеком, в том числе за

Суматранский барбус



Суматранского барбуса можно кормить живым и сухим кормом, но в рацион обязательно должны входить растительные добавки, что предотвращает ожирение и болезни. Кроме того, при недостатке растительного корма рыбы начинают ощипывать молодые растения.

конец!!!!



Спасибо за внимание